QL
571
C692
ENT

C692
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Museum

Pars 62:

F. Spaeth

Chrysomelidae: 16. Cassidinae.

Einzel-Preis: Mark 17.10
Subscriptions-Preis: Mark 11.40

Smithsonian Institution
National Museum
232772

W. Junk
Berlin W. 15.
10. XI. 1914.

Soeben erschienen: Just published: Vient de paraître:

H. Loew, Die Europäischen Bohr-Fliegen (Trypetidae). (Wien 1862.) **Facsimile Edition.** in Folio. Mit 26 photograph. Tafeln. Preis Mark 150.—

C. Rondani, Dipterologiae Italicae Prodromus, 8 vol. (1856—1880.) **Facsimile Edition.** Preis Mark 150.—

In Vorbereitung: In preparation: En préparation:

Brauer u. Bergenstamm, Die Zweiflügler des Kais. Museums zu Wien. 7 Teile. (Wien 1880—1894.) **Facsimile Edition.** Quart. Mit 24 Tafeln. Subscriptionspreis: Mark 120.— Preis nach Erscheinen: Mark 150.—

Preis der 3 Neudrucke zusammen: Price of the 3 reprints, taken together: Prix des 3 réimpressions, ensemble: } Mark 360.— = 18 £ = Francs 450.—

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 62:

F. Spaeth

Chrysomelidae: 16. Cassidinae.

W. Junk
Berlin W. 15.
1914.

Smith... Nationa...

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Chrysomelidae.

16. Subfam. Cassidinae.

Auctore **F. Spaeth.**

Cassidiadae Stephens, Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 364; Man. Brit. Col. 1839, p. 286.

Cassidoidea Hope, Col. Man. III, 1839, p. 158.

Cassididae Lacordaire, Phytoph. I, 1845, p. LI. — Boheman, Monogr. Cassididarum I, 1850, p. 1 (II, 1854, III, 1855, IV, 1862). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893—94), p. 125.

Cassidinae Erichson, Archiv f. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 151.

Cassidae Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 47.

Cassidides Crotch, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 19 und 76. — Le Conte & Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 355.

Cassidini Redtenbacher, Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXXXI; ed. 3, II, 1874, p. CXLVI. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 341. — Seidlitz, Fauna Balt. 1875, p. 131; ed. 2, 1891, p. 172; Fauna Transsylv. 1891, p. 172. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1065. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1897), p. 205. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 391. — Reitter, Fauna Germ. IV, 1912, p. 212.

Cassidina Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 395.

Kataloge: Allgemein:

Schönherr, Syn. Ins. II, 1808, p. 209. — Dejean, Cat. Col. ed. 2, 1821, p. 115; ed. 3, 1837, p. 391. — Boheman, Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 1; Monogr. Cassidid. IV, 1862. — Gemminger et Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3619. — Nachtrag hierzu: Van den Branden, Mém. Soc. Roy. Liége (2) XI, 1885 (1884), p. 11.

Örtlich begrenzt:

Stephens, Syst. Man. Brit. Col. 1839, p. 286 (Britannien). — Gaubil, Cat. Col. Eur. et Algérie 1849, p. 187 (Europa et Mediterr.). — Melsheimer, Cat. Col. U. States 1853, p. 119 (Nord-Amerika). — Schaum, Cat. Col. Eur. 1862, p. 114 (Europa). — Gredler, Käfer von Tyrol 1863, p. 447 (Tirol). — Marseul, Cat. Col. d'Eur. et du Bassin Méditerr. II, 1863, p. 281; Cat. Col. Eur. et Confinium 1867, p. 128; Cat. Col. Ancien Monde, Eur. et Contrées limitrophes 1882—1889 (1889), p. 527 (Europa und Mediterr). — Scriba, Käfer im Grossherz. Hessen IV, 1869, p. 46 (Hessen). — Crotch, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 76 (U. States). — Stein, Cat.

Col. Eur. 1868, p. 132; ed. 2 (Stein et Weise) 1877, p. 185; ed. 3, (Heyd. Reitter et Weise) 1883, p. 206 (Europa). — Siebke, Cat. Col. Norveg. 1875, p. 325 (Norwegen). — Heyd. Verz. Käfer v. Nassau 1877, p. 363; ed. 2, 1904, p. 315 (Nassau). — Lewis, Cat. Col. from the Japanese Archipelago 1879 (Japan). — Heyden, Cat. Col. Sibirien etc. 1881, p. 209; Nachtr. 1, 1893, p. 210. — Westhoff, Käfer Westfalens 1881 (Verh. Ver. Rheinl. XXXVII, Suppl.) p. 285 (Westfalen). — Henshaw, List Col. America, North of Mexico 1885, p. 114 (Nord-Amerika) — Masters, Cat. Col. Australia (Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887), p. 85 (Australien). — Gorham, Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 280 (Japan). — Baer, Cat. Col. Philippines (Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886), p. 196 (Philippinen). — Lomnicki, Muzeum Imiena Dieduszyckich 1886, p. 287 (Galizien). — Philippi, Cat. Col. Chile 1887 (Anales Univ. Chile LXXI, 1888) (Chile). — Schönfeldt, Cat. Col. Japan (Verh. Nass. Ver. XL, 1887), p. 156 (Japan). — Schilsky, Verz. Käf. Deutschl. 1888, p. 142 (Deutschland). — Ern. Olivier, Faune d'Allier II, 1890, p. 355 (Allier). — Desbrochers, Monogr. Cassid. (Frelon) 1891, p. 44 (Europa et circa). — Grill, Cat. Col. Scandinaviae 1896, p. 353 (Scandinav.). — Kuthy, Fauna Regni Hung. Col. 1896, p. 199 (Ungarn). — Gavoy, Cat. Col. de l'Aude 1897, p. 251 (Aude). — Halbherr, Elenco sist. X, 1898, p. 43 (Süd-Tirol). — J. Sahlberg, Cat. Col. Fenn. (Acta Soc. Fn. Flor. Fenn. XIX) 1901, p. 119 (Finland). — Alluaud in Grandidier, Hist. Madag. XXI, 1900, p. 329 (Madagascar). — Warnier, Cat. Col. Faune Gallo-Rhénane 1901, p. 175 (Frankreich, Wallis, Rheinprovinz, Luxemburg, Belgien, Holland). — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 330 (Seine). — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 109 (Neu-Guinea). — Fleck, Bull. Soc. Science Bucarest XIII, 1904, p. 328 (Rumänien). — Reitter, Cat. Col. Eur. Cauc. 1906, p. 583 (Europa und Kaukasus). — Carpentier und Delaby, Cat. Col. Dept. Somme 1908, p. 401 (Somme). — Schilsky, Syst. Verz. d. Käf. Deutschl. u. Deutsch-Oesterr. 1901, p. 155 (Deutschland und Deutsch-Oesterreich). — St.-Claire Deville, Rev. d'Ent. XXIX, 1910, p. 400 (Corsica). — Gerhardt, Verz. Käfer Schlesiens ed. 3, 1910, p. 334 (Schlesien). — Smith, Ins. of New Jersey (Ann. Rep. New Jersey 1899) 1900 (New Jersey). — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika etc. II, Chrysomel. 1910, p. 503 (Madagascar), — Spaeth, Sarawak Museum Journ. I, 1912, p. 113 (Borneo). — Petri, Siebenbürgens Käferfauna 1912, p. 285 (Siebenbürgen). — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. XI, 1913, p. 46; Suppl. Ent. III, 1914, p. 14 (Formosa); Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (129, Sitzungsberichte) (Paläarktische, nicht im Katalog Reitter 1906 verzeichnete).

I. Tribus.

Platyauchenia Sturm.

Sturm, Cat. Käfersammlung 1843, p. 358 (Typus: *limbata* Sturm).

Sphaeropalpus Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 285 (Typus: *cinctus* Guér.). — Boh. Monogr. Cassidid. I, 1850, p. 6. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 360.

Deyrollei Baly, Journ. Ent. II, 1863, p. 6 *(Sphaeropalpus)*. Brasilien
= **limbata** Sturm, Cat. Käfersamml. 1843, p. 359, t. 6, f. 8. „
cincta Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 285 *(Sphaeropalpus)*. — Boh. Mon. Cassid. I,

1850, p. 7, t. 1, f. B *(Sphaeropalpus)*. — Baly, Journ. Ent. II, 1863, p. 7 *(Sphaeropalpus)*.

titubans Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 153. — Brasilien

3

Delocrania Guér.

Guér. Mag. Zool. 1844, Ins. t. 131 (Typus: *cossyphoides* Guér.) — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 4. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 358. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 125.

cossyphoides Guér. Mag. Zool. 1844, Ins. t. 131, p. 1. — Boh. Mon. I, 1850, p. 5, t. 1, f. A. — Brasilien

latipennis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 126. — Ecuador

panamensis Champ. l. c. p. 125, t. 5, f. 1. — Panama: Bugaba

3

Notosacantha Chev. 1833 in Dej Cat. p. 367. (monotaxis, on echinata Fabr.)

Hoplionota Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 153 (Typus: *echinata* F.) — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 16. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 357. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 381; LXIV, 1914, p. .

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 21.

a) Aus Madagascar.

acanthina Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 399. — Madagascar

acuticollis Spaeth, l. c. p. 391. — Mahatsinjo

aemula Spaeth, l. c. p. 403. — „

Alluaudi Spaeth, l. c. p. 451. — Androy, Suberbieville, Boeni, Maevatanana

ambrica Spaeth, l. c. p. 456. — Amber-Geb., Mahatsinjo

armigera Ol. Ent. VI, 1808, p. 962; 97, t. 5, f. 85 *(Cassida)*. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287 (Madagascar). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 19. — Spaeth, l. c. p. 410; LXIV, 1914, p. . — Madagascar

longispina Spaeth, l. c. p. 410. — Baie d'Antongil

aurora Spaeth, l. c. p. 426. — „

bathyscioidis Spaeth, l. c. p. 452. — Hukirihitra

biaculeata Boh. Cat. Col. Brit. Mus. IX, 1856, p. 3.; Mon. IV, 1862, p. 2. — Spaeth, l. c. p. 392. — Madagascar

bicuspidata Spaeth, l. c. p. 454. — „

bispinosa Boh. Mon. I, 1850, p. 22. — „

brevicollis Spaeth, l. c. p. 414. — Fort Dauphin

capitata Spaeth, l. c. p. 449. — Morarana

capra Spaeth, l. c. p. 457. — Madagascar

circumminiata Spaeth, l. c. p. 437.	Ostküste Madag.
Cowani Spaeth, l. c. p. 406.	Madagascar
Decorsei Spaeth, l. c. p. 446.	Androy, Imanombo, Ambowombe, Mandrare, Amposimpoloka, Ipotake, Soalala
Donckieri Spaeth, l. c. p. 404.	Antongil
echinata F. Syst. El. I, 1801, p. 390 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 963; 97, t. 5, f. 86 *(Cassida)*. — Boisd. Faune Ent. de l'Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 542 *(Cassida)*. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 18. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, Chrysom. 1910, p. 476. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 387.	Madagascar
ab. *Hildebrandti* Weise in Voeltzkow, l. c. p. 476. — Spaeth, l. c. p. 387; LXIV, 1914, p. .	Madagascar
subspec. *Balyi* Spaeth, l. c. p. 388.	,,
subspec. *Bohemani* Weise, l. c. p. 477. — Spaeth, l. c. p. 386; LXIV, 1914, p. .	,,
subspec. *Fabricii* Weise, l. c. p. 476. — Spaeth, l. c. 1913, p. 385; LXIV, 1914, p. .	,,
subspec. *permira* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 39. — Spaeth, l. c. 1913, p. 388.	Diego Suarez
subspec. *Perrieri* Spaeth, l. c. p. 386.	Ankarahitra
erythrocata Boh. Mon. I, 1850, p. 31.	Madagascar
Fairmairei Spaeth, l. c. p. 460.	Soalala, Baie de Baly
famelica Spaeth, l. c. p. 451.	Ankarahitra
Gahani Spaeth, l. c. p. 441.	Madagascar
gemmata Klug, Abh. Akad. Wissensch. Berlin 1832 (1834), p. 210, t. 5, f. 11 (Sep. Ins. Madag. 1833, p. 122) *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 39. — Spaeth, l. c. p. 433.	,,
Goudoti Weise in Voeltzkow, l. c. p. 479. — Spaeth, l. c. p. 393.	Amber-Geb.
Guerini Weise in Voeltzkow, l. c. p. 477. — Spaeth, l. c. p. 453.	Madagascar
hebe Spaeth, l. c. p. 439.	Andevorante, Diego Suarez
hispoides Spaeth, l. c. p. 389.	Baie d'Antongil, Mahatsinjo
horrida Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 25. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. .	Madagascar
subspec. *spinidorsis* Spaeth, l. c. p. 417.	Andrangoloaka
hova Spaeth, l. c. p. 450.	Diego Suarez
hystrix Spaeth, l. c. p. 424.	Andrangoloaka

Klugi Weise in Voeltzkow, l. c. p. 478. — Spaeth, l. c. p. 393.	Madagascar
subsp. *disticha* Spaeth, l. c. p. 393.	Fort Dauphin Mahatsinjo, Andrangoloaka
Kolbei Weise, l. c. p. 477.	Madagascar
Weisei Spaeth, l. c. p. 407.	,,
lateralis Spaeth, l. c. p. 431.	,,
Lesnei Spaeth, l. c. p. 436.	Baie d'Antongil
longicornis Spaeth, l. c. p. 412.	Antsianaka, Lac Alaotra, Baie d'Antongil
luctuosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 30. — Spaeth, l. c. p. 391.	Madagascar
luteocincta Spaeth, l. c. p. 397.	Fénérive, Soanierana, Baie d'Antongil
marginata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 33. — Spaeth, l. c. p. 453.	Madagascar
Mocquerisi Spaeth, l. c. p. 402.	Mahatsinjo, Baie d'Antongil
monstrosa Spaeth, l. c. p. 422.	Tananarivo, Mahatsinjo
mystica Spaeth, l. c. p. 415.	Baie d'Antongil
nigra Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. p. 368. — Spaeth, l. c. p. 444.	Madagascar
nigriclavis Spaeth, l. c. p. 432.	Antongil, Mahatsinjo
nigritula Spaeth, l. c. p. 433.	Forêt Tanala, Mahatsinjo
erythrocata Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, Chrysom. 1910, p. 479 (nec Boh.!).	
ochracea Boh. Mon. I, 1850, p. 29. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXIV, 1914, p. .	Madagascar
pallens Boh. Mon. I, 1850, p. 32.	,,
pallescens Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287. — Boh. Mon. I, 1850, p. 21. — Spaeth, l. c. p. 427.	,,
paradoxa Boh. Mon. I, 1850, p. 26.	,,
exasperans Spaeth, l. c. p. 398.	Mahatsinjo
pavida Spaeth, l. c. p. 435.	,,
picipennis Spaeth, l. c. p. 394.	Madagascar
plicata Klug, Abhandl. Akad. Wiss. Berlin 1832 (1834), p. 210, t. 5, f. 10; Sep. Ins. Madag. 1833, p. 122, t. 5, f. 10 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 27. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. .	,,
pulchella Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 279. — Boh. Mon. I, 1850, p. 28.	,,
pulchra Spaeth, l. c. p. 440.	Mahatsinjo
quadricornis Boh. Mon. I, 1850, p. 24. — Spaeth, l. c. p. 389.	,,
quadri-tuberculata Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287. — Boh. Mon. I, 1850, p. 23.	,,

ruficornis Spaeth, l. c. p. 444. — Andrangoloaka

semiviridis Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 287. — Boh. Mon. I, 1850, p. 20. — Spaeth, l. c. p. 402. — Madagascar

Sikorae Spaeth, l. c. p. 420. — Diego Suarez

Spaethi Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, Chrysomelid. 1910, p. 478. — Spaeth, l. c. p. 428. — Madagascar

spinosa Spaeth, l. c. p. 400. — Baie d'Antongil

tenuispina Spaeth, l. c. p. 393. — Mahatsinjo

Thiemei Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, Chrysomelid. 1910, p. 476. — Spaeth, l. c. p. 453. — Madagascar

tincta Spaeth, l. c. p. 429. — „

tricolorata Spaeth, l. c. p. 418. — Baie d'Antongil

subspec. *poeciloptera* Spaeth, l. c. p. 418. — Mahatsinjo, Tananarivo, Fort Dauphin

tristis Spaeth, l. c. p. 424. — Mahatsinjo

vacca Spaeth, l. c. p. 458. — Madagascar

vilis Spaeth, l. c. p. 396. — Mahatsinjo

virididorsata Spaeth, l. c. p. 408. — Madagascar

viridinotata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 5. — „

viridipicta Boh. Mon. IV, 1862, p. 13. — Spaeth, l. c. p. 447. — St. Marie

viriditincta Boh. Mon. IV, 1862, p. 3. — Spaeth, l. c. p. 430. — Madagascar

b) Aus Afrika.

Alberti Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 469; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 477; LXIV, 1914, p. . — Südl. Congo, Elisabethville, Nieuwdorp; Nyassa

badia Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 35. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 461. — Capland, Natal

Bugnioni Spaeth, l. c. p. 472. — Natal: Shilouvane

cuneata Spaeth, l. c. p. 483. — Mashonaland

Elisabethae Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 470; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 478. — Südl. Congo: Elisabethville

filiola Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 463. — Transvaal

Holubi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 81; LXIII, 1913, p. 468. — Zambesi, Mashona

incomta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 14. — Spaeth, l. c. p. 462. — Caffraria

Junodi Spaeth, l. c. p. 481. — Natal, Mashonaland

Kohlschütteri Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 219. — Spaeth, l. c. p. 475; LXIV, 1914, p. 111. — Deutsch-Ostafrika

Kuntzeni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. . — Togo, Kamerun

laticollis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 4. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 480. — Natal, Usambara

Leplaei Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 474; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 471.	Südl. Congo: Elisabethville
Livingstonei Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 466.	Mashona: Salisbury
Marshalli Spaeth, l. c. p. 463.	,,
mashonensis Spaeth, l. c. p. 476.	,,
nervosa Spaeth, l. c. p. 468.	Südl. Congo: Elisabeth-ville, Nieuwdorp, Kapiri
Nickerli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LV, 1905, p. 79; LXIII, 1913, p. 462.	Rhodesia
nigrocostata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXIII, 1913, p. 469.	Franz. Congo: Benito
occidentalis Spaeth, l. c. p. 473.	Gabon
parallela Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 36. — Spaeth, l. c. p. 476.	Natal
Pauli Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, p. 241. — Spaeth, l. c. p. 475. LXIV, 1914; p. .	Deutsch-Ostafrika
Schoutedeni Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 472; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 478.	Südl. Congo-staat
van de Polli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 479.	Matabele
Vogeli Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 220. — Spaeth, l. c. p. 465; LXIV, 1914, p. .	Deutsch-Ostafrika,
var. *costulata* Spaeth, l c. 1913, p. 465.	Südl. Congo
Wellmani Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 203. — Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1913, p. 474; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 474; LXIV, 1914, p. .	Benguela, Rhodesia, Südl. Congo, Kamerun

c) Von Asien, den Malayen-Inseln und Philippinen.

Andrewesi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 122. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 518.	Ostindien: Nilgiri
appropinquans Spaeth, l. c. p. 498.	Sarawak
bifenestrella Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 10. — Spaeth, l. c. p. 509.	Ceylon: Colombo
bioculata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 58. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 20; Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 69; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 498.	Sumatra, Nias, Mentawei
bipunctata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 137; LXIII, 1913, p. 524.	Philippinen: Luzon
biramosa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 19. — Spaeth, l. c. 1913, p. 524.	Philippinen
birmanica Spaeth, l. c. p. 501.	Birma
Braueri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. .	Manila
Brookei Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 113; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 500.	Borneo
castanea Spaeth, l. c. 1913, p. 507.	Tonking
centinodia Spaeth, l. c. p. 514.	Yünnan
Chapuisi Spaeth, l. c. p. 523.	Philippinen: Los Baños, Luzon

circumdata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 17. — Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 69; Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 115; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 485. — Hinterindien, Sumatra, Borneo

Clavareaui Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 22; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 488. — Sumatra

clura Spaeth, l. c. p. 511. — Nilgiri

corneola Spaeth, l. c. 1913, p. 516. — „

Dohertyi Spaeth, l. c. p. 488. — Assam

Duvivieri Spaeth, l. c. p. 506. — Vorderindien: Konbir

flavicornis Spaeth, l. c. p. 520. — Ostindien

fumida Spaeth, l. c. p. 513. — Süd-China

Horni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. . — Ceylon

rubromarginata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 49 (nec. Boh.!).

horrifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 8. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 493. — „

lenta Spaeth, l. c. p. 519. — Südl. Vorderindien: Pondichery, Shembaganur

maculipennis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 5; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 7. — Spaeth, l. c. p. 501. — Ostindien

modesta Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 18. — „

Moultoni Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 114; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 487. — Sarawak

Nietneri Spaeth, l. c. 1913, p. 495. — Ceylon

horrifica Boh. (ex p.) Mon. IV, 1862, p. 8.

nilgirica Spaeth, l. c. p. 517. — Nilgiri

obscura Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 18. — Spaeth, l. c. p. 487. — Celebes

ochroleuca Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 38. — Spaeth, l. c. p. 522. — Ostindien

odiosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 6; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 11. — Spaeth, l. c. p. 488. — Java

prominens Spaeth, l. c. p. 486. — Andamanen

Reinecki Spaeth, l. c. p. 499. — Makassar

rubromarginata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 6. — Spaeth, l. c. p. 510. — Ceylon

Sauteri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXIV, 1914, p. . — Formosa

serricosta Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 37. — Spaeth, l. c. 1913, p. 522. — Java

Severini Spaeth, l. c. p. 503. — Ostindien

singaporica Spaeth, l. c. p. 492. — Singapore

taeniata F. Syst. El. I, 1801, p. 396 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 972; 97, t. 6, f. 102 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 40. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 495. — Philippinen

subspec. *rufa* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 20. — Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 113; Verh. zool.-bot. Ges. LXIII, 1913, p. 497. — Malakka, Sunda-Ins.

horrifica (ex p.) Boh. Mon. IV, 1862, p. 8. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 123.

var. *ferruginea* Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 69; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 497.	Mentawei, Sumatra
subsp. *sarawacensis* Spaeth, l. c. 1913, p. 498.	Sarawak
Templetoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 158. — Boh. Mon. IV, 1862, p. 12. — Spaeth, l. c. p. 522.	Ceylon
tenella Spaeth, l. c. p. 512.	Nilgiri
tenuicula Spaeth, l. c. p. 505.	Sikkim, Assam
undulata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 18. — Spaeth, l. c. p. 524.	Philippinen: Mindanao
vicaria Spaeth, l. c. p. 490.	Ceylon, Südl. Vorderindien
vittata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 19. — Spaeth, l. c. p. 524.	Philippinen
Weyersi Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 20; Saraw. Mus. Journ. I, 1913, p. 115 (var. ex Sarawak!); Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 491.	Sumatra, Sarawak

d) Von Australien, Neu-Guinea und den Inseln des Stillen Ozeans.

andaica Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 526.	Neu-Guinea
Birói Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 110; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 525.	Deutsch-Neu-Guinea
Csikii Spaeth, l. c. 1903, p. 111; l. c. 1913, p. 525.	„
dorsalis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1877, p. 424. — Spaeth, l. c. 1913, p. 529.	Queensland
Gestroi Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 112; l. c. 1913, p. 525	Südl. Neu-Guinea
moluccana Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 34, — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 315, t. 18, f. 8. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 113; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 525.	Amboina, Neu-Guinea, Queensland
monilicornis Spaeth, l. c. 1913, p. 527.	Queensland

151

Herminella Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIII, 1913, p. 529.

Marshalli Spaeth, l. c. p. 530.	Natal: Estcourt

1

Hemisphaerota Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 82.

Porphyraspis (ex p.) Hope, Col. Man. III, 1840, p. 154. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 89. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 361.

Porphyraspis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 333.

Bestimmungstabelle *(Porphyraspis)*: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 52.

circumdata Boh. Mon. Cassid.I, 1850, p. 94 *(Porphyraspis)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 130, t. 5, f. 10 *(Porphyraspis)*. — Columbien, südl. Zentral-Amerika

var. *Klenei* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 213 *(Porphyraspis)*. — Ecuador

var. *miniata* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 17; Mon. IV, 1862, p. 44 *(Porphyraspis)*. — Columbien, Costa Rica

ab. *Panamae* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 334 *(Porphyraspis)*. — Panama

coccinea Boh. Mon. 1, 1850, p. 92 *(Porphyraspis)*. — Brasilien, Cayenne, Peru

costipennis Boh. l. c. p. 93 *(Porphyraspis)*. — Brasilien, Peru

crassicornis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 55. Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 204, t. 9, f. 30 a, b. — Paraguay, Minas Geraes

cyclica Boh. Mon. IV, 1862, p. 37 *(Porphyraspis)*. — Cayenne

Erhardti Boh. Mon. IV, 1862, p. 36 *(Porphyraspis)*. — Paramaribo, Cayenne

flexuosa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 130, t. 5, f. 11 *(Porphyraspis)*. — Panama, Columbien,

intricata Boh. Mon. I, 1850, p. 95 *(Porphyraspis)*. — Brasilien

laevicollis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 58. — Columbien

marginata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 131, t. 5, f. 12 *(Porphyraspis)*. — Guatemala

nigrina Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 57. — Brasilien

picina Boh. Mon. IV, 1862, p. 40 *(Porphyraspis)*. — Bahia

puerula Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 60. — Brasilien

pulchella Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 159 (*Porphyraspis)*. — Boh. Mon. IV, 1862, p. 39 *(Porphyraspis)*. — Columbien?

quadrata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 81 *(Porphyraspis)*. — Peru: Marcapata

reticulata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 58 *(Porphyraspis)*. — Süd-Amerika

robusta Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 61. — Columbien

rugosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 96 *(Porphyraspis)*. — Brasilien

sanguinea F. Syst. El. I, 1801, p. 346 *(Imatidium)*. — Boh.Mon. Cassid. I, 1850, p. 91 *(Porphyraspis)*. — Cayenne, Brasilien, Peru, Bolivia

sublaevis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 333 *(Porphyraspis)*. — Columbien

tristis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 95 *(Porphyraspis)*. Biologie: Sharp, Proc. Ent. Soc. Lond. 1884, p. XVIII *(Porphyraspis)*. — Olliff, Trans. Ent. Soc. Lond. 1884, p. 435 *(Porphyraspis)*. — Bahia

valida Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 335 *(Porphyraspis)*. — Columbien

22

Porphyraspis Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 154 (Typus: *erythrocera* Germ.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 89. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 361. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 82.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 52.

Emperochela Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 333 (Typus: *palmarum* Boh.).

Besckei Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 99. — Brasilien: Nov. Friburg

cyanea Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 435 *(Imatidium)*. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 16; Mon. IV, 1862, p. 41. — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 76. — Georgia, Florida, Kentucky

erythrocera Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 731 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 97, t. 2, f. D.

fallax Suffr. Arch. f. Naturgesch. XXXIV, 1868, I, p. 237. — Cuba

Gundlachi Boh. Mon. IV, 1862, p. 43. — Suffr. Arch. f. Naturgesch. XXXIV, 1868, I, p. 237. — „

Mulsanti Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 17; Mon. IV, 1862, p. 42. — Brasilien

palmarum Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 16; Mon. IV, 1862, p. 40. — St. Domingo

Biologie: Candèze, Mém. Liége XVI, 1861, p. 390, t. 5, f. 5.

xanthocera Boh. Mon. I, 1850, p. 98. — Suffr. Arch. f. Naturgesch. XXXIV, 1868, I, p. 236. — Cuba

7

Himatidium F. Latr.

F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 345 *(Imatidium)*. — Ill. Mag. Ins. III, 1804, p. 131. — Hope, Col. Man. III, 1840, p. 132. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 362. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 126.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 53.

Bang-Haasi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 140. — Peru

capense Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 278, t. 133, f. 10 *(Cassida)*. — Brasilien, Bolivia, Ecuador, Peru

comptum Perty, Delect. Anim. Bras. 1830—34, p. 101, t. 20, f. 8. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 286.

fasciatum F. Syst. El. I, 1801, p. 346. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 392. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 971; 97, t. 6, f. 100 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 65, t. 2, f. B.

chalybaeum Boh. Mon. I, 1850, p. 73. — Para

cinctum Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 285. — Boh. Mon. I, 1850, p. 76. — Columbien

coccinatum Boh. Mon. IV, 1862, p. 33. — Amazonas: Ega; Peru

collare Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 259, t. 130, f. 7 *(Cassida)*. — Surinam, Cayenne

lineola F. Syst. El. I, 1801, p. 346. — Boh. Mon. I, 1850, p. 71.

pallipes Ol. Ent. VI, 1808, p. 973; 97, t. 6, f. 104 *(Cassida)*.

cyanipenne Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 72. — Aequatorial-Brasilien, Bolivia

discoideum Boh. Mon. I, 1850, p. 77. — Bahia
fallax Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 242. — Columbien
formosum Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 138. — Peru
fulvum Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 79. — Columbien
impurum Boh. Mon. I, 1850, p. 68; IV, 1862, p. 30 (var. Mexico). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 126. t. 5, f. 2—4. — Brasilien, Zentral-America
var. *foveicolle* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 30. — Champ. l. c. p. 127.
marginicolle Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 80. — Brasilien
nigrum Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 25. — Ecuador
nimbatum Perty, Delect. Anim. Bras. 1830—34, p. 102, t. 20, f. 10. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850. p. 69. — Bahia
quatuordecim-maculatum Latr. in Humb. et Bonpl. Observ. Zool. Anat. I, 1811, p. 139, t. 15, f. 6. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 66. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877. p. 51 (var.). — Venezuela, Columbien
rubiginosum Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 32. — Bolivia
rubricatum Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 285. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 81. — Cayenne
rubrum Boh. Mon. I, 1850, p. 78. — Para, Cayenne
rufiventre Boh. Mon. I, 1850, p. 73. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 128, t. 5, f. 6. — Brasilien, Chiriqui, Bolivia
rufomarginatum Boh. Mon. I, 1850, p. 75. — Champ. l. c. p. 128, t. 5, f. 5. — Mexico
sanguineum Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894). p. 233, t. 13, f. 22. — Costa Rica
semicirculare Ol. Ent. VI, 1808, p. 970; 97, t. 6, f. 99 *(Cassida)*. — Latr. in Humb. et Bonpl. Observ. Zool. Anat. I, 1811, p. 141, t. 15, f. 7. — Boh. Mon. I, 1850, p. 67. — Guyana, Columbien, Ecuador, Panama
var. *Nisseri* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 29. — Columbien
semifasciatum Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 12; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 28. — Pernambuco
thoracicum F. Syst. El. I, 1801, p. 346. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 70. — Panama, Columbien, Ecuador,
albicolle Ol. Ent. VI, 1808, p. 974; 97, t. 6, f. 105 *(Cassida)*. — Latr. in Humb. et Bonpl. Observ. Zool. Anat. I, 1811, p. 143. — Brasilien, Guyana, Peru

---

Latreillei Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 510. — Brasilien

26

Calliaspis Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 81. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 363. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 433. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84 und 118.

Cyanaspis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 433 (Typus: *testaceicornis* Ws.).

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver.V, 1881, p. 55.

andicola Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 86. — Peru

bicolor Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 15; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 35. — Bolivia

Bohemani Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 159. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 35. — Amazonas

brevicornis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 87. — San Paulo

cinnabarina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 84, t. 2, f. C. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 256. — Cayenne, Aequatorial-Brasilien, Peru

discophora Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 88. — Cayenne

funeraria Boh. l. c. p. 88. — „

nigricornis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 95. — Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 51. — Columbien, Bogota

porphyrio Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 85. — Para

punctata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881 p. 25. — Bahia

resplendens Boh. Mon. I, 1850, p.74 *(Himatidium)*; IV, 1862, p. 34. — Cayenne

rubra Ol. Ent. VI, 1808, p. 974; 97, t. 6, f. 106 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 86. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 256. — Guyana, Cayenne

rufula Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 87. — Cayenne

setaceicornis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 433 *(Cyanaspis)*. — Bolivia

14

Stilpnaspis Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 298 (Typus: *marginata* Weise).

columbica Weise, Verh. Naturf. Brünn XLVIII, 1910, p.43. — Columbien

marginata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 298. — Bolivia

2

Spilophora Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 107. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 365.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 56.

Bohemani Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 197. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 50. — Amazonas

var. *annulata* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84. — „

litterifera Spaeth, l. c. p. 83. — „

peruana Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 151 *(Calyptocephala)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 106 *(Calyptocephala)*; Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 29; Mon. IV, 1862, p. 52. — Peru, Bolivia

pulchra Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 18; Mon. IV, 1862, p. 49. — Amazonas, Bogota

sellata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 18; Mon. IV, 1862, p. 51. — Ega

speciosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 197. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 47. — „ Cayenne

tetraspilota Baly, l. c. p. 196. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 48. — Ecuador

trigemina Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 285. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 109. — Cayenne, Ecuador, Peru

aequatoriensis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84; LIX, 1909, p. 396.

trimaculata F. Syst. El. I, 1801, p. 345 *(Imatidium)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 108. — Chereau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 200, t. 5, f. 8 (♂). — Surinam

9

Calyptocephala Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 100. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 366. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 128.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Verein. V, 1881, p. 57.

brevicornis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 103. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 51. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 128, t. 5, f. 7. — Brasilien, Columbien, Mexico, Zentral-Amerika

discoidea Champ. l. c. p. 129, t. 5, f. 9. — Panama: Bugaba

Gerstäckeri Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 46. — Bolivia

lutea Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 102. — Äquatorial. Brasilien, Cayenne, Paraguay

marginipennis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 105. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 128, t. 5, f. 8. — Mexico

miniatipennis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 46. — Cayenne

nigricornis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 540 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 101, t. 2, f. E. — Brasilien

procerula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 45. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 128 nota. — Peru

punctata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 104. — Brasilien, Cayenne

9

Miltinaspis Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 433.

Rhinocassis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84 und 115.

cassidoides Guér. Icon. Règne Anim. II, 1844, p. 284 *(Cephaloleia)*. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 14 *(Calliaspis)*; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 34. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 433. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84 *(Rhinocassis)*. — Java

rufina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 83 *(Calliaspis)*.

1

Calopepla Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 152 (Typus: *Leayana* Latr.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 8. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 370.

Andrewesi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 97. — Belgaum, Kanara

Leayana Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 50, t. 2, f. 7 *(Imatidium)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 951; 97, t. 5, f. 74 *(Cassida) (Leyana*, err. typ.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 9, t. 1, f. C. — Ost-Indien
ab. *nigriventris* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 98.

Mouhoti Baly, Journ. Ent. II, 1863, p. 7. — Laos, Siam, Cambodja
ab. *Bohemaniana* Stål, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1863, p. 56. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 84.

obscura Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 98. — Assam

Reicheana Guér. Icon. Règne Anim. II, 1844, p. 286. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 11. — Ostindien

5

Stenoprioptera Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, Sitzb. p. (132).

tibetana Spaeth, l. c. p. (132). — Tibet, Yünnan

1

Prioptera Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 153 und 176 (Typus: *octopunctata* F.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 44. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 368.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 27.

Andrewesi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 99. — Birma

angusta Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 17. — Formosa

atricornis Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 116 (var. ex Brunei). — Borneo: Kuching, Kina Balu
nigricornis Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, p. 97.

bimaculata Thunbg. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 86, t. 5, f. 93 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 52. — Süd-China, Assam
bimacula Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 262, t. 132, f. 4 *(Cassida)*.

binotata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 10; Mon. IV, 1862, p. 23. — Philippinen

bipunctcollis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 9; Mon. IV, 1862, p. 19. — Java

bisignata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 22. — Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, I, p. 96. — China

chinensis F. Syst. Ent. Suppl. 1798, p. 84 *(Cassida)*; Syst. El. I, 1801, p. 402. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 353 *(Cassida)*. — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 42; Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, I, p. 96. — Südl. China, Fokien, Shanghai
satrapa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 17.

decemmaculata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 60. — Himalaya
var. *fuscicornis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 101. — Birma
var. *nigricornis* Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 9. — Laos, Siam
decempustulata Boh. Mon. I, 1850, p. 55. — Malakka, Java, Sumatra
subspec. *sarawacensis* Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 115. — Sarawak
decemsignata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 62. — Assam
decemstillata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 9; Mon. IV, 1862, p. 21. — Assam?
figurata Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, I, p. 97. — Celebes
gibbosa Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 9. — Tringanee
immaculata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 26. — Philippinen
var. *fuscopunctata* Weise, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 228. — Manila
impustulata Boh. Mon. I, 1850, p. 46, t. 2, f. A. — Assam, Siam
latissima Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 26. — Philippinen
maculipennis Boh. Mon. I, 1850, p. 50. — Assam
Maerkeli Boh. l. c. p. 57. — Java
multiplagiata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 26.. — Andamanen
nigricollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 100. — Nias
octomaculata Boh. Mon. I, 1850, p. 56. — Java
octonotata Boh. l. c. p. 51. — Celebes
? *octopunctata* Hope, Col. Man. III, 1840, t. 2, f. 2 (nec F.!).
octopunctata F. Mant. Ins. 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 296; Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 946; 97, t. 3, f. 38 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 334 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 53. — Siam, Java, Borneo
octopustulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 10; Mon. IV, 1862, p. 24. — Philippinen
pallida Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 25. — Malakka
pallidicornis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 61. — Tenasserim
privigna Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 20. — Java
punctipennis Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 59. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 101. — Calcutta, Birma
quadriimpressa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 47. — Java
quadrisignata Boh. l. c. p. 58. — Manila
ramigera Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 25. — Sumatra, Borneo
rugosa Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 8. — Laos
rugosipennis Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 3. — Sumatra: Soekaranda
Schultzei Weise, Philipp. Journ. Sc. III, 1908, p. 259. — Schultze, ibid. III, 1908, t. 6, f. 1. — Mindoro
Biologie: Schultze, l. c. p. 263, t. 1, f. 6—8.
sexmaculata Boh. Mon. I, 1850, p. 49. — Assam
sinuata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 392; Ent. VI, 1808, p. 949; 97, t. 5, f. 71 *(Cassida)*. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 298; Syst. El. I, 1801, p. 398 *(Cassida)*. — Philippinen

— Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 336 *(Cassida)*. — Weise, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 228.
Biologie: Schultze, Philipp. Journ. Sc. III, 1908, p. 261, t. 1, f. 1—5; t. 6, f. 2.
decemnotata Boh. Mon. I, 1850, p. 59; Mon. IV, 1862, p. 25 (var.).
ab. *deficiens* Weise, l. c. p. 229. — Manila
sumatrana Weise, Arch. f. Naturg. LXXVIII, 1912, I, p. 97. — Sumatra
Westermanni Mannh. Bull. Soc. Nat. Mosc. XVII, 1844, p. 864. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 45. — Assam, Tonking, Tenasserim
— Maulik 1916 P.Z.S. p. 577 —
Whitei Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 11; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 26. — Südl. China
ab. *trabeata* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 46.
40

Episticta Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 12. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 371.

matronula Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 14. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 49 (auch biologisch). — Maulik 1916 P.Z.S. p. 577 — — Ceylon
selecta Boh. Mon. I, 1850, p. 13, t. 1, f. D. — Nepal
viridimaculata Boh. Mon. I, 1850, p. 15. — Nepal,
ab. *collaris* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 99. — Ostindien, Assam, Birma
ab. *marginata* Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresden I, 1875, p. 56. — Malakka
subsp. *Parryi* Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 8. — Assam
var. *perplexa* Baly, l. c. p. 7. — Laos
Weisei Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 4. — Nilgiri

Megapyga Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 41. — Chapuis, Gen. Col. IX, 1875, p. 369.

angulicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 537. — Borneo
brevis Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 99. — Mentawei
coeruleomaculata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 42. — Manila
eximia Boh. Mon. I, 1850, p. 43. — „
terminalis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 16. — Philippinen
5

Metriopepla Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. 57. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 239.

inornata Waterh. Cist. Ent. II, 1877, p. 229 *(Episticta)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 334. — Spaeth in Sjöstedt, Erg. zool. Exped. Kilimandjaro I, VII, 13 (1909) 1910, p. 267. — Ost-Afrika, Nyassa-See, Zambesi, Kilimandjaro,

viridula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI. 1882, C. R. p. 57.

quadripunctata Linell. Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII. 1895. p. 696 (*Episictia*). — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilim. I. VII, 13 (1909) 1910, p. 267.

1

Androya Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 239.

impressicollis Fairm. Revue d'Ent. XX. 1901, p. 246 (*Metriopepla*). — Madagascar: Plateau de Hukaru

Livingstonei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 239 (*Colopepla*). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, C. R. p. 57 (*Metriopepla*). — Zambesi, Usambara

longula Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 84 (*Metriopepla*). — Madagascar: Plateau de l'Androy

obscuricollis Fairm. Naturaliste 1903, p. 10 (*Metriopepla*). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 241. — Madagascar

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 151 (*Metriopepla*).

rubrocostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 258 (*Metriopepla*). — Madagascar

tenuecostata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 556 (*Metriopepla*). — Madagascar: Suberbieville

6

Cassidopsis Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 557 (Typus: *basipennis* Fairm.).

basipennis Fairm. l. c. p. 557. — Madagascar: Betsiboka

Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, Bull. p. 89. — Madagascar: Suberbieville

2

II. Tribus.

Tauroma Hope.

Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1839, p. 97, t. 4, f. 4 (Typus: *taurus* F.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 113. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 372. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 131. — Spaeth, Archiv für Naturg. LXXIX, 1913, p. 126.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 31.

Subgen. **Tauroma** (sens. str.).

Spaeth, Arch. f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 127.

Omocera Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 374.

aeruginosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 123. — Surinam, Para

ammon Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 20; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 57. — Peru

arietina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 53. — Paramaribo

armigera Boh. l. c. p. 55. — „

aureicornis Blanch. in d'Orbigny, Voy. Am. mér. Ins. 1837—1843, p. 211, t. 24, f. 2 (*Omocera*). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 122. — Bolivia

azurea Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 30. — Venezuela

azureicornis Chevr. Col. Mex. Cent. II, 1834—42, fasc. 5, nr. 119 (*Omocerus*); Mag. Zool. XV, 1845, nr. 156. — Boh. Mon. Cassid. I. 1850, p. 120. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 132, t. 5, f. 15. — Zentral-Amerika

bicornis L. Amoen. Acad. VI, 1763, p. 393; Syst. Nat. ed. XII, 1, II, 1767, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 (*Cassida*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. 1781, p. 112, Mant. Ins. I. 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 301; Syst. El. I, 1801, p. 403 (*Cassida*); Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 204 (*Cassida*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387; Ent. VI. 1808, p. 934; 97, t. 4, f. 59 (*Cassida*). — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 328, t. 136, f. 6 (*Cassida*). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 115, t. 3, f. A. — Surinam, Para

Bohemani Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 59. — Brasilien

boliviana Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 20; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 58. — Bolivia

caprigena Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 145. — Amazonas

Championi Spaeth, l. c. p. 147. — Costa Rica

Clavareaui Spaeth, l. c. p. 146. — Ecuador

creberrima Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 118. — Columbien

eximia Boh. Mon. I, 1850, p. 121. — Guyana

ab. *cuprea* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 31. — Venezuela

ab. *jugata* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 21; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 58. — Caracas

ignava Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 125. — Brasilien, Bolivia

insculpta Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 88. — Peru

purpurea Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 4. — „

Reichei Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 124. — Para, Columbien, Chile, Amazonas

reticulata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 88. — Peru

taurus F. Mant. Ins. II, 1787, App. p. 380; Ent. Syst. I, 1792, p. 302; Syst. El. I, 1801, p. 403 (*Cassida*). — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1643 (*Cassida*). — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387; Ent. VI, 1808, p. 935; 97, t. 4, f. 60 — Cayenne, Trinidad, Cuba

(Cassida). —Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 344 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 126.
punctipennis Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1839, p. 97.

Subgen. **Parataurοma** Spaeth.

Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 127.

assimilis Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 3. — Peru
casta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 131, t. 5, f. 13, 14. — Zentral-Amerika
coeruleopunctata Boh. Mon. IV, 1862, p. 56 (conf. Champ. l. c.). — Nicaragua
janthina Boh. Mon. IV, 1862, p. 52. — Ega
smaragdina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 119; IV, 1862, p. 57. — ,,
viridicoerulea Boh. Mon. I, 1850, p. 117. — Para, Columbien

Subgen. **Platytauroma** Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 127.

anchoralis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 131. — Brasilien
coracina Boh. l. c. p. 129. — Bahia
cornuta Boh. l. c. p. 130. — Brasilien
truncata Boh. l. c. p. 128. — Brasilien, Bahia

30

Nebroma Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 126.

Tauroma Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 374 (nec Hope!).

antiqua Klug, Preisv. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 132 *(Tauroma).* — Südl. Brasilien, Paraguay
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 196, t. 9, f. 22a—c *(Tauroma).*
Klugi Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, p. 127.
gibbera Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 134 *(Tauroma).* — Aequatorial-Brasilien
humerosa Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, p. 148. — Goyaz, San Paulo
malachitica Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 534 *(Cassida).* — Boh. Mon. I, p. 136 *(Tauroma).* — Minas Geraës, Brasilien
metallica Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 240, t. 9, f. 9 *(Cassida).*
scabrosa Boh. Mon. I, p. 133. — Minas Geraës, Goyaz, Chaco

5

Oma Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

Maulik 1916 P.Z.S. p. 577 —

denticulata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 141 *(Desmonota).* — Paraguay, Bolivia

var. kraatzi — Maulik 1916 P.Z.S. p. 579 —

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 198, t. 9, f. 23, a, b *(Desmonota)*.

Drakei Kolbe, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 27 *(Canistra)*.

monstrosa Boh. Mon. I, 1850, p. 144 *(Desmonota)*. Brasilien

2

Desmonota Hope.

Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 97 (Typus: *platynota* Germ.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 137. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 374. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 460. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

Subgen. **Pilidionota** Spaeth.

Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

cariosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 140. Brasilien

decora Perty, Delect. Anim. Brasil. 1830—34, p. 102, t. 20, f. 9 *(Imatidium)*. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 286 *(Imatidium)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 146. Minas Geraës

dentipennis Boh. Mon. I, 1850, p. 148. Bahia

Nickerli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 141. Pernambuco

turpis Boh. Mon. I, 1850, p. 147. Bahia

variolosa Weber, Observ. Ent. I, 1801, p. 50 *(Cassida)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 407 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 139. — Maulik 1916 P.Z.S. p. 597 — „

Biologie: Notiz: Ohaus, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 225.

punctatissima Wolf, Abbild. u. Beschr. II, 1818, p. 81, t. 21, f. 2, 3 *(Cassida)*.

smaragdina Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 240, t. 9, f. 8 *(Cassida)*.

Subgen. **Desmonota** s. str.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

aerea Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 143. Pernambuco

crenulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 23; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 62. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 273. (Patagonia?!), Paraguay

Duponti Boh. Mon. I, 1850, p. 153. Bahia

gravida Boh. l. c. p. 150. Chiquitos

peruviana Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 23; Mon. IV, 1862, p. 61. Peru

platynota Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 535 *(Cassida)*. — Sturm in Thon, Abbild. ausl. Ins. I, Käf. p. 3, t. 1, f. 4. — Boh. Mon. I, 1850, p. 149, t. 3, f. B. Brasilien

salebrosa Boh. Mon. I, 1850, p. 142. Brasilien, Bolivia

Zeugonota Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

aurolimbata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 152 *(Desmonota)*. — Bahia
quadrinodosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 25; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 65 *(Desmonota)*. — Parana, Goyaz, St. Paulo

2

Polychalma Bart Brid 1940

Polychalca Weise. not Ser. 1833.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 460. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 128.

bicornuta Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 158 *(Desmonota)*. — Bahia, Pernambuco
bispinosa Boh. l. c. p. 154 *(Desmonota)*. — Minas Geraës
cribrata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 460. — Columbien
cribripennis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 159 *(Desmonota)*. — Bahia, Parana
intermedia Boh. l. c. p. 160 *(Desmonota)*. — Brasilien
laticollis Boh. l. c. p. 157 *(Desmonota)*. — Venezuela
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 174, t. 5, f. 10 c; t. 6, f. 10 a—b. — bis nördl. Argentin.
marginiventris Boh. Mon. I, 1850, p. 162 *(Desmonota)*. — Brasilien
metallica Klug, Preisv. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 163 *(Desmonota)*. — Brasilien, Argentinien, Paraguay
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 176, t. 7, f. 11 a—h und 11 A, a und b.
multicava Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. Anat. I, 1811, p. 210, t. 22, f. 8, 9. *(Cassida)*. — Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 151. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 151 *(Desmonota)*. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 52 *(Desmonota)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 133 *(Desmonota)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 460. — Columbien, Panama, Venezuela, Nord-Peru
perforata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 164 *(Desmonota)*. — Bolivia
plicicollis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 64 *(Desmonota)*. — Brasilien
refractaria Boh. Mon. I, 1850, p. 166 *(Desmonota)*. — Süd-Brasilien
retipennis Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 148. — Goyaz
retusa Boh. Mon. I, 1850, p. 156 *(Desmonota)*. — Brasilien
ruderaria Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 151. — Boh. Mon. I, 1850, p. 165 *(Desmonota)*. — Peru, Bolivia
subcornuta Boh. Mon. I, 1850, p. 155 *(Desmonota)*. — Brasilien: Rio Janeiro

16

Muzonia Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 130.

nigroaenea Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 27; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 69 *(Canistra)*. — Columbien

1

Dolichotoma Hope.

Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 95 (Typus: *chloris* Hope). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 176. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 376. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 31. — Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 129.

aenea	Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 529 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 180 *(Dolichotoma)*. *Germari* Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, p. 129.	Brasilien
Bohemani	Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 602 *(Dolichotoma)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 90 (gen. dub.?).	Ecuador
clypeata	Boh. Mon. I, 1850, p. 184.	Brasilien
gloriosa	Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (n. s.) V, 1859, p. 160. — Boh. Mon. IV. 1862, p. 85.	Amazonas
inepta	Boh. Mon. I, 1850, p. 179.	Brasilien
lugens	Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 530 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 178 *(Dolichotoma)*.	,,
mitis	Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 182.	,,
spurca	Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 29; Mon. IV, 1862, p. 72.	Brasilien: Bahia, Minas Geraës

---

aterrima	Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 294, t. 134, f. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 525 *(Cassida)*.	(N. Amerika?)
chloris	Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 96, t. 4, f. 2 *(Dolichotoma)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 207 *(Dolichotoma)* [conf. Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 31 *(Dolichotoma)*].	St. Vincent

10

Glima Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 129.

mirabilis	Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 32; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 82 *(Dolichotoma)*.	Amazonas
satanas	Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 30 *(Dolichotoma)*.	,,

2

Prenea Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 129.

anomala	Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 87 *(Dolichotoma)*.	Ecuador
nigritarsis	Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 34; Mon. IV, 1862, p. 89 *(Dolichotoma)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 30 *(Dolichotoma)*.	Pernambuco
palliata	F. Mant. Ins. II, 1787, p. 380; Ent. Syst. I, 1792, p. 305; Syst. El. I, 1801, p. 407 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1634 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 388 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 347	Cayenne, Surinam

(Cassida). — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 288, t. 48, f. 5 *(Oxynodera longicornis).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 201 *(Dolichotoma).*
luctuosa Ol. Ent. VI, 1808, p. 930; 97, t. 4, f. 54 *(Cassida).*

perforata Boh. Mon. I, 1850, p. 206 *(Dolichotoma).* — Columbien
puberula Boh. l. c. p. 204 *(Dolichotoma).* — Guyana
sericata Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 *(Oxynodera).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 205 *(Dolichotoma).* — Bolivia
strigata Panz. in Voet, Beschreib. u. Abb. hartsch. Ins. 1798, p. 81, t. 42, f. 10 *(Cassida).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 202 *(Dolichotoma).* — Maulik 1916 P.Z.S. p. 579 — Amazonas, Goyaz, Para, Ecuador
similis Panz. l. c. p. 81, t. 42, f. 11 (♀) *(Cassida).*
tarsata Boh. Mon. I, 1850, p. 200 *(Dolichotoma).* — Bahia
tristis Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 *(Oxynodera).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 181 *(Dolichotoma).* — Bolivia, Peru
var. *stigmatica* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 30 *(Dolichotoma).* — Peru

9

Oxynodera Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 184 (Typus: *variegata* L.). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 83; Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 129.

Bia Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 31 (Typus: *variegata* L.).

Batesi Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 32; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 83 *(Dolichotoma).* — Amazonas, Ost-Peru
Bernhaueri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 364. — West-Cordilleren von Columbien
bihamata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 31; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 81 *(Dolichotoma).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 145. — Trinidad? Columbien?
binotata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 197 *(Dolichotoma).* — Para
biplagiata Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 290 *(Dolichotoma).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 193 *(Dolichotoma).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 143. — Columbien
ab. *smaragdina* Spaeth, l. c. p. 144.
var. *princeps* Boh. Mon. I, p. 195 *(Dolichotoma).*
ab. *coeruleipennis* Spaeth, l. c. p. 144.
bisbiplagiata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 31; Mon. IV, 1862, p. 80 *(Dolichotoma).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 133, t. 5, f. 16 *(Dolichotoma).* — Guatemala
Breiti Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 148. — Columbien
chlorosoma Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 31; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 79 *(Dolichotoma).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 144. — Para
coeruleata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 30; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 78 *(Dolichotoma).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 144. — Amazonas

— Ma.lik 1916 P.Z.S. p. [illegible] —

colliculus Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 189 (*Dolichotoma*).	Para
conspersipennis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 74 (*Dolichotoma*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 134, t. 5, f. 18 (*Dolichotoma*).	Zentral-Amerika
depilata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 191 (*Dolichotoma*).	Guyana
distigma Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 199 (*Dolichotoma*).	Para
distincta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 83 (*Dolichotoma*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 133, t. 5, f. 17 (*Dolichotoma*).	Nicaragua, Guatemala, Costa Rica
dromedarius Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 186 (*Dolichotoma*).	Para, unterer Amazonenstrom
ducalis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 198 (*Dolichotoma*).	Aequatorial-Brasilien
Ganglbaueri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 366.	Peru
Grayi Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 32; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 86 (*Dolichotoma*).	Unterer Amazonenstrom
hirsuta Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 101 (*Bia*).	Peru
Holdhausi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 368.	Bolivia
instabilis Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 59 (*Dolichotoma*).	Ecuador
lanuginosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 190 (*Dolichotoma*).	Venezuela, Columbien
Biologie: Candèze, Mém. Liége XVI, 1861, p. 387, t. 5, f. 4 (*Dolichotoma*).	
var. *pubescens* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 30; Mon. IV, 1862, p. 77 (*Dolichotoma*). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 273 (*Dolichotoma*).	
metallica Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 (*Dolichotoma*). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 192 (*Dolichotoma*).	Bolivia
miniata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 187 (*Dolichotoma*).	Nov. Granada
mirifica Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 30; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 76 (*Dolichotoma*).	Venezuela
multinotata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 52 (*Dolichotoma*).	Columbien, Cayenne, Surinam
nigropunctata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 188 (*Dolichotoma*).	Columbien
nigrosanguinea Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 53 (*Dolichotoma*).	,,
nigrosparsa Wgenr. l. c. p. 52 (*Dolichotoma*).	,,
obtusata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LVII, 1907, p. 142.	Brasilien
parvicollis Spaeth, l. c. p. 145.	Columbien
peruviana Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 196 (*Dolichotoma*).	Peru
ab. *unicolor* Spaeth, l. c. p. 144.	Ecuador
Pinkeri Spaeth, l. c. p. 147.	Bolivia
Salvini Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1864, p. 241 (*Dolichotoma*). — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 134, t. 15, f. 19, 20 (*Dolichotoma*).	Panama

Schusteri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 151. — Unterer Amazonenstrom

Skalitzkyi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXI, 1911, p. 243. — Columbien

spectanda Boh. Mon. IV, 1862, p. 75 *(Dolichotoma)*. — Columbien?

variegata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 303; Syst. El. I, 1801, p. 404 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 178 (Übers. Goeze 1781, p. 329), t. 15, f. 6 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 206 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 389; Ent. VI, 1808, p. 926; 97, t. 2, f. 22 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 286, t. 134, f. 3 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 185, t. 3, f. D *(Dolichotoma)*. — Cayenne, Surinam, Antillen

retusa Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 64 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 292, t. 134, f. 6 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 207.

Wingelmülleri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 150. — Columbien

---

tricolor Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 304, t. 135, f. 2 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 526 *(Cassida)* (gen. dubium). — Indien?

40

Vulpia Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 129.

latissima Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 82 *(Bia)*. — Peru

Mandli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 369 *(Oxynodera)*. — „

sericea Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 60 *(Dolichotoma)*. — Ecuador

speciosa Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 198, t. 5, f. 6 *(Dolichotoma)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 84 *(Dolichotoma)*. — Amazonas: Rio Jurna

4

Smodingonota Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 130.

carbonaria Klug, Preisverz. 1829, p. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 175 *(Canistra)*.

rugosa Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 *(Oxynodera)*.

tenebrosa Blanch. in d'Orbigny, Voy. Am. mér. Ins. 1837—45, p. 212, t. 24, f. 3 *(Discomorpha)*. — Brasilien, Paraguay, Bolivia, Columbien

dorsuosa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 70 *(Canistra)*. — Süd-Brasilien

2

Carlobruchia Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 244; Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 130.

Bruchia Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 153.

tricostata Spaeth, l. c. 1907, p. 154 *(Bruchia)*. — Salta, Juhuy, Tucuman

1

Canistra Er.

Er. Archiv für Naturgesch. XIII, 1847, p. 151 (Typus: *varicosa* Er.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 151. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 375. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 130.

Subgen. **Canistra** (s. str.).

bitorosa Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 460. — Brasilien

cruentata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 89. — Peru

Dohrni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 88. — Para

irrorata Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 *(Oxynodera)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 168, t. 3, f. C. — Mauhi: 1913 P.Z.S. p. 579 — — Brasilien, Bolivien, Misiones, Paraguay

Osculatii Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 602. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 71. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 336. — Amazonas, Ecuador, Peru, Columbia

procera Boh. Mon. I, 1850, p. 167. — Brasilien

varicosa Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152. — Boh. Mon. I, 1850, p. 175: Mon. IV, 1862, p. 68. — Peru

Subgen. **Canistrella** Spaeth.

Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 131 (Typus: *rubiginosa* Guér.).

calamitosa Boh. Mon. I, 1850, p. 169. — Bahia

contaminata Boh. l. c. p. 170. — ,,

plagosa Boh. l. c. p. 173. — Brasilien

rubiginosa Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 289 *(Oxynodera)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 172. — Brasilien, Uruguay

scoriosa Boh. Mon. I, 1850, p. 174. — Süd-Brasilien

---

formosa Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 639 (gen. dub.). — Neu-Seeland

13

Goniochenia Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 10 (Typus: *quadraticollis* Boh.).

Subgen. **Goniochenia** (s. str.).

difformis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 221 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

laticollis Boh. Cat. Ins. Col. Brit. Mus. IX, 1856, p. 37; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 99 *(Mesomphalia)*. — ,,

parvula Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 32. — Cayenne
quadraticollis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 219 *(Mesomphalia)*. — Brasilien
congener Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 222 (immatura) *(Mesomphalia)* (conf. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 396).
bituberculata Boh. Cat. Ins. Col. Brit. Mus. IX, 1856, p. 37 (monstr.); Mon. Cassid. IV, 1862, p. 101 *(Mesomphalia)* (conf. Spaeth, l. c. p. 396).
virgo Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 15. — Ost-Brasilien

Subgen. **Baranosa** Weise.

Weise, Archiv für Naturgeschichte LXV, 1899, I, p. 268.

Bang-Haasi Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 84. — Peru
Buckleyi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 63 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338. — Ecuador
decolor Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 268 (♀). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338 (♂). — Peru
elocata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 315 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338. — Columbien
var. *collocata* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 40 *(Mesomphalia)* (conf. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338). — „
var. *vittata* Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 269. — Spaeth, l. c. p. 338. — „
flavosparsa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 42; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 113 *(Mesomphalia)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 268. — Bolivia
humilis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 337. — Peru

11

Herissa Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 724.

pantherina Blanch. in d'Orbigny, Voy. Am. mér. Ins. 1837—43, p. 212, t. 24, f. 5 *(Chelymorpha)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 73 *(Chelymorpha)*. — Bolivien, Tucuman, Juhuy, Goyaz

1

Calaspidea Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 183 (Typus: *grossa* L.). — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 393. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 135. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 89.

andicola Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 90. — Peru
Bacchus Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 84. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 91. — Para, Peru, Columbien
Bohemani Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 198. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 94. — Para
colossa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 93. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 62 (var. ex Ecuador). — Peru, Ecuador

columbiana Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 212. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 135, t. 5, f. 21 (*columbina* err. typ.). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 91. — Columbien, Panama, Costa Rica

delicata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 96. — Ega

divalis Boh. l. c. p. 92. — „

grossa L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 577; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 304; Syst. El. I, 1801, p. 405 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. V, 1775, p. 176 (Übersetz. Goeze 1781, p. 328), t. 15, f. 5 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 206 *(Cassida)*. — Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, t. 3, f. 1 *(Cassida)*. — Roem. Gen. Ins. 1789, p. 6, t. 3, f. 1 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 389; Ent. VI, 1808, p. 926; 97, t. 1, f. 1 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 288, t. 130, f. 1 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 209. — Surinam, Cayenne

decussata F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 115; Mant. Ins. I, 1787, p. 66 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 392 *(Cassida)*. — Jamaica

imperialis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 35; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 91. — Oberer Amazonenstrom

paphia Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 95. — Patria?

regalis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 213. — Brasilien?

venosa F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 84; Syst. El. I, 1801, p. 405. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 322 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 211. — Cayenne, Surinam

12

Miocolaspis Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 270. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 92.

alurna Westw. Ann. Mag. Nat. Hist. VIII, 1842, p. 204 *(Calaspidea)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 99 *(Calaspidea)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 135 *(Calaspidea)*. — Ecuador

contacta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 61 *(Calaspidea)*.

latevittata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 92.

biplagosa Spaeth, l. c. p. 92. — Bolivia

gentilis Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152 *(Cyrtonota)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 383; IV, 1862, p. 167 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, l. c. p. 92. — Peru

conspersa Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 270.

3

Agenysa Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 91 (Typus: *caedemadens* Licht.).

caedemadens Licht. Cat. Mus. Hamb. 1795, p. 65 *(Cassida)*. — Cayenne, Amazonas, Para
bipustulata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 324, t. 136, f. 3 (nec L.!) *(Cassida)*.
cyanea De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 181 (Übers. Goeze 1781, p. 330), t. 51, f. 9 *(Cassida)*. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 302; Syst. El. I, 1801, p. 402 (nec L.!) *(Cassida)*.
discors Ol. Ent. VI, 1808, p. 938; 97, t. 4, f. 63 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 214 *(Calaspidea)*.
connectens Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 84 *(Calaspidea)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 91. — Amazonas, Ost-Peru
crassicornis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 94. — Columbien, Ecuador
Desmaresti Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 215 *(Calaspidea)*. — Bolivia
guyanensis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 36; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 97 *(Calaspidea)*. — Guyana
discors var. a Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 214 *(Calaspidea)*.
parellina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 216 *(Calaspidea)*. — Buenos Aires, Rio Grande do Sul
signaticollis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 36 Mon. Cassid. IV, 1862, p. 98 *(Calaspidea)*. — Patria?

7

Semaia Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 370.

compulsa Spaeth, l. c. p. 371. — Columbien

1

Mesomphalia Hope.

Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 94, t. 4, f. 1 (Typus: *gibbosa* F.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 218. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 394. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mittheil. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 62.

albofasciculata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 39; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 104. — Brasilien
ampliata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 229. — Bahia
denudata Boh. l. c. p. 227. — Brasilien
gibbosa F. Spec. Ins. I, 1781, p. 112; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 302; Syst. El. I, 1801, p. 403 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 *(Cassida)*. — Gl. Enc. méth. V, 1790, p. 388; Ent. VI, 1808, — „

p. 928; 97, t. 1, f. 6 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 346 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 223.

latipennis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 38; Mon. IV, 1862, p. 102. — Brasilien

nudoplagiata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 339. — ,,

pyramidata Boh. Mon. I, 1850, p. 230. — Columbien

retipennis Boh. l. c. p. 240. — Brasilien

scrobiculata Boh. l. c. p. 231. — ,,

sexmaculata Boh. l. c. p. 232. — ,,

sexmaculosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 38; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 103. — ,,

tumidula Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 224. — ,,

turrita Ill. Mag. Ins. I, 1801, p. 180 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 226. — ,,

variolaris Boh. l. c. p. 228. — ,,

14

Pseudomesomphalia Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 338; Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 131.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mittheil. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 62 *(Mesomphalia)*.

acuminata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 278 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

acuta Boh. l. c. p. 291 *(Mesomphalia)*. — ,,

aenea Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 391; Ent. VI, 1808, p. 937; 97, t. 4, f. 61 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 276 *(Mesomphalia)*. — Brasilien, Guyana

aeneovittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 144, t. 6, f. 15 *(Mesomphalia)*. — Nicaragua

alcyonea Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 246. — Brasilien

alta Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 34 *(Mesomphalia)*. — ,,

anceps Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 252 *(Mesomphalia)*. — ,,

annulosa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 34 *(Mesomphalia)*. — ,,

antiqua Sahlb. Peric. Ent. Spec. Ins. 1823, p. 56 *(Cassida)*. — Thon, Arch. II, 1829, p. 25. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 292 *(Mesomphalia)*. — ,,

nodipennis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 532 *(Cassida)*.

areolata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 533 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 253 *(Mesomphalia)*. — ,,

ab. *blanda* Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 253 *(Mesomphalia)*.

arula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 109 *(Mesomphalia)*. — Patria?

asema Boh. l. c. p. 112 *(Mesomphalia)*. — Venezuela

augur Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 61; Mon. IV, 1862, p. 172 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

aurosetosa Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 341. — Ecuador, Columbien

Balyi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 207 *(Mesomphalia)*. — Columbien

beatula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 129 *(Mesomphalia)*. — Ega

bicolorata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 368 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

bifenestrata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 53; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 144 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

bilineata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 358 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

bioculata Boh. Mon. I, 1850, p. 305 *(Mesomphalia)*. — „

blandifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 120 *(Mesomphalia)*. — Ecuador: Napo

boliviana Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 373. — Bolivia: Mapiri

brachiata F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 80; Syst. El. I, 1801, p. 393 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 351 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 371 *(Mesomphalia)*. — Cayenne, Brasilien

ab. *margineguttata* Boh. l. c. p. 372 *(Mesomphalia)*.

ab. *quadrinotata* Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 307, t. 135, f. 4 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 372 *(Mesomphalia)*.

ab. *transversalis* (Dej.) Boh. l. c. p. 372 *(Mesomphalia)*.

brevicollis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 335 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

Brunni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 95. — S. Paulo

callizona Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 372. — Peru: Chanchamayo

cassandra Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 250. — Peru: Yurimagua

castigata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 45 *(Mesomphalia)*; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 119. — Peru, Bolivia

chalybaea Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 532 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 248 *(Mesomphalia)*. Maulik 1916 P.Z.S. p. 535 — Östl. Brasilien

var. *cupreata* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 244. — Paraguay

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 168, t. 6, f. 3 *(Canistra)*. — Spaeth, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 166.

Chapuisi Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 36 *(Mesomphalia)*. — Ecuador

clathrata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 95. — Peru: Chanchamayo

coalita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 136 *(Mesomphalia)*. — Peru, Ecuador

coeruleonotata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 376 *(Mesomphalia)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 143 *(Mesomphalia)*. — Mexico

coerulescens Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 330 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

confusa Boh. l. c. p. 275 *(Mesomphalia)*. — Cayenne

consanguinea Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 91 *(Mesomphalia)*. — Ost-Peru: Chanchamayo

consobrina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 258 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

consociata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 68 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

conspersa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 534 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 247 *(Mesomphalia)*. — Südost-Brasilien

contubernalis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 48; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 128 *(Mesomphalia)*. — Bahia

aenea var. b Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 276 *(Mesomphalia)*.

cordata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 35 *(Mesomphalia)*. — Peru

corruptiva Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 248. — „

costaricensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 140, t. 6, f. 4 *(Mesomphalia)*. — Costa Rica

croceovittata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 345. — Bolivia

cruentata Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152 *(Cyrtonota)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 382; IV, 1862, p. 123 *(Mesomphalia)*. — Peru

cucullata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 135. — Bolivia

decemguttata Sturm in Thon, Abbild. ausl. Ins. Käf. 1826—28, p. 2, t. 1, f. 3 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 321 *(Mesomphalia)*. — Columbien, Aequatorial-Brasilien

Maulik 1916 P.Z.S. p. 270 —

deleta Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 452 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

delecta Boh. (err. typogr.) l. c. p. 363 *(Mesomphalia)*.

demissa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 47; Mon. IV, 1862, p. 127 *(Mesomphalia)*. — Bahia

aenea var. a Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 276 *(Mesomphalia)*.

deplorabunda Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 41; Mon. IV, 1862, p. 111 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

dilatata F. Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 370 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

discoides L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 364; ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 319, t. 135, f. 11 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 306 *(Mesomphalia)*. — Cayenne, Aequatorial-Brasilien, Peru

Maulik 1916 P.Z.S. p. 270 —

discoidea F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 306; Syst. El. I, 1801, p. 407 *(Cassida)*.

quadrimaculata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, (Übers. Goeze 1781, p. 331), p. 183, t. 15, f. 11 *(Cassida)*.

ab. *didyma* Ol. Ent. VI, 1808, p. 941; 97, t. 4, f. 64 *(Cassida)*.

decussata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 320, t. 135, f. 12 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 382 *(Mesomphalia)*.

discoidea Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 391; Ent. VI, 1808, p. 936; 97, t. 2, f. 18 *(Cassida).*
discoides var. b Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 307 *(Mesomphalia).*
subspec. *bipustulata* L. Amoen. Acad. VI, 1763, p. 392; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1643 *(Cassida).* — F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Syst. El. I, 1801, p. 407 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 391; Ent. VI, 1808, p. 938; 97, t. 3, f. 35 *(Cassida).* — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 409 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 303 *(Mesomphalia).* — Peru
tetrastigma Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 65 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 318, t. 135, f. 10.
ab. *cuprea* F. Mant. Ins. App. 1787, p. 308; Ent. Syst. I, 1792, p. 306; Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida).* — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1643 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 388 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 321, t. 136, f. 1 *(Cassida).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 304 *(Mesomphalia).*
ab. *phlyctaena* Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 65 *(Cassida).*
discors F. Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 304 (*Mesomphalia bipustulata* var. d).
ab. ? *pavonina* Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 65 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 322, t. 136, f. 2 *(Cassida).*
ab. ? *nitidula* Ol. Ent. VI, 1808, p. 939; 97, t. 1, f. 4 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 382 *(Mesomphalia).*
ab. *duodecim-pustulata* Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 393; Ent. VI, 1808, p. 940; 97, t. 3, f. 39 *(Cassida).* — F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 85; Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 354 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 304 *(Mesomphalia bipustulata* var. i).
subspec. *chalcoptera* Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 270 *(Mesomphalia).* — Columbien, Venezuela
subspec. *subopaca* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 38. — Peru, Ecuador

diversa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 243 *(Mesomphalia).* — Brasilien
duricoria Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 151 *(Mesomphalia).* — Peru
emorsitans Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 67 *(Mesomphalia).* — Ecuador
Erichsoni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 242. — Peru: Callanga
eugenea Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 154 *(Mesomphalia).* — Peru
extricata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 336 *(Mesomphalia).* — Columbien, Venezuela
falcifera Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 64; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 175 *(Mesomphalia).* — Brasilien

fasciculata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 236 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
fasciculosa Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 372.	Pernambuco
fenestrata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 37 *(Mesomphalia)*.	Cayenne
ab. *immaculata* Wgenr. l. c. p. 69 *(Mesomphalia)*.	„
festiva Klug, Preisverz. 1829, p. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 328 *(Mesomphalia)*.	Südbrasilien, Argentinien, Montevideo
ab. *aureomarginata* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 58; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 163 *(Mesomphalia)*.	Montevideo
flavipennis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 364 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
flavofenestrata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 133 *(Mesomphalia)*.	Venezuela
var. *impubis* Boh. l. c. p. 147 *(Mesomphalia)*.	„
flavoguttata Boh. Mon. I, 1850, p. 295 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
flavomaculata F. Syst. El. I, 1801, p. 406 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 313 *(Mesomphalia)*.	Guyana
flavonotata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p.50; Mon. IV, 1862, p. 138 *(Mesomphalia)*.	Pernambuco
flavoreticulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 45; Mon. IV, 1862, p. 118.	Bolivia
floccosa Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152 *(Cyrtonota)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 383; IV, 1862, p. 124 *(Mesomphalia)*.	Peru
subsp. *zonata* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 96.	Peru: Chanchamayo
fossulata Boh. Mon. I, 1850, p. 241 *(Mesomphalia)*.	Ostbrasilien
funebris Boh. Mon. I, 1850, p. 308 *(Mesomphalia)*. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 275 *(Mesomphalia)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 243.	Peru, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Corrientes
glabricollis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 239 *(Mesomphalia)*.	Bahia
Godeti Boh. l. c. p. 244 *(Mesomphalia)*.	Brasilien: St. Catharina
haematites Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 66 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 280, t. 133, f. 12.	Brasilien, Cayenne, Montevideo
varians F. Syst. El. I, 1801, p. 405 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 366 *(Mesomphalia)*.	
rufescens Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 283, t. 134, f. 1 *(Cassida)*.	
Haroldi Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 60 *(Mesomphalia)*.	Chile (?)
Hermanni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 251.	Ecuador, Peru
honorata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 85 *(Mesomphalia)*.	Bolivia
honorifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 107 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
huanocensis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 344.	Peru

hypocrita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 153 *(Mesomphalia).* — Peru

Iheringi Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 154. — San Paulo

ignita Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 267 *(Mesomphalia).* — St. Catharina

illustris Chevr. Col. Mexique 1834—42, Cent. I, fasc. 3, nr. 81 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 320 *(Mesomphalia).* — Mexico bis Nicaragua

imitans Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 155. — Peru, Bolivia

imparilis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 130 *(Mesomphalia).* — Brasilien

imperialis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 538 *(Mesomphalia).* — Minas Geraës

implexa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 260 *(Mesomphalia).* — Brasilien

impluviata Boh. l. c. p. 255 *(Mesomphalia).* — „

impudens Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 40; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 106 *(Mesomphalia).* — „

inaequalis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 364; ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida).* — F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 305; Syst. El. I, 1801, p. 406 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 390; Ent. VI, 1808, p. 936; 97, t. 3, f. 49 a, b *(Cassida).* — Panz. in Voet, Beschr. u. Abbild. 1798, p. 78, t. 41, f. 2 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 316, t. 130, f. 4 *(Cassida).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 282 *(Mesomphalia).* — Aequatorial-Süd-Amerika

bimaculata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 182 (Übers. Goeze 1781, p. 330), t. 15, f. 10 *(Cassida).*

lateralis Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 29, t. 3, f. 2 a *(Cassida).* — Roem. Gen. Ins. 1789, p. 6, t. 3, f. 2 a (nec L.!) *(Cassida).*

lunata Thunbg. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 88, t. 5, f. 99 *(Cassida).*

inaurata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 275 *(Mesomphalia).* — Tucuman, Salta

inca Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 342. — Peru

incarnata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 369 *(Mesomphalia).* — Cayenne

indigacea Boh. l. c. p. 327. *(Mesomphalia).* — Bolivia

inermis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 156 *(Mesomphalia).* — Ecuador: Napo

inexculta Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 121 *(Mesomphalia).* — Peru

informis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 165 *(Mesomphalia).* — Ecuador: Napo

interjecta Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 66 *(Mesomphalia).* — Ecuador

isthmica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 143, t. 6, f. 12—14 *(Mesomphalia).* — Costa Rica, Panama

jucunda Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 319 *(Mesomphalia).* — Cayenne

Kolbei Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 155. — Ecuador

Kollari Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 331 *(Mesomphalia).* — Brasilien

Kraatzi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 174 *(Mesomphalia).* — Peru

lacertosa Boh. l. c. p. 164 *(Mesomphalia).* — „

Lacordairei Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 353 *(Mesomphalia).* — Buenos Aires, Tucuman, Süd-Brasilien

var. *subrugosa* Boh. l. c. p. 354 *(Mesomphalia).* — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 275 *(Mesomphalia).* — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 16 *(Mesomphalia).* — Buenos Aires

var. *tucumana* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLI, 1911, p. 246. — Tucuman

lacunosa Boh. Mon. I, 1850, p. 235 *(Mesomphalia).* — Bahia

lata Boh. l. c. p. 323 *(Mesomphalia).* — Bolivia

latevittata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 152 *(Mesomphalia).* — Peru, Ecuador

ab. *latissima* Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 68 *(Mesomphalia).* — Ecuador

subsp. *puberula* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 54 *(Mesomphalia)*; Mon. IV, 1862, p. 148. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 60 *(Mesomphalia).*

Lebasi Boh. Mon. I, 1850, p. 290 *(Mesomphalia).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 139, t. 6, f. 1, 3 *(Mesomphalia).* — Columbien, Zentral-Amerika

var. *primaria* Boh. Mon. I, 1850, p. 289 *(Mesomphalia).* — Champ. l. c. p. 139, t. 6, f. 2 *(Mesomphalia).* — Zentral-Amerika

lenis Boh. Mon. I, 1850, p. 246 *(Mesomphalia).* — Brasilien

lineatocollis Boh. l. c. p. 333 *(Mesomphalia).* — „

Biologie: Donckier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 160, t. 3, f. 13—19 *(Mesomphalia).*

luctuosa Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 273 *(Mesomphalia).* — Ost-Brasilien

lugens Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 95. — Peru: Chanchamayo, Bolivia

luteipennis Boh. Mon. I, 1850, p. 357 *(Mesomphalia).* — Brasilien

Mannerheimi Boh. l. c. p. 281 *(Mesomphalia).* — Peru, Ecuador

subsp. *fastuosa* Boh. Mon. I, 1850, p. 383; IV, 1862, p. 132 *(Mesomphalia).*

illustris Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152.

marginata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 207 *(Mesomphalia).* — Ecuador, Huambrya

marginevittata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 60 *(Mesomphalia).* — Ecuador: Chimborazzo

Marthae Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 343. — Peru

misella Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 374 *(Mesomphalia).* — Bahia

modesta Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 36 *(Mesomphalia).* — Ecuador

modica Boh. Mon. I, 1850, p. 293 *(Mesomphalia).* — Brasilien

murina Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 247. — Ecuador: Cañelos

Nickerli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 339. — Brasilien

nudicollis Boh. Mon. I, 1850, p. 234 *(Mesomphalia).* — „

ab. *Sancti-Spiritus* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 340. — Espirito Santo

oblita Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 259 *(Mesomphalia).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 273 *(Mesomphalia).* — Ost-Brasilien

ab. *illepida* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 44; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 117 *(Mesomphalia).*	Brasilien
ab. *inornata* Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 257 *(Mesomphalia).*	St. Catharina
ab. *lucida* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 43; Mon. IV, 1862, p. 115 *(Mesomphalia).*	,,
obscura Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 91 *(Mesomphalia).*	Peru
obvoluta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 168 *(Mesomphalia).*	,,
opaca Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 51; Mon. IV, 1862, p. 139 *(Mesomphalia).*	Bolivia
pallidoguttata Blanch. in d'Orbigny, Voy. Am. mér. Col. 1837—45, p. 212, t. 24, f. 4 *(Cyrtonota).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 322 *(Mesomphalia).*	,,
subsp. *octosignata* Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 155.	Amazonas, Rio Juntas
parva Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 40 *(Mesomphalia).*	Ecuador
Pascoei Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 65 *(Mesomphalia).*	,,
pauperula Baly, l. c. p. 62 *(Mesomphalia).*	,,
pectinata Baly, l. c. p. 64 *(Mesomphalia).*	,,
periucunda Baly, l. c. p. 66 *(Mesomphalia).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 252.	,,
pertusa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 373 *(Mesomphalia).*	Columbien
pictilis Boh. l. c. p. 377 *(Mesomphalia).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 142, t. 6, f. 9—11 *(Mesomphalia).*	Mexico bis Columbien
placida Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 249.	Peru: Chanchamayo
plagiata Boh. Mon. I, 1850, p. 312 *(Mesomphalia).*	Columbien,
Salvini Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 242. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 141, t. 6, f. 7, 8 *(Mesomphalia).*	Costa Rica, Panama
plagicollis Boh. Mon. I, 1850, p. 360 *(Mesomphalia).*	Brasilien
pleurosticha Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152 *(Cyrtonota).* — Boh. Mon. I, 1850, p. 274 *(Mesomphalia).*	Peru
subsp. *sulfurata* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 97.	Peru: Chanchamayo
praestigiatrix Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 214 *(Mesomphalia).*	Ecuador, Columbien
blanda Boh. Mon. Cassid. I, 1856, p. 277 *(Mesomphalia).*	
pubipennis Boh. Mon. IV, 1862, p. 146 *(Mesomphalia).*	Patria?
pullata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 245.	Espirito Santo
punicea Boh. Mon. I, 1850, p. 287 *(Mesomphalia).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 137, t. 5, f. 23, 24 *(Mesomphalia).*	Zentral-Amerika
var. *Chevrolati* Boh. Mon. I, 1850, p. 285 *(Mesomphalia).* — Champ. l. c. p. 137, t. 5, f. 25 *(Mesomphalia).*	

subspec. *elegans* Boh. Mon. I, 1850, p. 284. — Champ. l. c. p. 137, t. 5, f. 26 *(Mesomphalia)*. — Pacific-Küste von Mexiko, Guatemala, Nicaragua

quadriguttata Champ. l. c. p. 141, t. 6, f. 6 *(Mesomphalia)*. — Nicaragua: Chontales

quadriplagiata Boh. Mon. I, 1850, p. 299 *(Mesomphalia)*. — Brasilien: Misiones

quatuordecim-signata Boh. Mon. I, 1850, p. 338 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

quinquefasciata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 60 *(Mesomphalia)*. — Columbien

Redtenbacheri Boh. Mon. I, 1850, p. 280 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

reticularis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 303; Syst. El. I, 1801, p. 404 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 205 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 389; Ent. VI, 1808, p. 927; 97, t. 4, f. 51 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 295, t. 130, f. 3 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 317 *(Mesomphalia)*. — Cayenne

ornata Herbst in Füessly, Arch. Ins. IX, 1783, p. 50, t. 22, f. 30 *(Cassida)*.

punctata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 180 (Übers. Goeze 1781, p. 330), t. 15, f. 8 *(Cassida)*.

ab. *annulata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. 1792, I, p. 304; Syst. El. I, 1801, p. 405 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 389 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 291, t. 134, f. 5 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 318 *(Mesomphalia)*.

var. *hieroglyphica* Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 296, t. 134, f. 8 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 942; 97, t. 2, f. 27 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 318 *(Mesomphalia)*.

var. *retiformis* F. Mant. Ins. II, App. 1787, p. 380; Ent. Syst. I, 1792, p. 304; Syst. El. I, 1801, p. 405 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1634 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387; Ent. VI, 1808, p. 928; 97, t. 4, f. 52 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 347 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 318 *(Mesomphalia)*.

retis Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 40 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

retusa Wgenr. l. c. p. 35 *(Mesomphalia)*. — „

rubicundula Boh. Cat. Ins. Col. Brit. Mus. IX, 1856, p. 47; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 126 *(Mesomphalia)*. — Peru

rubroreticulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 57; Mon. IV, 1862, p. 157 *(Mesomphalia)*.	Columbien
rufocincta Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 39 *(Mesomphalia)*.	Nov. Friburg
rufosignata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 339 *(Mesomphalia)*.	Bolivia
Saundersi Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 56; Mon. IV, 1862, p. 155 *(Mesomphalia)*.	Ecuador: Quito
Schaumi Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 332 *(Mesomphalia)*.	Brasilien, Cayenne
var. *immarginata* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 374.	Surinam
scoparia Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 152 *(Cyrtonota)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 382; IV, 1862, p. 145 *(Mesomphalia)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 242.	Peru
serricornis Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 38 *(Mesomphalia)*.	Ecuador
sexplagiata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 298 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
sexsignata Boh. Mon. I, 1850, p. 254 *(Mesomphalia)*.	„
sexstillata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 42; Mon. IV, 1862, p. 114 *(Mesomphalia)*.	„
silaceipennis Boh. Mon. IV, 1862, p. 169 *(Mesomphalia)*.	„
Silbermanni Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 269 *(Mesomphalia)*. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 274 *(Mesomphalia)*.	Paraguay, Corrientes
sodalis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 375 *(Mesomphalia)*.	Venezuela
Sommeri Boh. Mon. I, 1850, p. 251 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
Stevensi Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 41; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 108 *(Mesomphalia)*.	„
stragula Boh. Mon. IV, 1862, p. 158 *(Mesomphalia)*.	Peru
sublaevis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 233 *(Mesomphalia)*.	Rio Janeiro
submetallica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 242.	Peru
subnotata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 262 *(Mesomphalia)*	Brasilien
subreticulata Boh. Mon. I, 1850, p. 261 *(Mesomphalia)*.	„
suspiciosa Boh. l. c. p. 361 *(Mesomphalia)*.	Rio Janeiro
suturalis F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 219; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 299; Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 399 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 365 *(Mesomphalia)*.	Cayenne, Aequatorial-Brasilien
thoracica Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 39 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
Thoreyi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 131 *(Mesomphalia)*.	„
tumulus Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 268 *(Mesomphalia)*.	St. Catharina
verecunda Boh. Mon. I, 1850, p. 297 *(Mesomphalia)*.	Corrientes
vetula Boh. l. c. p. 237 *(Mesomphalia)*.	Bahia
vicina Boh. l. c. p. 329 *(Mesomphalia)*.	Rio Grande, Argentinien

vidua Boh. l. c. p. 242 *(Mesomphalia)*. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 274 *(Mesomphalia)*. — Paraguay, Corrientes

vorax Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 241. — Peru

Wageneri nom. nov. — Paraguay
cuprea Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. 1881, p. 37 *(Mesomphalia)*.

xanthospila Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 140, t. 6, f. 5 (♂) *(Mesomphalia)*. — Guatemala

---

chelidonaria Demay, Rev. Zool. 1838, p. 23 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 488 *(Cassida)*. — Guyana

ephippium Licht. Cat. Hamb. Mus. 1795, p. 65 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 310, t. 135, f. 6 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 310 *(Mesomphalia)*. — Nordamerika

Mellyi Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 314 *(Mesomphalia)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 143 *(Mesomphalia)*. — Mexico

metallica Demay, Rev. Zool. 1838, p. 23 *(Cassida)*. — Boh. Mon. IV, 1862, p. 488 *(Cassida)*. — Guyana

189

Neomphalia Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 131.

Subgen. **Neomphalia** s. str.

adspersa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 255 *(Mesomphalia)*. — Brasilien, Para, Amazonas

assimilis Boh. l. c. p. 266 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

Bang-Haasi Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 84 *(Pseudomesomphalia)*. — Peru: Marcapata

bistigma Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 52; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 141 *(Mesomphalia)*. — Bolivia, Misiones

calvata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 162 *(Mesomphalia)*. — Peru

caudata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 272 *(Mesomphalia)*. — Columbien

conglomerata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 163 *(Mesomphalia)*. — Brasilien: Cassapava

cruda Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 154. — Bolivia: Chaco

cyanea L. Mus. Lud. Ulr. 1764, p. 39; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 577; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 112; Mant. Ins. I, 1787, p. 65 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 207. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 344 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 325 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

deliciosa Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 62 *(Mesomphalia)*. — Ecuador

dimidiata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 302 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

dissecta Boh. l. c. p. 316 *(Mesomphalia)*.	Columbien
Goryi Boh. l. c. p. 300 *(Mesomphalia)*.	Columbien
huallagensis Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 149.	Peru
Jekeli Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 52; Mon. IV, 1862, p. 143 *(Mesomphalia)*.	Amazonas
inspicata Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 153.	Bolivia
lateralis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 364; ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 305; Syst. El. I, 1801, p. 407 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 183 (Übers. Goeze 1781, p. 331), t. 15, f. 12 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. 1790, p. 391; Ent. VI, 1808, p. 937; 97, t. 4, f. 62 *(Cassida)*. — Panz. in Voet, Beschr. u. Abb. 1798, p. 87, t. 43, f. 24 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 315, t. 130, f. 5 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 301 *(Mesomphalia)*.	Cayenne, Surinam, Para
lojana Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 151.	Ecuador: Loja
lurida Spaeth, l. c. 1913, p. 150.	Columbien
moderata Spaeth, l. c. 1913, p. 152.	Columbien: Manizales
paupertina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 161 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 151 (var. ex Ecuador).	Peru, Ecuador
pavens Spaeth, l. c. p. 152.	Columbien
plumbea Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 531 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 294 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
poecilaspoides Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 69 *(Mesomphalia)*.	Ecuador
punctatissima Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 340 *(Pseudomesomphalia)*.	Venezuela
quadrinotata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 135 *(Mesomphalia)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 140 *(Mesomphalia)*.	Costa Rica
Schneideri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 376 *(Pseudomesomphalia)*.	Peru: Chanchamayo
serinus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 153 *(Cyrtonota)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 383; IV, 1862, p. 142 *(Mesomphalia)*.	Peru, Bolivia, Columbien
var. *smaragdina* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 51; Mon. IV, 1862, p. 141 *(Mesomphalia)*.	Bolivia, Peru
sexguttata Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 150.	Pernambuco
sexpustulata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 306; Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1643 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 392; Ent. VI, 1808, p. 939; 97, t. 3, f. 26 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 263 *(Mesomphalia)*.	Brasilien
ab. *pavonacea* nom. nov. *pavonina* Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 264 (nec Licht.!).	

similata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 265 *(Mesomphalia).* Bahia
Steinheili Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 53 *(Mesomphalia).* Columbien
textilis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 271 *(Mesomphalia)* „
thalassina Boh. l. c. p. 326 *(Mesomphalia).* Brasilien
tigrina Boh. l. c. p. 351 *(Mesomphalia).* Columbien
tomentosa Boh. l. c. p. 309 *(Mesomphalia).* Columbien,
ab. *meridensis* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 345 *(Pseudomesomphalia).* Venezuela
trigonata Spaeth, l. c. p. 343 *(Pseudomesomphalia).* Ecuador: Quito
tristigma Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 286 *(Mesomphalia).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 138, t. 5, f. 27, 28 *(Mesomphalia).* Zentral-Amerika
verrucosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 46; Mon. IV, 1862, p. 122 *(Mesomphalia).* Bahia, Pernambuco
viridicoerulea Boh. Mon. IV, p. 159 *(Mesomphalia).* Peru
vulnerata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 249 *(Mesomphalia).* — Manlik 1916 P.Z.S. p. 570 — Brasilien
ab. *subpustulata* Boh. Mon. I, 1850, p. 250 *(Mesomphalia).*

Subgen. **Trilaccodea** Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 98.

excisa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 55; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 149 *(Mesomphalia).* Columbien
Langei Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 98 *(Trilaccodea).* Ost-Peru: Chanchamayo

43

Championaspis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 133.

nigrolineata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 146, t. 6, f. 17 (♂). *(Mesomphalia).* Costa Rica, Panama,
var. *interrupta* Champ. l. c. p. 146, t. 6, f. 18 (♀) *(Mesomphalia).* Costa Rica

1

Xenicomorpha Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 137.

scapularis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 127 *(Omoplata).* Bolivia, Peru

1

Poecilaspis Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 159 (Typus: *16-pustulata* F.). — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 383. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 396. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 134.

Subgen. **Poecilaspis** (s. str.).

aegrota Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 399.	Brasilien
angulata Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 541 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 410.	Argentinien, Süd-Brasilien, Paraguay
anthracina Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 71; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 191.	Brasilien
bicruciata Boh. Cat. p. 67; Mon. IV, 1862, p. 181.	„
Boggianii Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 577.	Paraguay
bonariensis Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 396.	Argentinien: Tucuman, Misiones
var. *macularia* Boh. Mon. I, 1850, p. 393. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 277.	
cancellata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 415.	Tucuman
coniuncta Boh. Mon. I, 1850, p. 406 (var. ex Campos Geraës).	Parana
decem-notata Boh. l. c. p. 423.	Süd-Brasilien, Montevideo
decem-pustulata Boh. l. c. p. 416. Maulik 1916 P.Z.S. p. 5[illegible] —	Argentinien
decem-verrucata Boh. l. c. p. 422.	Bolivia, Tucuman, Salta
dignitosa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 187.	Brasilien
ducalis Boh. Mon. I, 1850, p. 397.	Süd-Brasilien, Nord-argentinien
duodecim-notata Boh. l. c. p. 425.	Süd-Brasilien
duodecim-verrucata Boh. l. c. p. 424.	Argentinien, Süd-Brasilien, Montevideo
encausta Boh. l. c. p. 430.	Brasilien
Erichsoni Boh. l. c. p. 407.	„
fastidita Boh. l. c. p. 426.	„
finitima Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 68; Mon. IV, 1862, p. 185.	Brasilien, Paraguay
haematodes Perty, Delect. Anim. 1830—34, p. 102, t. 20, f. 11 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 398.	Amazonas
impressa Panz. in Voet, Beschreib. u. Abb. IV, 1798, p. 80, t. 42, f. 7 *(Cassida)*.	Brasilien
haemaspis Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 228 *(Cassida)*.	
impressipennis Boh. Mon. I, 1850, p. 385.	Süd-Brasilien, Goyaz
intricata Boh. l. c. p. 395.	Brasilien,
ab. *concinna* Boh. l. c. p. 395.	Bolivia
invasa Boh. l. c. p. 427.	Bolivia
miniata Kolbe, Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 12.	Paraguay
multipicta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 189.	Brasilien
nervosa F. Syst. El. I, 1801, p. 405 *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ent. V, 1806, p. 228 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 386. — Maulik 1916 P.Z.S. p. [illegible] —	Brasilien, Paraguay
nigropicta Boh. l. c. p. 402.	Brasilien

octoplagiata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 379.	Tucuman, Salta
octopustulata Klug, Preisverz. 1829, p. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 417.	Argentinien, Süd-Brasilien
ordinata Boh. l. c. p. 389.	Columbien, Panama
Steindachneri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 97.	
ab. *haemaptera* Spaeth, l. c. p. 97.	
ornata Boh. Mon. I, 1850, p. 412.	Brasilien
pantherina Klug, Preisverz. 1829, p. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 413. — Maulik 1916 P.Z.S. p. 530 —	„
ab. *duodecim-maculata* Boh. l. c. p. 414.	
pardalina Boh. l. c. p. 429.	„
pavonia Boh. l. c. p. 409.	„
pictipennis Boh. l. c. p. 391.	Columbien
planidorsis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 184.	Brasilien
planipennis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 215.	Tucuman, Salta
polysticta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 183.	Brasilien
porcata Boh. Mon. I, 1850, p. 394.	Parana
quatuordecim-plagiata Boh. l. c. p. 420.	Chiquitos, Bolivia
quatuordecim-signata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 70; Mon. IV, 1862, p. 188.	Brasilien
quinquefasciata Perty, Delect. Anim. Bras. 1830—34, p. 103, t. 20, f. 14 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 405, t. 4, f. A.	Amazonas, Ypiranga, Parana
regina Boh. Mon. IV, 1862, p. 178.	Ega, Ost-Peru
rubricollis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 67; Mon. IV, 1862, p. 180.	Brasilien
rubrodelineata Boh. Mon. I, 1850, p. 392.	„
rubroguttata Boh. l. c. p. 421.	Brasilien, Paraguay
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 200, t. 9, f. 24 a—c.	
rudepunctata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 378.	Paraguay: Chaco
ruforeticulata Boh. Mon. I, 1850, p. 390.	Brasilien
sanguinea Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 377.	Paraguay: Chaco
sedecim-maculata Boh. Mon. I, 1850, p. 408.	Brasilien
sedecim-pustulata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 115 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 392; Ent. VI, 1808, p. 940; 97, t. 3, f. 41 *(Cassida)*. — Boh. Mon. I, 1850, p. 418. *(Physonota)*.	Brasilien, Argentinien, Bolivia, Paraguay
sedecim-punctata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 307; Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 349 *(Cassida)*.	
segnis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 182.	Brasilien
semiglobosa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 60.	„
subnervosa Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 388.	Corrientes
tesselata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 276.	Tucuman
texta Boh. Mon. I, 1850, p. 387.	Brasilien
victa Boh. Mon. IV, 1862, p. 179.	Peru
xanthoptera Boh. Mon. I, 1850, p. 402.	Brasilien

Subgen. **Poecilaspidella** Spaeth.

Spaeth, Archiv. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 135 (Typus: *proxima*).

Bruchi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 381 *(Poecilaspis)*. — Argentinien

var. *conviva* Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 157. — Paraguay

duplicata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 423 *(Poecilaspis)*. — Brasilien, Columbien

histrio Boh. Mon. I, 1850, p. 432 *(Poecilaspis)*. — Süd-Brasilien, Paraguay, Nord-Argent.

nigritarsis Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 158. — Montevideo

proxima Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 435 *(Poecilaspis)*. — Brasilien

vittifera Boh. l. c. p. 434 *(Poecilaspis)*. — Montevideo, La Plata

65

Nebraspis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 134 (Typus: *corticina* Boh.).

corticina Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 401 *(Poecilaspis)*. — Brasilien, Paraguay

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 169, t. 6, f. 4 *(Poecilaspis)*.

luteicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 252 *(Poecilaspis)*. — Parana

2

Anepsiomorpha Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 135.

deplanata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 403 *(Poecilaspis)*. — Chiquitos, Tucuman

1

Amythra Spaeth.

Spaeth, Archiv. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 135 (Typus: *valida* Boh.).

reticulata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 50 *(Cassida)*. — Goyaz (nicht Buenos Aires!)

retifera Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 136.

valida Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 291 *(Coptocycla)*. — Brasilien

2

Terpsis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 132.

quadrivittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 145, t. 6, f. 16 (♂) *(Mesomphalia)*. — Nicaragua, Costa Rica

1

Hilarocassis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 133.

albida Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 539 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 378 *(Mesomphalia)*. — Brasilien

evanida Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 381 *(Mesomphalia)*. Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 146 *(Mesomphalia)*. — Columbien bis Mexiko

exclamationis L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p 577; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 114; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 305; Syst. El. I, 1801, p. 406 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 207 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 350; Ent. VI, 1808, p. 947; 97, t. 1, f. 16 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 253, t. 131, f. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 379 *(Mesomphalia)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 145 *(Mesomphalia)*. — Mexico bis Brasilien, Antillen

quinquelineata Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 156. — Minas Geraës

suturella Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 431 *(Poecilaspis)*. — Brasilien

5

Zatrephina Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 720 (Typus: *imperialis* Guér).

atrofasciata Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 345 *(Mesomphalia)*. — Chiquitos

atrorubra Guér. Icon. Règne Anim. Ins II, 1844, p. 290 *(Chelymorpha)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 349 *(Mesomphalia)*. — Bolivia

flavosignata Boh. Mon. I, 1850, p. 347 *(Mesomphalia)*. — Bolivia?

imperialis Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 290 *(Chelymorpha)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 69 *(Chelymorpha)*. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 279 *(Chelymorpha)*. — Bolivia, Argentinien, Uruguay

discedens Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1879, p. 453 *(Poecilaspis)*.

ab. *graphiptera* Boh. Mon. II, 1854, p. 85 *(Chelymorpha)*.

lineata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 305; Syst. El. I, 1801, p. 406 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 390 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 252, t. 131, f. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 361 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 731. — Brasilien, Columbien, Cayenne (nicht Cap!)

obsoleta Ol. Ent. VI, 1808, p. 948; 97, t. 5, f. 70 *(Cassida)*.

meticulosa Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 721. — S. Paulo

obsolescens nom. nov. — Bolivia

obsoleta Boh. Mon. I, 1850, p. 344 *(Mesomphalia)*.

princeps Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 68 *(Chelymorpha)*. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 279 *(Chelymorpha)*. — „

rubrescens Boh. Mon. I, 1850, p. 346 *(Mesomphalia).* Bolivia
rubroplagiata Boh. l. c. p. 341 *(Mesomphalia).* „
sexlunata Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 350 *(Mesomphalia).* Brasilien, Paraguay, Bolivia, Chiquitos

var. *atroguttata* Boh. Mon. I, 1850, p. 342 *(Mesomphalia).* Bolivien
var. *haematina* Boh. l. c. p. 337 *(Mesomphalia).* Chiquitos
var. *picturata* Boh. l. c. p. 340 *(Mesomphalia).* Bolivien
11

Eutheria Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 723.

piperata Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 279 *(Chelymorpha).* — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 723. Montevideo
1

Anacassis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 139.

atomaria Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 209 *(Physonota).* Brasilien
bipunctata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 62 *(Physonota).* Mendoza
Bruchi Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 161. Nord-Argent.: Misiones
brunnea Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 62 *(Physonota).* Brasilien
candida Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 217 *(Physonota).* „
cribrum Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 356 *(Mesomphalia).* „
dubia Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 235 *(Physonota).* „

seriata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 61; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 171 *(Mesomphalia)* (conf. Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 140).

exarata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 213 *(Physonota).* „
Fiebrigi Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 160. Paraguay
fuscata Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 208 *(Physonota).* Brasilien, Paraguay, Argentinien

subspec. *unicolor* Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 279 *(Physonota).* Mendoza, West-Argentinien

ingrata Boh. Mon. II, 1854, p. 216 *(Physonota).* Tucuman
languida Boh. l. c. p. 211 *(Physonota).* Brasilien
maculatissima Boh. Mon. Cass. I, 1850, p. 369 *(Mesomphalia).* „
nigritarsis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 218 *(Physonota).* Chiquitos
notativentris Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 62 *(Physonota).* Brasilien

prolixa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 214 *(Physonota)*. Buenos Aires
punctatissima Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 160. Goyaz
punctulata Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 436 *(Poecilaspis)*; IV, 1862, p. 250 *(Physonota)*. Süd-Brasilien
rubronotata Boh. Mon. II, 1854, p. 212 *(Physonota)*. Brasilien
sulcipennis Boh. l. c. p. 215 *(Physonota)*. „
testudinaria Boh. Mon. I, 1850, p. 437 *(Poecilaspis)*; IV, 1862, p. 250 *(Physonota)*. Buenos Aires, Süd-Brasilien
xerampelina Boh. Mon. II, 1854, p. 233 *(Physonota)*. Brasilien
22

Elytrogona Boh.

Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 438. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 404.

bacca Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 441. St. Domingo
bulla Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 193. „
interjecta Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 72; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 192. „
quatuordecim-maculata Latr. Ann. Mus. d'Hist. Nat. IV, 1802, p. 298, t. 21, f. 10 *(Cassida)*. Cuba (?), St. Domingo
ampulla Ol. Ent. VI, 1808, p. 958; 97, t. 5, f. 80 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 440, t. 4, f. B.
fornicata Dalm. Analect. Ent. 1823, p. 82 *(Cassida)*.
ab. *morbillosa* Ol. Ent. VI, 1808, p. 949; 97, t. 5, f. 72 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 521.
ampulla var. a Boh. Mon. Cassid. I, 1850, p. 440.
4

Stoiba Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 720 (Typus: *flavicollis* Klug).

angusticollis Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 239 *(Chelymorpha)*. Cuba
flavicollis Klug, Preisverz. 1829, p. 14 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 25 *(Chelymorpha)*. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 238 *(Chelymorpha)*. „
Swartzi Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 26 *(Chelymorpha)*. Jamaica
3

Selenis Hope.

Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 96, t. 4, f. 3 (Typus: *perforata* Pall.). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 94. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p 400. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 159.

nebulosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 99. Peru, Chiquitos, Brasilien
4*

sparsa Boh. l. c. p. 100. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 159, t. 7, f. 22, 23. — Zentral-Amerika, Columbien, Brasilien, Bolivia, Peru

spinifex L. Amoen. Acad. VI, 1763, p. 392; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 112; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 302; Syst. El. I, 1801, p. 402 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 204 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387; Ent. VI, 1808, p. 931; 97, t. 4, f. 57 a—b *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 327, t. 136, f. 4, 5 (♂, ♀) *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 227 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 96, t. 4, f. D. — Südamerika bis Misiones

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 106, t. 4, f. 1c; t. 6, f. 1a—b.

angustata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 578 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 390; Ent. VI, 1808, p. 933; 97, t. 1, f. 12 *(Cassida)*.

perforata Pallas, Spic. Zool. IX, 1772, p. 3, t. 1, f. 1; Naturg. IX, 1778, p. 3, t. 1, f. 1 *(Cassida)*. — F. Gen. Ins. 1777, p. 219; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 301 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 386; Ent. VI, 1808, p. 932; 97, t. 4, f. 58 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 343 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 96.

venosa Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 153 *(Acromis)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 98. — Peru, Bolivia

4

Paraselenis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 138.

albida Spaeth, l. c. p. 158. — Brasilien: Bahia, Mucury, Ecuador?

axillaris Sahlb. Peric. ent. IV, Spec. Ins. 1823, p. 57, t. 3, f. 4 *(Cassida)*. — Thon, Arch. II, 1, 1829, p. 25, t. 2, f. 23. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 124 *(Omoplata)*. — Brasilien

Biologie: Donckier, Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, p. 158, t. 1, f. 1—9 *(Omoplata)*.

basalis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 537 *(Cassida)*.

2

Pseudechoma Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 139.

marginipennis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 164 *(Omoplata)*. — Bolivia, Peru

1

Parechoma Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 136.

semilineata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 122 *(Omoplata).* — Bahia, Goyaz

1

Echoma Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 138 (Typus: *flava* L.).

amplicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 161 *(Omoplata).* — Brasilien

aulica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 103 *(Omoplata).* — „

brunnidorsis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 85 *(Omoplata).* — Peru: Marcapata

var. *rufula* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 162 *(Omoplata).* — Peru, Bolivia

collata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 113 *(Omoplata).* — Brasilien

ab. *Fruhstorferi* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII 1898, p. 275 *(Omoplata).*

contemta Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LVII, 1907, p. 160 *(Omoplata).*

decipiens Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 115 *(Omoplata).* — „

dichroa Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 538 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 107 *(Omoplata).* — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 156 *(Omoplata).* — „

flava L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida).* — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 363; Syst. El. I, 1801, p. 403 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 388; Ent. VI, 1808, p. 951; 97, t. 5, f. 75 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 299, t. 134, f. 10 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 110 *(Omoplata).* — Süd-Brasilien, Argentinien, Paraguay

testacea Herbst, Naturisyst. Käf. VIII, 1799, p. 300, t. 34, f. 11 (♀) *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 526 *(Cassida).*

flavata Boh. Mon. II, 1854, p. 123 *(Omoplata).* — Brasilien

generosa Boh. l. c. p. 126 *(Omoplata).* — „

haematidea Boh. l. c. p. 128 *(Omoplata).* — Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, p. 138. — „

hyalina Boh. Mon. II, 1854, p. 111 *(Omoplata).* — Brasilien, Argentinien, Chiquitos

ab. *filia* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 158 *(Omoplata).* — Brasilien

subspec. *suspecta* Spaeth, l. c. p. 163 *(Omoplata).* — Montevideo

innocens Boh. Mon. II, 1854, p. 121 *(Omoplata).* — Brasilien

jugata Boh. l. c. p. 116 *(Omoplata).* — „

multisinuata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 382 *(Omoplata).* — „

normalis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 538 *(Cassida).* — Boh. Mon. II, 1854, p. 104 *(Omoplata).* — Brasilien

— maulii: 1916 P.Z.S. p. [illegible] —

suturalis Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385; Ent. VI, 1808, p. 942; 97, t. 4, f. 65 (nec F.) *(Cassida)*.

nupta Boh. Mon. II, 1854, p. 109 *(Omoplata)*. — Guyana, Amazonas, Cayenne

punctata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 159 *(Omoplata)*. — Brasilien

puncticollis Spaeth, l. c. p. 156 *(Omoplata)*. — Brasilien, Peru, Amazonas

scapulosa Boh. Mon. II, 1854, p. 125 *(Omoplata)*. — Brasilien

Solieri Boh. l. c. p. 112 *(Omoplata)*. — Bahia

tersa Boh. l. c. p. 106 *(Omoplata)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 160, t. 7, f. 24 (♂) *(Omoplata)*. — Panama, Columbien, Nord-Brasilien

transversalis Boh. Mon. II, 1854, p. 105 *(Omoplata)*. — Brasilien

23

Echoma

Omoplata Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 159 (Typus: *marginata* L.). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 101. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 398. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 136.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 58.

anaglypta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 227. — Columbien

biplagosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 142. — Cayenne

Bonfilsi Boh. l. c. p. 141. — Peru, Ecuador

distincta Boh. l. c. p. 141. — Guadeloupe, Martinique

marginata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 578, nr. 23; ed. XIII, Gmel. I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 300; Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 185 (Übersetz. Goeze 1781, p. 332) *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385; Ent. VI, 1808, p. 941; 97, t. 1, f. 11 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 325, t. 130, f. 2 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 139. — Brasilien, Paraguay, Cayenne, Bolivia

clypeata [Voet, Col. II, t. 42, f. 5 *(Cassida)*] Gemm. et Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3642.

quadristillata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 226. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 160, t. 7, f. 25 (♂). — Costa Rica, Nicaragua

signata Panz. in Voet, Beschreib. u. Abbild. 1798, p. 78, t. 41, f. 1 *(Cassida)*. — Cayenne, Unterer Amazon.-Strom

irrorata F. Syst. El. I, 1801, p. 406 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 143.

Weyenberghi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 452. — Tucuman

var. *Baeri* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 384. — „

albiventris Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 136. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 160. — Mexico?

9

Paromaspides Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 139 (Typus: *sobrina* Boh.).

brunneosignata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 131 *(Omoplata)*. — Brasilien
hemispila Boh. l. c. p. 132 *(Omoplata)*. — „
lineigera Boh. l. c. p. 129 *(Omoplata)*. — „
puella Boh. l. c. p. 135 *(Omoplata)*. — „
sobrina Boh. l. c. p. 133 *(Omoplata)*. — Bahia
squalida Boh. l. c. p. 130 *(Omoplata)*. — Brasilien
trivialis Boh. l. c. p. 134 *(Omoplata)*. — „
vexabilis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 224 *(Omoplata)*. — „
Nattereri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 276 *(Omaspides)*.

8

Omaspides Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 144 (Typus: *clathrata* L.). — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 399. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 161. — Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 138.

abbreviata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 70. — Ecuador, Peru
andicola Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 386.
augusta Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 92; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 230. — Bolivia, Peru
basilica Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 92; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 231. — Ega
bioculata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 232. — Amazonas
bistriata Boh. l. c. p. 228. — Champ. Biol. Centr.-Amer. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 161, t. 8, f. 1. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 387. — Columbien, Venezuela, Costa Rica
bivittata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 70. — Ecuador
clathrata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 577; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775 p. 179 (Übersetz. Goeze 1781, p. 329), t. 15, f. 7 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 207 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 390; Ent. VI, 1808, p. 930; 97, t. 4, f. 55 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 146, t. 4, f. F. — Maulik 1916 P.Z.S. p. 482. — — Cayenne, Surinam
quadripustulata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 301; Syst. El. I, 1801, p. 401 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 341 *(Cassida)*.
transversa F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 84; Syst. El. I, 1801, p. 404 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 298, t. 134, f. 9 *(Cassida)*.

convexicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 385. — Costa Rica

flavofasciata Spaeth, l. c. p. 388. — Peru: Chanchamayo

Iheringi Spaeth, l. c. p. 383 *(Omoplata)*. — St. Paulo

lunulata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 148. — Para

nigrolineata Boh. l. c. p. 120 *(Omoplata)*. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 363 *(Omoplata)*. — Brasilien

pallidipennis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 118 *(Omoplata)*. — „

pulchella Baly, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 199, t. 5, f. 3. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 229. — Amazonas, Peru

quadrifenestrata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 165. — Peru: Pachitea

var. *simulans* Spaeth, l. c. p. 165. — Chanchamayo

specularis Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, p. 153. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 149; IV, 1862, p. 232. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. WienLVII, 1907, p. 166. — Peru

sublucida Boh. Mon. II, 1854, p. 119 *(Omoplata)*. — Brasilien

tenuicula Boh. Mon. IV, 1862, p. 233. — Peru

trichroa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 117 *(Omoplata)*. — Bolivia

tricolorata Boh. l. c. p. 119 *(Omoplata)*. — Brasilia

trifasciata F. Mant. Ins. 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 304; Syst. El. I, 1801, p. 404 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 389; Ent. VI, 1808, p. 929; 97, t. 2, f. 28 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 290, t. 134, f. 4 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 147. — Cayenne

21

Phytodectoidea Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 718.

duodecim-signata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 41 *(Chelymorpha)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 157, t. 7, f. 16 (♀) *(Chelymorpha)*. — Mexiko

quatuordecim-punctata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 40 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 156, t. 7, f. 12 *(Chelymorpha)*. — „

sedecim-stillata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 78; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 206 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 156, t. 7, f. 13 *(Chelymorpha)*.

var. *conjugata* Boh. Mon. II, 1854, p. 43 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 156, t. 7, f. 14 *(Chelymorpha)*. — „

tredecim-maculata Boh. Mon. II, 1854, p. 42 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 156, t. 7, f. 15 (♀) *(Chelymorpha)*. — „

3

Ogdoecosta Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 718.

biannularis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 66 *(Chelymorpha)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 155, t. 7, f. 10 (♂) *(Chelymorpha)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 719. — Mexiko

catenulata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 35 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 154, t. 7, f. 5 *(Chelymorpha)*. — Zentralamerika

ab. *undecim-maculata* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 37 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 154, t. 7, f. 6 *(Chelymorpha)*. — Mexiko

ab. *omissa* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 155 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 154, t. 7, f. 7 *(Chelymorpha)*. — Guatemala

undecim-maculata var. c Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 203 *(Chelymorpha)*.

decem-stillata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 82; Mon. IV, 1862, p. 215 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 158, t. 7, f. 9 *(Chelymorpha)*. — Mexiko

epilachnoides Champ. l. c. p. 158, t. 7, f. 20 *(Chelymorpha)*. — „

fasciata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 77; Mon. IV, 1862, p. 203 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 155, t. 7, f. 11 (♂) *(Chelymorpha)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 719. — „

flavomaculata Champ. l. c. p. 157, t. 7, f. 18 *(Chelymorpha)*. — Nicaragua: Chontales

guttifera Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 86 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 157, t. 7, f. 17 *(Chelymorpha)*. — Guatemala

juvenca Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 84 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 154, t. 7, f. 8 (♀) *(Chelymorpha)*. — Mexiko

var. *crux-nigra* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 218 *(Chelymorpha)*. — Champ. l. c. p. 155 *(Chelymorpha)*. — „

matris Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 728. — Costa Rica

mexicana Champ. l. c. p. 155, t. 7, f. 9 (♀) *(Chelymorpha)*. — Mexiko

obliterata Champ. l. c. p. 159, t. 7, f. 21 (♀) *(Chelymorpha)*. — Guatemala

sagitta Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 730. — Mexiko

12

Chelymorpha Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 1. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 402. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 147. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 715.

adnata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 79. — Brasilien

adspersula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 197. — „

advena Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 80; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 211. — Argentinien

alternans Boh. Mon. II, 1854, p. 33. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 151, t. 7, f. 2 (♂). — Costa Rica bis Amazonenstrom

areata Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 153. — Boh. Mon. II, 1854, p. 94; IV, 1862, p. 219. — Peru, Bolivia

atomaria Boh. Mon. II, 1854, p. 57. — Columbien

bivulnerata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 276. — Bolivia

boliviana Boh. Mon. II, 1854, p. 74. — Bolivia
bullata Boh. l. c. p. 19. — Brasilien, Venezuela

calva Boh. l. c. p. 30. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 153. — Mexico?

cassidea F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1792, p. 278; Syst. El. I, 1801, p. 368 *(Coccinella)*. — Crotch, Proc. Acad. Nat. Philad. 1873, p. 77 *(Casidea)*. — Provancher, Faune Ent. Canad. 1877, p. 685. — Östl. Nord-Amerika bis Canada
argus Licht. Cat. Mus. Hamb. 1795, p. 66 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 278, t. 133, f. 9 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 38.
cribraria Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 383; Ent. VI, 1808, p. 956; 97, t. 3, f. 44 (nec F.!) *(Cassida)*.
var. *Lewisi* Crotch, Proc. Acad. Nat. Philad. 1873, p. 77. — Neu-Mexiko, Colorado
var. *phytophagica* Crotch, l. c. p. 77. — Arizona
var. *septemdecim-punctata* Say, Journ. Acad. Nat. Philad. III, 1823, p. 435 *(Imatidium)*.
subsp. *geniculata* Boh. Mon. II, 1854, p. 39. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 242. — Cuba, Florida

cavata Boh. Mon. II, 1854, p. 7. — Columbien
cinctipennis Boh. l. c. p. 90. — Brasilien
cingulata Boh. l. c. p. 44. — „
circumpunctata Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 70. — Brasilien, Paraguay
clathrata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 725. — Goyaz
clivosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 16. — Brasilien
cobaltina Boh. l. c. p. 24. — Bahia
coeca Boh. l. c. p. 92. — Brasilien
comata Boh. l. c. p. 4. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 150, t. 6, f. 23. — Zentral-Amerika
ab. *septemdecim-notata* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 202. — Champ. l. c. p. 150, t. 6, f. 24. — „
subspec. *Smithi* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 77; Mon. IV, 1862, p. 200. — Champ. l. c. p. 151, t. 6, f. 25. — „

commutabilis Boh. Mon. II, 1854, p. 58. — Brasilien
constellata Klug, Preisverz. 1829, p. 7 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 10. — Brasilien, Bolivia, Peru
aeneomaculata Boh. Mon. II, 1854, p. 11.
distinguenda Boh. l. c. p. 13.

cribraria F. Syst. Ent. 1775, p. 90; Spec. Ins. I, 1781, p. 110; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 297; Syst. El. I, 1801, p. 396 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 55. — Brasilien, Columbien, Cayenne
multipunctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 957; 97, t. 5, f. 79 (nec Ol. Enc. méth. V, 1790!).

crucifera Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 87. — Argentinien
ab. *signaticollis* Boh. l. c. p. 88. — „

disconotata Boh. l. c. p. 47. — Cayenne
fimbrialis Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 241. — Cuba
gressoria Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 194. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 149, t. 6, f. 21 (♂). — Zentral-Amerika

guttula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 89. — Tucuman, Salta, Montevideo

haematura Boh. l. c. p. 63. — Brasilien
Hoepfneri Boh. l. c. p. 2. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 149, t. 6, f. 19 (♀). — Mexico
honesta Boh. l. c. p. 62. — Brasilien
inclusa Boh. l. c. p. 76. — ,,
indigesta Boh. l. c. p. 54. — Montevideo, Buenos Aires

infaceta Boh. l. c. p. 17. — Corrientes
infecta Boh. l. c. p. 34. — Bolivia
infirma Boh. l. c. p. 93. — Columbien, Peru

inflata Boh. l. c. p. 12. — Brasilien
var. *catharinensis* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 75; Mon. IV, 1862, p. 198. — St. Catharina
insignis Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 65. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 717. — Brasilien
Kirschi nom. nov. — Peru
cincta Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 92.
Klugi Boh. Mon. II, 1854, p. 75. — Brasilien, Argentinien

lasciva Boh. Mon. IV, 1862, p. 217. — Brasilien
longula Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 79; Mon. IV, 1862, p. 208. — ,,
lurida Suffr. Arch. f. Natg. XXXIV, 1868, I, p. 240. — Cuba
marginata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576 (Nr. 14!). — Cayenne, Brasilien
brunnea F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 81; Syst. El. I, 1801, p. 391 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 350 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 959; 97, t. 2, f. 20 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 6.
cincta De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 186 (Übers. Goeze 1781, p. 330), t. 15, f. 14 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 205 *(Cassida)*.
tuberculata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 384 *(Cassida)*. — Panz. in Voet, Beschr. u. Abbild. 1798, p. 88, t. 44, f. 29 (nec F.!) *(Cassida)*.
militaris Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 204. — Nicaragua, Costa Rica
vittata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 152, t. 7, f. 3 (♀).
multiguttata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 81. — Bolivia
multipicta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 209. — Peru
multipunctata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 384. — Guadeloupe, St. Barthelemy
polysticha Boh. Mon. II, 1854, p. 56.

nigricollis Boh. l. c. p. 80. — Bahia
orthogonia Boh. l. c. p. 23. — Brasilien
pacifica Boh. l. c. p. 52. — Bolivia
partita Boh. l. c. p. 46. — Brasilien
parummaculata Boh. l. c. p. 34. — ,,
patagonica Boh. l. c. p. 60. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 278. — Rio Negro
peltata Boh. Mon. II, 1854, p. 50. — Brasilien

peregrina Boh. l. c. p. 31.	Bolivia
personata Boh. l. c. p. 53.	Montevideo
peruana Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 86.	Peru: Marcapata
polyspilota Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 278.	Montevideo
praetextata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 48.	Peru, Bolivien
pubescens Boh. l. c. p. 5. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 149, t. 6, f. 20 (♀).	Zentral-Amerika
puncticollis Boh. l. c. p. 45.	Brasilien
punctigera Boh. l. c. p. 51.	„
quadrivittata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 737.	„
ruficeps Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 78.	„
rufipennis Boh. l. c. p. 77. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 151, t. 2, f. 1 (♀).	Panama bis Brasilien
rufoguttata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 724.	Peru
rugicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 153, t. 7, f. 4 (♀).	Mexico
russula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 32.	Brasilien
scitula Boh. l. c. p. 91. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 54.	Cayenne, Brasilien, Columbien
semifasciata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 95.	Columbien
sericea Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 195. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 150, t. 6, f. 22 (♂).	Zentral-Amerika
socia Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 14; IV, 1862, p. 196.	Bahia
soricina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 205.	Bolivia
Sturmi Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 18.	Brasilien
stygia Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 212.	Columbien: Bogotá
subpunctata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 20.	Brasilien
testaceomarginata Boh. l. c. p. 49.	Columbien
texta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 210.	Amazonas
urbana Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 22.	Brasilien
variabilis Boh. l. c. p. 61. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 156.	Süd-Brasilien,
cribellata Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 455 *(Mesomphalia)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 346 *(Chelymorpha)*.	Argentinien, Uruguay, Corrientes
var.? *tucumana* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 64. — Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 278.	
varians Blanch. in Gay, Hist. Fis. et Pol. Chile, Zool. V, 1851, p. 531, t. 31, f. 4. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 213.	Chile
Biologie: Philippi, Boll. Soc. Nac. d'Agric. XVIII, 1887, p. 1—7.	
variolosa Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385; Ent. VI, 1808, p. 958; 97, t. 2, f. 21; t. 3, f. 46 *(Cassida)*.	Cayenne, Para
cribraria Herbst, Naturs yst. Käf. VIII, 1799, p. 281, t. 130, f. 6 (nec F.!) *(Cassida)*.	
gibba F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 82; Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida)*. — Herbst, Naturs yst. Käf. VIII, 1799, p. 352 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 9.	

venusta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 83. Brasilien
vermiculata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 82. „
Wollastoni Boh. l. c. p. 8. Pernambuco

---

binotata F. Ent. Syst. I, 1792, p. 299; Syst. El. I, 1801, p. 398 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 520 *(Cassida)*. Cayenne
bituberculata F. Mant. Ins. App. 1787, p. 379; Ent. Syst. I, 1792, p. 299; Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1643 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 520 *(Cassida)*. „
88

Enagria Spaeth.

Spaeth, Archiv für Naturg. LXXIX, 1913, p. 139.

angulifera Spaeth, l. c. p. 159. Mexico
ovata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 219 *(Physonota)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), p. 171 *(Physonota)*. „
2

Eurypepla Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 236. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 384. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 174.

brevilineata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 238. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1894, p. 175, t. 9, f. 11 (♂). Yucatan
jamaicensis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 364; ed. XII, 1767, I, II, p. 577; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — F. Ent. Syst. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 301; Syst. El. I, 1801, p. 401 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 207 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 237, t. 5, f. E. Jamaica
vitrea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 239. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 244. Cuba, Bahama
3

Platycycla Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 240. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 385. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 174.

deruta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 241, t. 5, f. F. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), l. c. p. 174. Mexico, Guatemala
1

Physonota Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 90. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 386. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 165.

alutacea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 191. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 54. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 166. — Zentral-Amerika, Columbien, Venezuela

ab. *cyrtodes* Boh. Mon. II, 1854, p. 192. — Champ. l. c. p. 166, t. 8, f. 12. — Panama 1916 P.Z.S. p. 532—

subspec. *lutarella* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 98; Mon. IV, 1862, p. 243. — Venezuela, Columbien

caucana Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 277; LIX, 1909, p. 397.

attenuata Boh. Mon. II, 1854, p. 223. — Champ. l. c. p. 171, t. 8, f. 25 (♀). — Mexiko

breviuscula Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 99; Mon. IV, 1862, p. 248.

calcarata Boh. Mon. II, 1854, p. 227. — Champ. l. c. p. 174, t. 9, f. 10 (♂). — ,,

calcarata Boh. Mon. II, 1854, p. 138 *(Omoplata)*. — Champ. l. c. p. 174.

spinipes Boh. Mon. II, 1854, p. 228.

caudata Boh. Mon. II, 1854, p. 222. — Champ. l. c. p. 171, t. 8, f. 24 (♀). — Mexico: Veracruz

citrina Boh. Mon. II, 1854, p. 231. — Champ. l. c. p. 167. — Mexiko

cerea Boh. Mon. II, 1854, p. 232. — Champ. l. c. p. 167, t. 8, f. 14.

citrinella Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 219. — Champ. l. c. p. 171. — ,,

dilatata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 93. — Peru: Chanchamayo

disjuncta Chevr. Col. Mex. 1834, Cent. I, fasc. III, nr. 82 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 207. — Champ. l. c. p. 171, t. 8, f. 23. — Mexico

eucalypta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 252. — Champ. l. c. p. 173, t. 9, f. 8. — Cost-Rica, Honduras, Guatemala

flavago Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 210. — Champ. l. c. p. 170, t. 8, f. 22. — Mexico

gigantea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 199, t. 5, f. D1—5. — Champ. l. c. p. 167, t. 8, f. 11. — Zentral-America, Antillen, Ecuador, Chile (?)

Cumingi Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 201. — Champ. l. c. p. 167.

Spencei Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 202. — Champ. l. c. p. 167.

humilis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 102; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 251. — Champ. l. c. p. 172, t. 9, f. 4. — Mexico

incrustata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 203. — Champ. l. c. p. 168. — ,,

limoniata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 247. — Champ. l. c. p. 172, t. 9, f. 5. — ,,

maculicollis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 137. — Champ. l. c. p. 160 (genus dubium). — ,,

maculipes Boh. l. c. p. 220. — Bogotà

maculiventris Boh. l. c. p. 229. — Champ. l. c. p. 173, t. 9, f. 9 (♂). — Mexico

mexicana Boh. l. c. p. 206. — Champ. l. c. p. 170, t. 8, f. 21. — Mexico
nitidicollis Boh. l. c. p. 231. — Champ. l. c. p. 166, t. 8, f. 13. — „
ovalis Boh. l. c. p. 195. — Champ. l. c. p. 169, t. 8, f. 18 (var.). — „
ovipennis Champ. l. c. p. 172, t. 9, f. 6 ♂. — „
perampla Champ. l. c. p. 167, t. 8, f. 15. — Nicaragua bis Columbien
picticollis Boh. Mon. II, 1854, p. 193. — Champ. l. c. p. 169, t. 8, f. 17 (♀). — Mexiko, Guatemala
imprompta Boh. Mon. IV, 1862, p. 244. — Champ. l. c. p. 169.
plana Boh. Mon. II, 1854, p. 224. — Columbien: Bogotà
separata Boh. l. c. p. 205. — Champ. l. c. p. 170. — Mexiko
stigmatilis Boh. l. c. p. 204. — Champ. l. c. p. 168, t. 8, f. 16. — Mexiko, Guatemala
translucida Boh. l. c. p. 225. — Champ. l. c. p. 173, t. 9, f. 17 (♂). — Mexiko
flaveola Boh. l. c. p. 226. — Champ. l. c. p. 173.
plicata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 61. — Champ. l. c. p. 173.
turgida Boh. Mon. II, 1854, p. 197. — Champ. l. c. p. 170, t. 8, f. 20. — „
unipunctata Say, Journ. Ac. Philad. III, 1823, p. 434 *(Cassida)*. — Hamilt. & Caulf. Canad. Ent. XVI, 1884, p. 134 und 226; XVIII, 1886, p. 41. — Nord-Amerika bis Canada
helianthi Randall, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. II, 1838, p. 30 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 196. — Caulf. Canad. Ent. XIX, 1887, p. 73.
quinque-punctata Walsh, ~~Trans.~~ Amer. Ent. ~~Soc.~~ II, 1869, p. 4. — Riley, Report 1881, p. 53.
septentrionalis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 245.
vitticollis Boh. Mon. II, 1854, p. 194. — Champ. l. c. p. 169, t. 8, f. 19 (var.). — Mexiko

---

bicostata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 198. — Brasilien
pellucida Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 61. — Brasilien: Demerara

33

Orexita Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 254 (auch Übersichtstabelle).

bifenestra Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 97 *(Coptocycla)*. — Brasilien
Blanchardi Boh. l. c. p. 101 *(Coptocycla)*. — Peru
blattoides Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 256. — Peru, Columbia, Ecuador
complanata Boh. l. c. p. 92 *(Coptocycla)*. — Brasilien
Justini Boh. l. c. p. 93 *(Coptocycla)*. — Columbien: Bogotà

Lucasi Boh. l. c. p. 102 *(Coptocycla)*. Brasilien
maura Boh. l. c. p. 98 *(Coptocycla)*. „
picta Boh. l. c. p. 94 *(Coptocycla)*. „
var. *postica* Boh. l. c. p. 95 *(Coptocycla)*. „
plagipennis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 257. Columbien
speculata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 390 *(Coptocycla)*. Ega
subgibbosa Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 258. Columbien
tripartita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), p. 185, t. 9, f. 3 (♂) *(Coptocycla)*. Nicaragua: Chontales
varians Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 291 *(Aspidomorpha)*. Bolivia, Matto Grosso
varicolor Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 99 *(Coptocycla)*.
var. *sanguinolenta* Blanch. in D'Orbigny, Voyage Amér. mér. Ins. 1837—45 (1845), p. 212, t. 24, f. 7 *(Deloyala)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 100 *(Coptocycla)*.
Wagneri Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 391 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 185, t. 9, f. 1 *(Coptocycla)*. Costa Rica
var. *nigropunctata* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 51. — Champ. l. c. p. 185, t. 9, f. 2 (var. ♂). Panama

14

Exestastica Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 721.

ignobilis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 21 *(Chelymorpha)*. — Spaeth, l. c. p. 721. Brasilien

1

Cistudinella Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 164 (Typus: *foveolata* Champ.). — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 722.

apiata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 28 *(Chelymorpha)*. Brasilien: S. Paulo
bipunctata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 208 *(Chelymorpha)* [genus dubium]. Bolivia
convexior Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 253. Columbien
foveolata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1893), p. 165, t. 8, f. 8. Panama: Chiriqui
inanis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 324 *(Ischyrosonyx)*. Brasilien
lateripunctata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 99. Paraguay, Uruguay, Misiones
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 192.
notata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 72 *(Chelymorpha)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LV, 1905, p. 98. Brasilien
obducta Boh. l. c. p. 29 *(Chelymorpha)*. Bolivia,

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 187, t. 5, f. 19aI u. bI; t. 8, f. 19a—m. — Süd-Brasilien, Paraguay, Misiones

peruana Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 100. — Peru, Bolivia

plagicollis Spaeth, l. c. p. 102. — Peru: Chanchamayo

punctipennis Boh. Mon. Cassid II, 1854, p. 27 *(Chelymorpha)*. — Brasilien

rufitarsis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 98. — „

12

Ischyrosonyx Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 321. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 382. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 176.

nigrosignata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 327. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 176, t. 9, f. 13. — Columbien, Nicaragua

ab. *discipennis* Boh. Mon. II, 1854, p. 325. — Columbien

ab. *marginicollis* Boh. l. c. p. 326. — „

oblonga Sturm in Thon, Abb. ausl. Ins. Käf. 1826—28, p. 4, t. 1, f. 5 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 322. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 156 (var.). — Brasilien, Nord-Argentinien, Paraguay

peltoides Boh. Mon. II, 1854, p. 323. — Brasilien: S. Paulo

3

Batonota Hope.

Hope, Ann. Nat. Hist. III, 1839, p. 98 (Typus: *bidens* F.). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 153. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 377. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 161.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 44.

aculeata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 170. — St. Domingo

aeneocincta Spaeth. Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913. I, p. 162. — Amazonas: Manaos

apiculata Boh. Mon. II, 1854, p. 169. — Brasilien

aurita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 237. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 161, t. 8, f. 2. — Costa Rica, Mexico, Nicaragua

bellicosa Boh. Mon. II, 1854, p. 159. — Brasilien

bidens F. Spec. Ins. I, 1781. p. 112; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. 1792, p. 302; Syst. El. I, 1801, p. 403 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 387; Ent. VI, 1808, p. 934; 97, t. 1, f. 10 *(Cassida)*. — Herbst. Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 345 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 155. — Brasilien, Paraguay

biplagiata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 164, t. 8, f. 10. — Chiriqui

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **bivittipennis** Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 96; Mon. IV, 1862, p. 241. — Ega

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **collaris** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 86. — Amazonas, Bolivia

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **cornigera** Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 162. — Brasilien, Paraguay

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **Dejeani** Boh. l. c. p. 178. — Cayenne

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **distincta** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 71. — Ecuador

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **ensifera** Boh. Mon. II, 1854, p. 166. — Corrientes, Paraguay, Süd-Brasilien

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 171, t. 6, f. 7a—d.

ab. *gregaria* Boh. Mon. II, 1854, p. 167. — Brasilien

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **exaltata** F. Syst. El. I, 1801, p. 402 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 176. — Brasilien?

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **fasciata** Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 42. — Brasilien

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **funesta** Boh. Mon. II, 1854, p. 172. — Cayenne

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **Godmani** Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864, p. 242. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 163, t. 8, f. 9. — Panama

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— (Trikona) **humeralis** Ol. Ent. VI, 1808, p. 964; 97, t. 5, f. 88 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 184. — Haiti

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **insidiosa** Boh. Mon. II, 1854, p. 174. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 163, t. 8, f. 5. — Columbien, Zentral-Amerika

eremita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 240. — Champ. l. c. p. 164.

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **Kiesenwetteri** Boh. Mon. II, 1854, p. 179. — Columbien

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **Kunzei** Boh. l. c. p. 180. — Amazonas

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— (Trikona) **Lerouxi** Boh. l. c. p. 183. — Cuba

Biologie: Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 243.

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **marginevittata** Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 43. — Ega

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **minima** Wgenr. l. c. p. 42. — Paraguay

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **monoceros** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 536 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 156. — Brasilien, Paraguay, Venezuela

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 173, t. 6, f. 9.

ab. *gladiator* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 94; Mon. IV, 1862, p. 235.

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **mucronata** Boh. Mon. II, 1854, p. 164. — Brasilien, Bolivia, Paraguay

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **nigra** Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 93 (var. ex Caracas); Mon. IV, 1862, p. 234. — Peru?, Venezuela

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **nodosa** Boh. Mon. II, 1854, p. 160. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 162, t. 8, f. 4. — Columbien, Panama

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **parallela** Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amér. mér. Ins. 1837—45, p. 212, t. 24, f. 6 *(Dorynota)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 165. — Peru, Goyaz, Ecuador

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,(Akantaka)— **peregrina** Boh. Mon. IV, 1862, p. 239. — Peru

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **pugionata** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 537 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 158. — Brasilien

ab. *ballista* Boh. l. c. p. 157. — „

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **pugnax** Boh. l. c. p. 161. — Columbien

— Maulik 1916 P.Z.S. p.583,— Batonota **rufomarginata** Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 41. — Brasilien

rufoornata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 86. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 163, t. 8, f. 7. — Nicaragua: Chontales

Jansoni Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 71.

rugosa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 41. — San Domingo

sexplagiata Wgenr. l. c. p. 44. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 163, t. 8, f. 6. — Nicaragua, Guatemala

spinosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 168. — Brasilien, Bolivia

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, p. 172, t. 6, f. 8a—c.

tenebrosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 175. — Chiquitos

truncata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 112; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1772, p. 303; Syst. El. I, 1801, p. 403 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 388; Ent. VI, 1808, p. 933; 97, t. 1, f. 9 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 284, t. 134, f. 2 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 173, t. 5, f. B. — Cayenne, Surinam

turrifera Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 171. — San Domingo

viridisignata Boh. l. c. p. 181. — Spaeth, Arch. f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 163. — Bolivia, Goyaz

yucatana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1893), p. 162, t. 8, f. 3. — Yucatan

42

Eremionycha Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXI, 1911, p. 259.

miraculosa Spaeth, l. c. p. 260. — Ost-Brasilien

1

III. Tribus.

Aspidomorpha Hope.

Hope, Col. Man. III, 1840, p. 158 (Typus: *miliaris* F.). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 242. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 407. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 105.

a) Aus Japan und dem Amur-Gebiet.

difformis Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 27 *(Deloyala)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 277. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1874, p. 211. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 270. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 280. — Weise, Archiv f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 295. — Japan, Korea, Mandschurei, Ussuri

transparipennis Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 41 *(Coptocycla)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 142 *(Coptocycla)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 295. — Amur, Daurien, Japan, Korea

ab. *elliptica* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 280.

vetula Weise, l. c. p. 295.

b) Von Süd-Asien, den Philippinen und Sunda-Inseln.

amabilis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 315. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 104. — Maulik 1916 P.Z.S. p. – Java, Sumatra

micans Ol. Ent. VI, 1808, p. 960; 97, t. 5, f. 83 (nec F.!) *(Cassida)*.

Andrewesi Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . Südl. Vorderindien

assimilis Boh. Mon. II, 1854, p. 314. — Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 75. — Maulik 1916 P.Z.S. p. – Java, Sumatra

var. *elegantula* Spaeth, l. c. p. 75. Java

bilobata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 111; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 269. Philippinen

biradiata Boh. Mon. II, 1854, p. 292. „

biremis Boh. l. c. p. 319. Java

birmanica Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . Birma

castaneipennis Spaeth, Sarawak Mus. Journ. 1, 1912, p. 117. Sumatra, Nias

var. *borneensis* Spaeth, l. c. p. 117. Sarawak

dorsata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 301; Syst. El. I, 1801, p. 401 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1641 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 342 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 296. Sunda-Ins., Hinter-Indien, Bengalen

calligera Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 297. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 104.

dulcicula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 278. — Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 117. — Maulik 1916 P.Z.S. p. – Borneo, Sumatra

egena Boh. Mon. II, 1854, p. 317. Bengalen

furcata Thunbg. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 87, t. 5, f. 96 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 265, t. 132, f. 7 *(Cassida)*. — Maulik 1916 P.Z.S. p. – Süd-China, Hinter-Indien,

dorsata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 386; Ent. VI, 1808, p. 961; 97, t. 3, f. 45 (nec F.!).

micans F. Syst. El. I, 1801, p. 398 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 313. Sunda-Ins.

Biologie: Kershaw & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 250.

fusconotata Boh. Mon. II, 1854, p. 279. Ostindien, Philippinen

fuscopunctata Boh. l. c. p. 288. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 104. — Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 117. Sunda-Inseln, Indien, Südchina

ab. *rubrodorsata* Boh. Mon. II, 1854, p. 310. Java

hexaspilota Baly, Journ. Ent. II, 1863, p. 11. Cambodja

indica Boh. Mon. II, 1854, p 318. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 113. Vorderindien, Himalaya, Yünnan, Formosa

inquinata Boh. l. c. p. 309. — Maulik 1916 P.Z.S. p. – Java,Lombok

subspec. *musta* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . Andamanen, Tenasserim

inuncta Boh. l. c. p. 300. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . Südl. Vorderindien

limbata Goldf. Enum. Ins. El. Cap. 1805, p. 41, t. 1, f. 4 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 295. Java, Malakka, Sumatra

elevata Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 317, t. 18, f. 10 [nec F.!]. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. .

miliaris F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 300; Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385; Ent. VI, 1808, p. 943; 97, t. 2, f. 25 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 312, t. 135, f. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 261. — Woll. Col. St. Helenae 1877, p. 215. (?) — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 16. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 138. — Mahlk. 1916 P.Z.S. p. — Philippinen, Sunda-Ins., Neu-Guinea, Hinter-Indien, Yünnan, Tonking

Biologie: Schultze, Philipp. Journ. of Science 1908, p. 264, t. 2; t. 3, f. 1—4; t. 6, f. 6—9. — Bishop, Journ. of the Straits-Branch R. Asiat. Soc. LIII, 1909, p. 129.

♂ *amplissima* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 260. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 16.

celebensis Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 316, t. 18, f. 9. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 281.

quatuordecim-punctata Ol. Ent. VI, 1808, p. 943; 97, t. 4, f. 66 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 521 *(Cassida)*.

ab. *flaveola* Weise, Philippin. Journ. of Sc. V, 1910, p. 143.

ab. *inundata* Weise, l. c. p. 143. Manila, Celebes

mutilata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 316. Java, Sumatra, Lombok

ab. *glabrata* Boh. Mon. III, 1855, p. 469 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . Java, Sumatra, Lombok

var. *jucunda* Spaeth, l. c. p. . Java

orbicularis Boh. Mon. II, 1854, p. 255. Philippinen

orientalis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 107; Mon. IV, 1862, p. 259. Himalaya

ab. *olivacea* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 49. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. .

quadrilobata Boh. Cat. l. c. p. 111; Mon. IV, 1862, p. 268. Philippinen

sanctae crucis F. Ent. Syst. IV, 1792, App. p. 446; Syst. El. I, 1801, p. 401 *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. V, 1806, p. 227 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 287, t. 6, f. B. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 102. — Mahlk. 1916 P.Z.S. p. — Ostindien

Biologie: Weise, l. c. p. 102.

bajula Boh. Mon. II, 1854, p. 288.

?*jamaicensis* Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 386; Ent. VI, 1808, p. 952 (excl. fig.) *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 303, t. 135, f. 1 (nec L.!) *(Cassida)*.

subspec. *elevata* F. Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 291. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 102. Sunda-Inseln

var. *limbipennis* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 285; IV, 1862, p. 266. Ceylon

flava De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 184, t. 15, f. 13 (nec L.!) *(Cassida)*.
?*heroina* Boh. Mon. II, 1854, p. 284.
var. *fraterna* Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 11. — Cambodja
subspec. *insularis* Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 118. — Borneo, Sumatra, Siam
subspec. *lobata* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 289. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. . — Ostindien, Bengalen
subspec. ?*Stevensi* Baly, Journ. of Ent. II, 1863, p. 11. — Cambodja

sarawacensis Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 73; Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 117. — Sarawak

suavis Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 118. — Borneo: Brunei

subcruciata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 293. — Philippinen

sumatrana Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 74. — Sumatra

vesta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 279. — Java

c) Von Australien, Neu-Guinea und den Papua-Inseln.

Bestimmungstabelle: Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 136.

adhaerens Weber, Obs. Ent. I, 1801, p. 51 *(Cassida)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 539. — Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 318, t. 18, f. 11. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 264. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 138. — Neu-Guinea, Aru, Key-Insel
subsp. *testudinaria* Montrz. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VII, I, 1855, p. 67. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 206 *(Cassida)*; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 273 (♀). — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 139. — Neu-Guinea, Amboina, Buru
var. *phyllis* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 274. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 139. — Batjan (Molukken)

australasiae Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 537. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 308. — Spaeth, l. c. p. 147. — Maulik 1916 P.Z.S. p. 74 — Neu-Guinea
var. *Douei* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 110; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 265. — Spaeth, l. c. p. 148.
var. *Guerini* Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 538 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 528 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. 148.
subspec. *ramifera* Spaeth, l. c. p. 148. — Südl. Neu-Guinea
var. *subdivisa* Spaeth, l. c. p. 148. — Milne Bai
subsp. *flyensis* Spaeth, l. c. p. 148. — Fly River

convolvuli Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 431 *(Coptocycla)*. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 215. — Neu-Caledonien

deusta F. Syst. Ent. 1775, p. 89; Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 297; Syst. El. I, 1801, p. 396 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, — Nord-Australien

p. 1636 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 954; 97, t. 1, f. 17 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 334 *(Cassida)*. — Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 543 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 333 *(Cassida)*. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 137.

angulifera Blanch. Voyage Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 324, t. 18, f. 17 *(Cassida)*.

collina Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 541 *(Cassida)*.

subspec. *nigrodorsata* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 119; Mon. IV, 1862, p. 293 *(Cassida)*. — Queensland

flavodorsata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 48. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 143. — Ins. Yule bei Neu-Guinea

interrupta F. Syst. Ent. 1775, p. 89; Spec. Ins. I, 1781, p. 110; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 296; Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 953; 97, t. 2, f. 34 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 333 *(Cassida)*. — Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 542 *(Cassida)*. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 119; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 292 *(Cassida)*. — Nördliches Australien

Plasoni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 539; Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 156.

var. *Badeni* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 64. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 156.

var.? *planipennis* Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 107. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 158. — N. Queensland

lauta Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 108. — Nord-Territ. von Süd-Australien

Mac Leayi Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 117; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 287 *(Cassida)*. — Nord-Australien

maculatissima Boh. Cat. l. c. p. 117; Mon. IV, 1862, p. 288 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. 137. — „

miliaris F. siehe unter Asien!

novaeguineensis Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 537 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 307. — Spaeth, l. c. p. 140. — Neuguinea

astrolabiana Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 319, t. 18, f. 13.

ab. *lateramosa* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 48. — Spaeth, l. c. p. 140.

subspec. *quinque-guttata* Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 271. — Spaeth, l. c. p. 141. — Südl. Neu-Guinea

subvar. *meraukensis* Spaeth in Wichmann, Nova Guinea Expéd. Néerld., 1909, IX, 1, p. 28. — Merauke

opima Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 275. — Neu-Caledonien

ponderosa Boh. l. c. p. 266. — Amboina, Ceram

punctum F. Syst. El. I, 1801, p. 404 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 954; 97, t. 5, f. 76 *(Cassida)*. — Guér. Voy. Coqu. Zool. II, 1829—32, p. 150 *(Cassida)*. — Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 541 *(Cassida)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 320, t. 18, f. 12. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 281. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 151. — Neu-Guinea, Papua-Inseln

ab. *gibbosula* Spaeth, l. c. p. 152.

Badeni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 298 (nec Wgenr.!).

var. *divisa* Boisd. Faune Ent. Océanie (Astrol.) II, 1835, p. 540. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 281. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 152.

ab. *lunifera* Spaeth, l. c. p. 153.

var. *munda* Weise, Arch. f. Naturg. XLV, 1899, I, p. 271. — Spaeth, l. c. p. 153.

ab. *diabolica* Spaeth, l. c. p. 153.

ab. *submunda* Spaeth in Wichmann, Nova Guinea Exp. Néerl. IX, 1, 1909, p. 29.

subspec. *ramulopicta* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 63. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 153. — Nord-Australien

quadriradiata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 300. — West-Australien: Swan River

septemcostata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 49. — Spaeth, l. c. p. 137. — Nord-Australien

socia Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 114; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 276. — Spaeth, l. c. p. 144. — Neu-Guinea, Papua-Inseln

aurata Montrz. Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VII, I, 1855, p. 67 *(Cassida)*. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 206 *(Cassida)*.

subspec. *nigrolimbata* Spaeth, l. c. p. 144. — Südl. Neu-Guinea

subspec. *Staudingeri* Spaeth, l. c. p. 144. — Deutsch-Neu-Guinea

var. *flavovariegata* Spaeth, l. c. p. 144. — ,,

subsp. *yulensis* Spaeth, l. c. p. 144. — Yule

tetrica Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 117; Mon. IV, 1862, p. 286 *(Cassida)* (gen. dubium). — Australien

Westwoodi Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 254; IV, 1862, p. 258. — Spaeth, l. c. p. 158. — Nördl. Australien

d) Aus Afrika, Madagascar und von den benachbarten Inseln.

Subgen. **Aspidomorpha** s. str.

angolensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 18; Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 203. — Angola: Benguela; Quango

apicalis Klug, Abh. Akad. Wissensch. Berlin 1832 (1834). p. 210; Sep. Ins. Madag. 1833, p. 122. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 257. — Madagascar, Nossi Bé, Aldabra

decolorata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 144; Mon. IV, 1862, p. 347. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 19. — Kolbe, Abh. Senckenb. Naturf. Ges. XXVI, 1902, p. 584.	
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 144 *(Cassida)*.	
lutea Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. 223. — Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afr. Chrysom. 1910, p. 504.	
subspec. *confinis* Klug, Erman's Reise, Ins. 1835, p. 47 *(Cassida)*. —Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 256.	Westafrika
Biologie: Muir & Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 11, t. 4, f. 22 (larva); p. 6, t. 1, f. 10, 11 *(ootheca)*.	
subeuropaea J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 231 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 362 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 19.	
subspec. *concinna* Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 258; in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, Chrysom. 1910, p. 452. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 278.	Ostafrika
areata Klug, Erman's Reise, Ins. 1835, p. 48 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 364 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 21. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 278.	Ost- und Süd-Afrika
ab. *nigripennis* Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 223.	Ostafrika
var. ? *coronula* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 365 *(Cassida)*.	Madagascar?
subspec. *Duvivieri* Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 449.	Tanganjika-See
argillacea Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 21.	Zanzibar, Usambara
aruwimiensis Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 94. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 449.	Uganda, Zentral-Afrika, Stanleyfalls
nigricornis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 18.	
biguttata F. Syst. Ent. 1775, p. 91; Spec. Ins. I, 1781, p. 111; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 299; Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385; Ent. VI, 1808, p. 946; 97, t. 3, f. 40 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 340 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 267. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 262. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 115.	Deutsch-Ost-Afrika, Zanzibar
usambica Kolbe, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 91; in Stuhlm. Col. Deutsch-Ost-Afrika 1898 (1897).	

p. 343, t. 4, f. 53. — Weise, Arch. für Naturg. LXV, 1899, I, p. 262.

var. *Bertolonii* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 115. — Uganda, Usambara,

fenestrata Bertoloni, Mem. Accad. Sc. Jst. Bologna 1876, 3, VII, p. 267, t. 1, f. 4. — Mozambique, Ukami

var. *Katonae* Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 508. — Britisch-Ostafrika

var. *sulfurea* Spaeth, l. c. p. 508. — „

bimaculata F. Ent. Syst. I, 1792, p. 300; Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 340 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 265. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 17. — Guinea

frenata Boh. Mon. Cassid. II, p. 267 (♂); conf. Weise, l. c. p. 17.

candens Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 399. — Victoria Nyanza

castaneidorsis Spaeth, Rev. Zool. Afr. II, 1912, p. 125. — Congo

chlorina Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 259 (♀). — Spaeth, Rev. Zool. Afr. II, 1912, p. 127 und p. 129. — West-Afrika bis Victoria Nyanza

fuscopunctata Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 95 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 111.

lixiva Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 474 *(Coptocycla)*.

pallidula Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 463; IV, 1862, p. 474 *(Coptocycla)*.

paropsidea J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 230 *(Cassida)*.

virididorsata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 258 (♂). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 22.

chlorotica Ol. Ent. VI, 1808, p. 931; 97, t. 4, f. 56; in Palisot, Ins. d'Afrique 1805—21, p. 253, t. 38 f. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 244 (♀). — Westliches Zentral-Afrika

spectabilis Boh. Mon. II, 1854, p. 245 (♂). — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 22.

cincta F. Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 295; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 331 *(Cassida)*. — Klug, Erman's Reise 1835, p. 47 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 251. — Woll. Col. Hesp. 1867, p. 154. — Maulik 1915 P.Z.S. p. — — West-Afrika

quadriremis Luc. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, Bull. p. 53. — Reiche, Voy. Ferr. et Gal. Abyss. XV, p. 398, t. 25, f. 4 (?).

cordigera Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 447; Rev. Zool. Afr. II, 1912, p. 127. — Congo

delitescens Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 222; Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 203. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 401. — Benguela bis inneres Ostafrika

diaphana Sahlb. Spec. Ins. 1823, p. 58 *(Cassida)*. — Thon, Archiv II, 1829, I, p. 26. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 302. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 175. — West-Afrika

var. *impicta* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 303. — Spaeth, l. c. p. 175.

dilecta Boh. Mon. II, 1854, p. 312. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 280. — Südost-Afrika, Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro

dissentanea Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 264. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 174. — Calabar, Kamerun

Ertli Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 400. — Nyassa, Zambesi

fenestrata Ol. Ent. VI, 1808, p. 947; 97, t. 4, f. 69; in Palisot, Ins. d'Afrique 1805—21, p. 255, t. 38, f. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 269. — Togo, Sierra Leone, Oware

bioculata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 63. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 21. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 350; LV, 1905, p. 115.

firma Weise, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, p. 160. — Deutsch-Ost-Afrika

flavens Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 506. — Ostafrika

fragilis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 257. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 279. — Zambesi, Kilimandjaro

galamensis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 270. — Senegambien

var. *dispilota* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 261. — Alt-Calabar

Häfligeri Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 402. — Nyassa: Kigonsera

honesta Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 446; Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 127. — Congo

icterica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 306 (var. Guinea). — Natal

inconstans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 156 *(Cassida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 278. — Somali

indistincta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 248 (♀). — Senegambien

innocua Boh. Mon. II, 1854, p. 249 (♂). — Harold, Col. Hefte XVI, 1879, p. 215. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 16.

infuscata Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 280. — Kilimandjaro, Kibonoto

ingens Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. p. 422; XXXVI, 1892, p. 377. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 255. — Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 127. — Zentral-Afrika

insculpta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 263. — Senegal

intricata Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 222. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 401. — Victoria Nyanza

irrorata Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, p. 220. — Usambara

isparetta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 252. — Senegambien

kilimana Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 220. — Kilimandjaro

Kolbei Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 259. — Deutsch-Ostafrika

ab. *pelligera* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 309.

laevigata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 113. — Kamerun

lateralis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 260. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 279.	Ostafrika
ab. *discors* Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 506.	,,
Lönnbergi Spaeth, Ark. f. Zool. VIII, 1914, p. .	Britisch-Ostafrika
ludibunda Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 256.	Benguela
lurida Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 366. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 540.	Senegal, Zentral-Afrika
maculicollis Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895, p. 696.	Kenia
madagascarica Boh. Mon. II, 1854, p. 275. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 175; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. I, 1910, Col. 13 (1909), p. 282 — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika, Chrysom. 1910, p. 446.	Madagascar, Comoren, Ostafrika
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 148.	
mombonensis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 256. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 507.	Deutsch-Ost-Afrika: Mombo
mrogorensis Weise, l. c. p. 254.	Deutsch-Ostafrika: Mrogoro
mutata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 311. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 257.	West-Afrika bis zum
insidiosa J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 229. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 282.	Tanganji-ka-See
natalensis Boh. Mon. II, 1854, p. 303.	Natal
nigromaculata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 277, t. 133, f. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 525 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 19.	Zentral- und Westafrika
mutabilis Klug, Erman's Reise, Ins. Atl. 1835, p. 47. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 367 *(Cassida)*.	
nigroguttata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 232 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 360 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 20.	
nupta Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 266.	Südost-Afrika
obovata Klug, Erman's Reise, Ins. Atl. 1835, p. 48 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 340 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 17.	West-Afrika
producta J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 229. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 281.	
Simonis Wgenr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 162 (♂).	
obtusangula Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 403.	Usambara: Nguelo
officiosa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 255. — Spaeth, Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 172.	West-Afrika
lata Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 220.	
palleago Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 247.	Süd-Ost-Afrika

polyspila Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 264. — Madagascar: Plateau de l'Androy

pontifex Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 286. — Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, Chrysomel. 1910, p. 479. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 265. — Madagascar

rotunda Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 202; XLVIII, 1904, p. 270.

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 148 (*roturica* crr.).

potens Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 223. — Unyanembe

prasina Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 258. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 279. — Usambara, Uganda

puncticosta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 246. — Natal

Biologie: Muir & Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 9, t. 3, f. 20 (larva); p. 2, t. 1, f. 1—6.

quadrimaculata Ol. Ent. VI, 1808, p. 945; 97, t. 4, f. 68 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 263. — Gerst. in Decken's Reise III, 1873, p. 290. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909). p. 278. — West-, Zentral- und Ostafrika, Erithraea, Abessinien, Zambesi

nigropunctata Klug, Erman's Reise 1835, p. 47 *(Cassida)*. — Boh. Mon. III, 1855, p. 528 *(Cassida)*.

tetraptera Gerst. Jahrb. Hamb. Anstalt. I, 1884, p. 63 *(Cassida)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 401.

Westermanni Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 262; IV, 1862, p. 59.

ab. *signaticollis* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 334. — Ostafrika: Uhehe

quadriramosa Boh. Mon. II, 1854, p. 305. — Westafrika

quinquefasciata F. Syst. El. I, 1801, p. 401 *(Cassida)*. — Klug, Erman's Reise 1835, p. 47. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 250. — Mauh. 1913 P.Z.S. p. 5[illegible] — Zentral- und Westafrika, Réunion

pectoralis Ol. Ent. VI, 1808, p. 960; 97, t. 5, f. 82 *(Cassida)*.

Schönherri Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 270. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 173. — West-Afrika

var. *Afzelii* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 272. — Spaeth, l. c. p. 173. — Sierra Leone

var. *funerea* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 273. — Spaeth, l. c. p. 173. — „

var. *obtusa* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 228. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 282. — Gabun

var. *stolata* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 274. — Spaeth, l. c. p. 173. — Guinea

var. *sugillata* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 280. — Spaeth, l. c. p. 173. — Cap Palmas

Schubotzi Weise, Wissensch. Erg. Dtsch. Zentr.-Afr.-Exp. IV, 1912, p. 158. — Zentr.-Afrika: Mboga

sellata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 21. — Kamerun Congo

semiramosa Wgenr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1880, p. 162. — Ashanti

sessarum Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 267; Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 126. — Sesse-Ins., Uganda

Severini Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 447. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 334. — West-Afrika, Congo, Rhodesia

Sjöstedti Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 176. — Kamerun

sternalis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 20. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 401. — Ost-Afrika

striata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 23. — Kamerun, Fernando Poo

strigosa Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 95 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 111. — Zentral-Afrika

Goetzeni Kaeseb. in von Goetzen, Quer durch Afrika 1895, p. 400.

pilifera Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 17.

submutata Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 256. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cass. (1909), p. 279. — Ost-Afrika

tecta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 276. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika, Chrysomel. 1910, p. 451. — Südostafrika

Biologie: Muir & Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 10, t. 4, f. 21 (larva) und p. 6, t. 1, f. 7—9 *(ootheca)*.

var. *silacea* Boh. Cassid. Mon. II, p. 1854, p. 277.

tetraspilota Kolbe, Ent. Nachr. XII, 1896, p. 91; Col. Dtsch. Ostafr. 1898 (1897), p. 343, t. 4, f. 52. — Albert-Nyanza

togata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 227. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 272. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 177. — West- und Zentral-Afrika

castula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 271.

ab. *ruwensorica* Weise, Wissensch. Erg. Dtsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, p. 159. — Zentr.-Afrika

togoensis Weise, Arch. f. Naturg. LXX. 1904, I, p. 57. — Togo

tortuosa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 257. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 172. — West-Afrika

undulatipennis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 264. — Madagascar: Diego Suarez

vernicata Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 246. — Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika, Chrysomel. 1910, p. 480. — Madagascar

scitula Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 114.

var. *Nickerli* Spaeth, l. e. p. 114. — Diego Suarez

viridula Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 221. — Kilimandjaro, Östl. Congo

Wahlbergi Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 253. — Limpopo

---

stictica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 294. — Patria?

Subgen. **Spaethia** Berg.

Berg, Commun. Mus. Nac. Buenos Aires 1899, p. 79 (Typus: *Ganglbaueri* Spaeth). — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 453; Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 128. — Weise, Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 223.

Iphinoë Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 540 (Typus *Ganglbaueri* Spaeth).

cepaecolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 498 *(Cassida)*. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 453 *(Spaethia)*. — Madagascar: Suberbieville

Ganglbaueri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 54; XLIX, 1899, t. 5, f. 3. — Ostafrika: Mikindani

degenerata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 310 *(Aspidomorpha)*. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 454 *(Spaethia)*.

pellucida Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1899, I, p. 257 *(Aspidomorpha)*. — Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 129. — Deutsch-Ost-Afrika

Schoutedeni Spaeth, l. c. p. 127. — Congo

137

Conchyloctenia Spaeth.

Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 449. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 223.

adspersa F. Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 407 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 350 *(Cassida)*. — Guinea

ab. *nigrosparsa* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 351 *(Cassida)*.

bipuncticollis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 337 *(Cassida)*. — Caffraria

Bonnyana Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1892, p. 94 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 278 und 540 *(Aspidomorpha)*. — Zentral- und Ost-Afrika

Bennigseni Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 219; XLV, 1899, I, p. 260 *(Aspidomorpha)*.

hepatica var. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 150 *(Cassida)*.

fibrata Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 505. — Victoria Nyanza, Uganda

hepatica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 342 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 278 *(Aspidomorpha)*. — West-Afrika

hybrida Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 338 *(Cassida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 276. — Ost-Afrika von Natal bis Erithraea

adjuncta Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 262 *(Aspidomorpha)*.

subspec. *vicaria* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 216 *(Aspidomorpha)*. — Weise, Arch. f. Naturgesch. LXV, 1899, I, p. 262 *(Aspidomorpha)*. — Zentral-Afrika

illota Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 339 *(Cassida)*. — Cap, Caffraria, Natal

Gorhami Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 445 *(Aspidomorpha)*.

luteipennis Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 450. — Congo

lyncea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 344 *(Cassida)*. — Senegal

Mouffleti Boh. l. c. p. 346 *(Cassida)*. — West- und

ab. *Clavareaui* Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 451. — angrenzendes Zentral-Afrika

nigrosellata Boh. Moh. Cassid. IV, 1862, p. 294 *(Cassida)*. — Alt-Calabar

nilotica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 352 *(Cassida)*. — Nubien, Congo

notaticollis Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 452.

praecox Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 334 *(Cassida)*. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 504. — Südost-Afrika

ab. *obscurella* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 399. — Ostafrika: Kigonsera

subspec. *picta* Weise, Arch. f. Naturg. XLIV, 1898, I, p. 219 *(Aspidomorpha)*. — Ostafrika: Pagani

ab. *externeguttata* Fairm. Bull. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 58 *(Cassida)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 399. — Zanguebar

punctata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Syst. El. I, 1801, p. 400 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, 1, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 385 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 341 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 348 *(Cassida)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 262 *(Aspidomorpha)*. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 450. — Süd-Afrika bis Abessinien

hospes Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 311 *(Ischyrosonyx)*. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 450.

var. *hebes* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 347 *(Cassida)*. — Caffraria

var. *luteicollis* Boh. l. c. p. 353 *(Cassida)*. — Südafrika

var. *atripennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 253 *(Cassida)*. — Ostafrika, Süd-Congo

var. *maculipennis* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 348. — Cap

subspec. *parummaculata* Boh. l. c. p. 349. — Ost-Afrika

exsanguis Gerst. Jahrb. Hamb. wissensch. Anstalt. 1884, p. 62 *(Cassida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 277. — Massai

Schelleri Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 401, t. 4, f. 16 *(Aspidomorpha)*. — West-Afrika

spilota Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 343 *(Cassida.)* — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 451. — „

signatipennis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 345 *(Cassida)*.

ab. *jecorosa* Spaeth, l. c. p. 451. — Kamerun

var. *maculipunctata* Spaeth, l. c. p. 451. — Congo

Tieffenbachi Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 401, t. 4, f. 14 *(Aspidomorpha)*. — Angola

tigrina Ol. Ent. VI, 1808, p. 957; 97, t. 5, f. 78 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 336 *(Cassida)*. — Südost-Afrika

Biologie: Muir & Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 11, t. 4, f. 23 (larva) und p. 7, t. 2, f. 12, 13 (*ootheca*) *(Aspidomorpha)*.

tripuncticollis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 289 *(Cassida)*. — Kapland

Sindia Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 105 (Typus: *clathrata* F.).

clathrata F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 83; Syst. El. I, 1801, p. 396 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p, 303, t. 135, f. 3 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 330 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 105. Ostindien

sulcata Ol. Ent. VI, 1808, p. 950; 97, t. 5, f. 73 *(Cassida)*.

sedecim-maculata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 117; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 290 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 347. „

2

Sindiola Spaeth.

Spaeth, Ent. Tidskrift I, 1903, p. 111.

parallelipennis Spaeth, l. c. p. 111. Birma

1

Hybosinota Spaeth.

Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13 (1909), p. 282.

nodulosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 331 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. 282. Natal

turrigera Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 283 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. 283. – Maulik 1916 P.Z.S. p. 137 – Zanzibar bis Betschuanaland

tuta Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 172 *(Asphalesia)*.

2

Patrisma Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 272 (Typus: *pyramidalis* Fairm.). — Weise, Archiv. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 247.

Subgen. **Patrisma** s. str.

Murrayi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 386 *(Laccoptera)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 248. — Spaeth, Ark. f. Zool. I, 1903, p. 178; Rev. Zool. Afr. II, 1912, p. 131. Westafrika bis Uganda

angulata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 21 *(Laccoptera)*.

pyramidalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 273, t. 5, f. 2.

Subgen. **Asphalesia** Weise.

Weise, Archiv f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 247 (Typus: *confragosa* Ws.).

confragosa Weise, l. c. p. 247 *(Asphalesia)*. Madagascar
pallicolor Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 247 *(Cassida)*. „
Perrieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 429 *(Laccoptera)*. „
spectrum Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 63 *(Laccoptera)*. „
5

Laccoptera Boh.

Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 55. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 408. — Weise, Archiv f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 246.

Subgen. **Laccoptera** s. str.

a) Aus Australien und von den Papua-Inseln.

impressa Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 322, t. 18, f. 15 *(Aspidomorpha)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 72. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 159. Neu-Guinea und benachbarte Inseln, Queensland

b) Von Süd-Asien, den Malayen-Inseln und Philippinen.

discreta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 77. Java
fallax Weise, Philippin. Journ. of Sc. V, 1910, p. 145. Larat vel Tenimber
fasciata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 385. Borneo
foveolata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 116; Mon. IV, 1862, p. 284 *(Cassida)*. Hinterindien
Fruhstorferi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 117. Tenasserim, Burma
hospita Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 68. Indochina, Annam
insulana Weise, Philippin. Journ. Sc. V, 1910, p. 144. Ins. Wetta
manilensis Weise, l. c. p. 144. Luzon
ab. *nigripennis* Weise, l. c. p. 144.
multinotata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 70. Java
nepalensis Boh. l. c. p. 76. Nepal
novemdecim-notata Boh. l. c. p. 67. Java, Hinterindien
var. *vigintisex-notata* Boh. l. c. p. 66. Assam, Tonking
luzonica nom. nov. Philippinen
philippinensis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 79 (nec Blanch.!).
Biologie: Schultze, Philipp. Journ. of Sc. III, 1908, p. 268, t. 5, f. 3.
quadrimaculata Thunb. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 86, t. 5, f. 94 *(Cassida)*. — Maulik 1916 T.Z.S. p. 5 — Süd-China, Ost-Indien
Thunbergi Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 15.
subspec. *Bohemani* Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 42. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. XI, 1913, p. 46. Süd-China, Ost-Indien, Andamanen,

chinensis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 71 (nec F.!).	Formosa
tredecim-punctata Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 104 (nec F.!).	
Biologie: Kershaw & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 290.	
quatuordecim-notata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 64.	Süd-Vorder-Indien, Ceylon
sculpturata Boh. l. c. p. 78.	Celebes
sedecim-notata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 386.	Lombok, Java, Flores, Sumbava
tredecim-guttata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 65.	Manila
tredecim-punctata F. Syst. El. I, 1801, p. 398 (*Cassida*). — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 73.	Sumatra, Java, Borneo
miliaris Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 312, t. 135, f. 8 (nec F.!) (*Cassida*).	
philippinensis Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) IV, 1853, p. 321, t. 18, f. 14 (*Aspidomorpha*).	
yunnanica Spaeth, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 226.	Yunnan

c) Aus Madagascar.

nodulosa Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika, Chrysomel. 1910, p. 480.	Madagaskar
regularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 429.	Madagaskar: Suberbieville

d) Aus Afrika.

Übersicht: Weise, Archiv f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 246.

Subgen. **Laccoptera** s. str.

Weise, l. c. p. 248.

atrata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 115.	Britisch Ostafrika
aurosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. p. 307. — Weise, Arch. f. Naturg. XLV, 1899, I, p. 249. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, 1, 7, Col. 13 (1909), p. 284.	Zanzibar, Usambara
longicornis Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 220.	
basalis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 250.	Kamerun, Franz. Congo
corrugata Sahlb. Spec. Ins. 1823, p. 60, t. 3, f. 6 (*Cassida*). — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 57. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 249.	West- und Zentralafrika
intricata Klug, Erman's Reise, Ins. 1835, p. 47 (*Cassida*).	
deremensis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 250.	Ostafrika: Derema, Pagani

excavata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 56. — Weise, l. c. p. 249. — Cap, Natal

ferruginea Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. XVIII, 1895 (1896), p. 696. — Spaeth, Term. Füzet. XXV, 1902, p. 20 [subgenus dubium]. — Kenia

laeta Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 250 und 252. — Deutsch-Ostafrika: Ukami

modesta Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 454. — Westliches Congogebiet: Boma

montivaga Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 284. — Kilimandjaro

morosa Weise, Arch. f. Naturg. LVX, 1899, I, p. 249. — Kamerun

nigricornis Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 65. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 104; Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 249. — Loanda, Gabon

picea Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 58. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 248. — Südafrika

rugicollis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 233. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 388. — Weise, l. c. p. 249. — Gabon, Kamerun

ruginosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 61. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 286. — Natal

marcida Weise, l. c. p. 251.

triangula Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 130. — Congo: Dima

Subgen. **Orphnoda** Weise.

Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, p 247.

cancellata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 60. — Weise, l. c. p. 253. — Süd-Afrika

distans Spaeth, Termesz. füzet. XXV, 1902, p. 23. — Betschuana, Rhodesia, Zambesi

intertexta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 382. — Cap

marginata Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 253. — Natal

rugosicollis Spaeth, Termesz. füzet. XXV, 1902, p. 22. — Süd-Afrika: Boroma

rustica Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 252. — Natal

Weisei Spaeth, l. c. p. 21. — Transvaal

Subgen. **Orphnodella** Spaeth.

Spaeth, Termesz. füzet. XXV, 1902, p. 20.

abyssinica Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 117; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 285 *(Cassida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, 7, Col. 13, Cassid. (1909), p. 285. — Ost-Afrika, Abessinien, Erythraea

atra Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 253.

ruginosa Weise, l. c. p. 253. — Spaeth, Term. füzet. XXV, 1902, p. 20 (nec Boh.!).

submetallica Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 31.
ab. *usambarica* Weise, Archiv f. Naturg. LXV, 1899, p. 253.
cicatricosa Chap. l. c. p. 31 (nec Boh.!).

burorum Spaeth, Term. füzet. XXV, 1902, p. 24. — Transvaal
cicatricosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 62. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 253. — Senegal
sassana Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 129. — Uelle (Zentralafrika)

49

Basipta Boh.

Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 185. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 379.

luteocincta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 188. — Cap
pallens Boh. l. c. p. 187. — „
pilosella Boh. l. c. p. 189. — Caffraria
stolida Boh. l. c. p. 186, t. 5, f. C. — „
Biologie: Muir and Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1904, p. 12, t. 5, f. 24; p. 7, t. 2, f. 14—16.

4

Silana Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p.

farinosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 146; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 350. — Ceylon

1

Torbinia Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 262.

incisicollis Spaeth, l. c. p. 262. — Madagaskar: Plateau d'Androy

1

Sphenocassis Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 261.

humerosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 258 *(Laccoptera)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 261. — Madagascar: Suberbieville

1

Psalidoma Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 218.

Holubi Spaeth, l. c. p. 218. — Rhodesia, Zambesi

1

Trichaspis Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 269.

pilosula (Boh.) Mon. Cassid. IV, 1862, p. 332 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. 269. — Deutsch-Süd-West-Afrika: Kuisip

1

Crossocassis Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 274.

pilosa Spaeth, l. c. p. 275. — Südafrika: Dunbrody

1

Nabathaea Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 272.

arabica Spaeth, l. c. p. 273. — Arabien
pygmaea Spaeth, l. c. p. 272. — Aden

2

Chelysida Fairm.

Fairm. in Revoil, Voy. Çomalis 1883, p. 103 (Typus: *obtecta* Fairm.). — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 750.

obtecta Fairm. l. c. p. 103. — Spaeth, l. c. p. 751. — Abessinien, Somali
Peringueyi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, Bull. p. 90. — Natal
testudinea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 469 *(Cassida)*. — Kap d. gut. H.

3

Oxylepis Desbr.

Desbr. Bull. Acad. Hippône 1884, p. 100. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 750 (auch Übersicht).

deflexicollis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 333 *(Cassida)*. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 36 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1069 *(Chelysida)*. — Acloque, Faune France 1896, p. 458 *(Chelysida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 750. — Mittelmeergebiet
Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 299.
excelsa Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 37 *(Cassida)*.
vagepunctata Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 203; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1063 *(Chelysida)*.
var. *capucina* Desbr. Bull. Acad. Hippône 1884, p. 100. — Algier
palaestina Desbr. l. c. p. 101. — Palästina

var. *involuta* Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 419 *(Cassida)*. — Sizilien, Tunis
var. *Sahlbergi* Spaeth, l. c. p. 755. — Corfu
Kossmati Spaeth, l. c. p. 752. — Aden
2

Ischyronota Weise.

Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1069. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 103. — Jacobson, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 125.

Brisouti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 288 *(Cassida)*; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 107. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1070. — Biskra, Sahara
nitidula Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 44 *(Cassida)*.

conicicollis Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 487 *(Cassida)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 108. — Jacobs. l. c. p. 125. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (144). — Transcaspien, Buchara bis Mongolei

desertorum Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 305 *(Cassida)*; Bull. Mosc. XX, 1847, p. 333. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 103. — Jacobs. l. c. p. 125. — Südrussische Steppe bis Zentralasien
gibbula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 430 *(Cassida)*.
Jakowlewi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 288 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1070.
salsolae Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 43 *(Cassida)*. — Jacobs. Öfversigt Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 48.
ab. *araxicola* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 288 *(Cassida)*; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 103. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1070. — Caucasus, Turkestan
ab. *basimargo* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 108. — Aulie-Ata, Buchara

elevata Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 175 *(Cassida)*; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 107. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893). p. 1070. — Jacobs. Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 48; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 125. — Caucasus, Araxes, Turkestan
var.? *nitidula* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 367 *(Cassida)*; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1070. — Reitt. Wien. Ent. Zeit 1901, p. 107. — Turkestan

Schusteri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (144). — Transcaspien

Spaethi Reitt. Wie . Ent. Zeit. XX, 1901, p. 107. — ,,
var. *deserticola* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 108. — Astrachan, Transcaspien
desertorum Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 166 *(Cassida)*. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 287 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1070 (nec Gebl.!).
6

Chiridula Weise.

Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 647 (Typus: *Semenowi* Weise); Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1070. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (133).

Semenowi Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 647; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1071. — Caucasus, Turkestan

fovangula Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1901, p. 169, t. 3, f. 9 *(Cassida)*. — Jacobs. Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 60. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (134).

1

Macromonycha Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 271; LXIV, 1914, p. (133) (Typus: *apicalis* Gebl.).

anatolica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 139 *(Cassida)*. — Kilik. Taurus

apicalis Gebl. Bull. Classe phys. mathém. Ac. Imp. St. Petersburg III, 1845, p. 105; Bull. Mosc. III, 1860, p. 33 *(Cassida)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 269 *(Cassida)*. — Caucasus bis Turkestan

discoidalis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 35 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—98 (1893), p. 1070 *(Chiridula)*.

Olivieri Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 332 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 271.

(juven.) *suberosa* Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XXVII, 1888, p. 132 *(Cassida)*; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1070 *(Chiridula)*.

2

Oocassida Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 110. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (134).

ceylonica Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 53. — Ceylon

cruenta F. Ent. Syst. I, 1792, p. 293; Syst. El. I, 1801, p. 389 *(Cassida)*. — Herbst. Natursyst. VIII, Käf. 1799, p. 330 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 416 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 53. — Ostindien

obscura F. Ent. Syst. I, 1792, p. 295; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. VIII, Käf. 1799, p. 332 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 415 *(Cassida)*. — „

ab. *unicolor* F. Syst. El. I, 1801, p. 391 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 415 *(Cassida)*.

pudibunda Boh. Cat. Col. Brit. Mus. IX, 1856, p. 133; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 329 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 110. — „

tunisiensis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 419 *(Cassida)*. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 156 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (134). Tunis, Sahara

biskrensis Desbr. Col. Nord d'Afr. in Bull. Acad. Hippône 1884, p. 99; Mon. Cassid. 1891, p. 41 nota *(Cassida)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 53 *(Cassida)*.

Koechlini Mars. Abeille IV, 1867, p. 68 *(Cassida)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. 53 *(Cassida)*.

5

Glyphocassis Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. .

trilineata Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 30 *(Cassida)*. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 123; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 297 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 124 nota *(Odontionycha)*. Himalaya, Sikkim, Tonking

ab. *melanosticta* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. .

1

Pilemostoma Desbr.

Desbr. Monogr. Cassid. (Frelon) 1891, p. 14 (Typus: *vittata* F.). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 206. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (136).

bucharica Spaeth, l. c. p. (136). Buchara

fastuosa Schall. Abh. Hall. Ges. I, 1783, p. 259 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1633 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 393 *(Cassida)*. — Scriba, Beytr. Insectengesch. II, 1791, p. 86, t. 8, f. 3 *(Cassida)*. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 155 *(Cassida)*. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 398, t. 142, f. 3; Suppl. VI, 1913, p. 294 *(Cassida)*. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 788 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075 und 1084 *(Odontionycha)*. — Acloque, Faune France 1896, p. 457 *(Cassida)*. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 206 und (1901) p. 331 *(Cassida)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 515 *(Cassida)*. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 214, t. 150, f. 10 *(Cassida)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (136). Paläarkt. Region

ocellata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 244, t. 131, f. 4 *(Cassida)*.

vittata F. Syst. Ent. Suppl. 1798, p. 81; Syst. El. I, 1801, p. 391 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 353 *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. III, 1804, p. 157 *(Cassida)*. —

Ol. Ent. VI, 1808, p. 982; 97, t. 6, f. 111 *(Cassida)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 365, t. 23, f. 1 *(Cassida)*. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 98; VII, 1846, p. 361 *(Cassida)*. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 521 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 360 *(Cassida)*. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 73 *(Cassida)*. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489 *(Cassida)*. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 5 und 14.

ab. *delicatula* Weise, l. c. p. 1084 *(Odontionycha)*. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 214 *(Cassida)*.

ab. *nigrina* Weise, l. c. p. 1084 *(Cassida)*. — Reitt. l. c. p. 214 *(Cassida)*.

vittata Ahr. Neue Schrift. Ges. Halle II, 1812, p. 2, t. 6 *(Cassida)*.

2

Hypocassida Weise.

Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1074; Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 224.

a) Tropisch-afrikanische Arten.

Übersicht: Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 224.

bistigma Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 352 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 226.	Altcalabar, Kamerun
conducta Boh. l. c. p. 351 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 225.	Alt-Calabar, Kamerun
delectabilis Boh. l. c. p. 353 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 226.	Sierra Leone
ectypa Boh. l. c. p. 354 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 225.	Cap
flavescens Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904 (1903), I, p. 56.	Ost-Afrika: Ikuta, Ukamba
gibbipennis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 488, t. 6, f. E. *(Cassida)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 225.	Cap
gibbosa Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 470 *(Patrisma)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 347 *(Cassida)*; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 272. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 225; LXX, 1904, I, p. 57.	Somali, Usambara
paeminosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 146; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 357 *(Cassida)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 225.	Guinea, Gabon
nigropunctata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 232 *(Cassida)*.	
ramifera Desbr. Col. Nord d'Afr. 1885, p. 100 *(Cassida)**).	Grand Bassam
passaria Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 215; Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 225. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 292.	Usambara, Kilimandjaro, Meru

*) Nach brieflicher Mitteilung des Autors: Grand Bassam.

roseola Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 243; LXIX, 1903, I, p. 226. — Deutsch-Ostafrika

roseomarginata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 489 *(Cassida)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 226. — Senegal

rufula J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 232 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 226. — Guinea, Congo, Kamerun

var. *epipleuralis* Weise, l. c. p. 226.

rufula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 355 (nec J. Thoms.) *(Cassida)*.

var. *testaceicollis* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 233 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 361 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 226; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 43.

soror Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 30 *(Cassida)*; Archiv f. Naturg. LXIX, 1903, I. p. 226. — Deutsch-Ostafrika

b) Paläarktische Arten.

meridionalis Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 276 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 454 *(Cassida)*. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 7 und 28 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1074. — Acloque, Faune France 1896, p. 457 *(Cassida)*. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901), p. 330 *(Cassida)*. — Süd-Frankreich, Spanien, Corsica, Riviera

ab. *Viturati* Pic, L'Echange XXI, 1905, p. 179.

subferruginea Schrank, Beytr. 1776, p. 62; Enum. Ins. Austr. 1781, p. 49 *(Cassida)*. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 213 *(Cassida)*. — Harrer, Beschr. Ins. 1784, nr. 149 *(Cassida)*. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 400 *(Cassida)*. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 787 *(Cassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1074 und 1083. — Acloque, Faune France 1896, p. 457 *(Cassida)*. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901), p. 330 *(Cassida)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 514 *(Cassida)*. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216 *(Cassida)*. — Paläarkt. Region excl. Japan

cornea Mars. L'Abeille V, 1868, p. 214 *(Cassida)*. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 46 *(Cassida)*.

ferruginea F. Spec. Ins. I, 1781, p. 102; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 294; Syst. El. I, 1801, p. 391 *(Cassida)*. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. 1781, p. 50, t. 22, f. 29; Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 245, t. 130, f. 14 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637 *(Cassida)*. — Petagna, Ins. Calabr. 1787, p. 9 *(Cassida)*. — Scriba, Journ. 1790, p. 179 *(Cassida)*. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 73; ed. Hellw. I, 1795, p. 78 *(Cassida)*. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 239 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 380; Ent. VI, 1808, p. 981; 97, t. 1, f. 2 *(Cassida)*. — Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 104 *(Cassida)*.

— Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 154 *(Cassida)*. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 482 *(Cassida)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1832, p. 368 *(Cassida)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—1839, p. 189 *(Cassida)*. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 274 *(Cassida)*. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 365; X, 1849, p. 22 *(Cassida)*. — Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 514 *(Cassida)*. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 522; ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 523 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 453 *(Cassida)*. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 77 *(Cassida)*. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489 *(Cassida)*. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 7 und 27 *(Cassida)*.

Biologie: Suffr. l. c. *(Cassida)*. — Cornel. l. c. *(Cassida)*. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. 231 *(Cassida)*. — Rupertsb. Natur u. Offenb. XXII, 1876, p. 400 *(Cassida)*.

fusca Laich. Verz. Tyr. Ins. 1781, I, II, p. 112 *(Cassida)*. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. 1781, p. 51 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 380 *(Cassida)*.

ab. *sobrina* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1083 *(Cassida)*. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216 *(Cassida)*.

subspec. *costata* Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 150; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 341 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 123. Indien

15

Cassida L.

L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 362*); ed. XII, 1767, p. 574; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1634. — F. Syst. Ent. I, 1775, p. 88; Syst. El. I, 1801, p. 387. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 176. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 369; Ent. VI, 1808, p. 922. — Ill. Käfer Preuss. I, 1798, p. 476. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 204. — Paykull, Fauna Suec. II, 1799, p. 44. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 442. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1832, p. 365. — C. R. Sahlberg, Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 186. — Suffrian, Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 49. — Boh. Monogr. Cassid. II, 1854, p. 329. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 47 und 519; ed. II, 1858, p. CXXXI und 952; ed. III, 1874, I, p. CLI; II, p. 520. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 72. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 317. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 338. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 134; ed. II, 1891, p. 175; Fauna Transsylv. 1891, p. 175. — Desbr. Monogr. Cassid. (Frelon) 1891, p. 2. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1070. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 176. — Acloque, Faune France 1896, p. 456. — Fowler, Col. Brit. IV, p. 396. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 205 und (1901) p. 330. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 512. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 213.

Biologie: Grav. Acta Ac. Leop.-Carol. II, 1842, p. 431. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 49. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII,

*) Als Typus hat zu gelten: *C. nebulosa* L.; vgl. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (140), Sitzb.

1847, p. 346. — Chapuis, Mém. Soc. Liége 1853, p. 599. — Rupertsb. Natur u. Offenb. XXII, p. 129. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1067. — Jablon. Rovart. Lap. XIII, 1906, p. 135. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 205.

Subgen. **Odontionycha** Weise.

Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 204; Insekt. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1074. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, Phytoph. 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901), p. 331. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X. 1912, p. 498; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (135).

a) Tropisch-Afrikanische Arten.

Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 498.

cordula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 482 *(Cassida)*. — Cap

inornata Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13, Cassid. (1909), p. 271; Ann. Mus. Hung. X, 1912, p. 501. — Kilimandjaro, Victoria Nyanza

Kristenseni Spaeth, Ann. Mus. Hung. X, 1912, p. 501. — Abessinien

limbiventris Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 479 *(Cassida)*. — Senegal

litigiosa Boh. Mon. II, 1854, p. 481 *(Cassida)*. — Cap, Benguela, Natal

liquefacta Spaeth, Ann. Mus. Hung. X, 1912, p. 499. — Senegal

melanophthalma Boh. Mon. II, p. 480 *(Cassida)*. — Cap

praetimida Spaeth, Ann. Mus. Hung. X, 1912, p. 497. — Victoria Nyanza

pudens Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 482 *(Cassida)*. — Cap

semipallens Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912 p. 500. — Erithraea

sincera Spaeth, l. c. p. 498. — Kilimandj.

tenera Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 483 *(Cassida)*. — Cap

b) Paläarktische Arten.

hemisphaerica Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 226, t. 129, f. 9. — Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 645. — Steph. Illustr. Brit. Ent. IV, 1832, p. 371. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 92. — Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 514. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 519; ed. 2, 1858, p. 952; ed. 3, 1874, II. p. 521. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 484. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 439; Cat. Mad. Col. 1857, p. 130; Cat. Col. Canar. 1864, p. 419; Col. Atlant. 1865, p. 376. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 73. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 490; ed. 2, 1891, p. 703; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Fowl. Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 401, t. 142, f. 13; Suppl. VI, 1913, p. 295. — Desbr. Monogr. Cassid. 1891, p. 32. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075 und 1087. — Acloque, Faune France 1896, p. 456. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901), p. 332. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 515. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 213, t. 150, f. 12. — Europa, Nord-Afrika, Madeira, Canar. Inseln

anglica Curtis. Brit. Ent. III, 1826, p. 127.

concinna Steph. Illustr. Brit. Ent. IV, 1832, p. 371.

cori Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 33 u. 38 (nec Fairm.!).

margaritacea Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 103. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 73. — Steph. Illustr. Brit. Ent. IV, 1832, p. 371 (nec Schall.!).

Rossii Woll. Cat. Mad. Col. 1857, p. 130; Col. Atlant. 1865, p. 376.

viridis Brullé in Webb et Berth. Canar. Ent. 1838, p. 74 (nec L.!).

var. *Heydeni* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. .

nigriventris Heyd. Verz. Käf. Nassau 1877, p. 364. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1087. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 213.

var. *peculiosa* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 224.

viridis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 362; ed. XII, 1767, I, II, p. 574; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1635; Faun. Suec. 1761, p. 152; Reise Oel. 1764, p. 53. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Eur. Faun. VIII, 1779, p. 304. — Scriba, Journ. 1790, p. 176. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1797, p. 9. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 480. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 209, t. 130, f. 8. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 143. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 16. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1074 und 1086. — Acloque, Faune France 1896, p. 456. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901) p. 331. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 515. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 213, t. 150, f. 11. Paläarktische Region, Japan

Biologie: De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 327. — Stroem, Norske Selsk. Saml. II, 1788, p. 375. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1797, p. 7. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 211. — Latr. Règne Anim. 1817, p. 515. — Westw. Introd. I, 1839, p. 378, f. 46. — Grav. Acta Acad. Leop.-Carol. XIX, 2, 1842, p. 435, f. 5, 6. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 363. — Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 22; Natur u. Offenb. XXII, 1876, p. 401, f. 1, 2, 11—16. — Kemp. Entomologist XXIV, 1901, p. 290.

cardui De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 174 (ex p. ?).

equestris F. Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 292; Syst. El. I, 1801, p. 388. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 378; Ent. VI, 1808, p. 976; 97, t. 1, f. 3. — Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 103. — Panz. Fauna Germ. 96, 5; Ent. Germ. I, 1795, p. 153. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 45. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 216, t. 130, f. 10. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XII, 1804, p. 28; Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 51. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 436. — Steph. Ill. Brit.

Ent. Mand. IV, 1832, p. 367. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 186. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 89. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 363. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 519; ed. 2, 1858, p. 952; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 474. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 73. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488; ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 787. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 281. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 401, t. 142, f. 12. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 10.

subspec. *nigriceps* Fairm. Rev. Zool. III, 1851, p. 528; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 92. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 476. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075. — Mediterrangebiet

ab. *flaviceps* Mars. Abeille XV, 1876, p. 35. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132. — Syrien, Süd-Russland

Subgenus **Deloyala** Redt.

Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 952; ed. 3, 1874, II, p. 520. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1076.

seraphina Ménétr. Act. Petrop. I, 1836, p. 151; Mém. Ac. Petr. V, 1838, p. 49. — Küst. Käf. Eur. VII, 1846, p. 84. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 491. — Weise, l. c. p. 1076. — Türkei, Klein-Asien, Kaukasus

subspec. *hablitziae* Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. II, 1838, p. 182, t. 3, f. e. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 490. — Kraatz, Horae Soc. Ent. Ross. X, 1873, p. 128. — Weise, l. c. p. 1076.

testudo Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 284.

vespertina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 357. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 292. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, 1, p. 295. — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 19. — Nord-China, Amur, Japan, Formosa

Subgenus **Mionycha** Weise.

Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 204; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075.

azurea F. Syst. El. I, 1801, p. 389. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1076 und 1088. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208 und (1901), p. 333. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 516. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 214, t. 150, f. 13. — Europa, Algier

lucida Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 215 (auch biolog.). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 412. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 75. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 30. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 789.

ab. *ornata* Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 118, t. 2, f. 22. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Weise, l. c. p. 1088. — Reitt. l. c. p. 214.

azurea Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 213. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 411. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 75. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 8 und 29. — Acloque, Faune France 1896, p. 457 (nec F.!).

Biologie: Suffr. l. c. — Fuss, Mitt. Siebenb. Ver. Nat. IV, 1853, p. 156. — Puton, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. VIII. — Rupertsb. Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 398.

concha Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 264. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 269. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1090. — Ussuri

helva Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (137). — Kleinasien, Persien

margaritacea Schall. Abh. Hall. Ges. 1783, p. 259. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 297; Syst. El. I, 1801, p. 397. — Ol. Ene. méth. V, 1790, p. 383; Ent. VI, 1808, p. 284; 97, t. 2, f. 19. — Rossi, Mant. Ins. I, 1790, p. 27; ed. Hellw. I, 1795, p. 364. — Scriba, Journ. 1790, p. 180. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 155. — Schrank, Fauna Boica I, 1788, p. 521. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 241. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 432. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 76. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 490; ed. 2, 1891, p. 703; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 31. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1076 und 1090. — Acloque, Faune France 1896, p. 458. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208 und (1901), p. 332. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 516. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215, t. 150, f. 14. — Europa, Caucasus

Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 161. — Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 25; Natur und Offenb. XXII, 1876, p. 399, f. 5, 6, 27. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. CCXV. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 203.

mutabilis Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 93, t. 1, f. 11.

spergulae Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 144. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1832, p. 370 (conf. Bedel, l. c.).

superba L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1644.

ab. *melanocephala* Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 243. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1091. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215.

albiventris Heyd. Käf. v. Nassau 1877, p. 365.

ab. *nigrescens* Weise, l. c. p. 1091. — Reitt. l. c. p. 215.

subreticulata Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 244. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 436. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 703; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 8 u. 30. — Acloque, Faune France 1896, p. 458. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, Sitzb. p. (137). Mittel-Europa, Balkan, Altai

splendidula Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 223; VII, 1846, p. 363. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1076 und 1089. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208 und (1901), p. 332. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215.

ab. *ventralis* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1090.

Subgenus **Cassidula** Weise.

Weise, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 260; X, 1891, p. 204; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1076.

nobilis L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 363; Fauna Suec. ed. II, 1761, p. 153; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 575; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636. — F. Syst. Ent. 1775, p. 90; Spec. Ins. I, 1781, p. 110; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 297; Syst. El. I, 1801, p. 396. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Eur. Faun. VIII, 1779, p. 315. — Harr. Beschr. 1784, p. 151. — Vill. Ent. I, 1789, p. 92. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 72; ed. Hellw. I, 1795, p. 78. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 383; Ent. VI, 1808, p. 983; 97, t. 2, f. 24. — Scriba, Journ. 1790, p. 180; Beytr. II, 1791, p. 87, t. 8, f. 4. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 155. — Schrank, Fauna Boica I, 1798, p. 521. — Cederhj. Fauna Ingr. 1798, nr. 175. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 485. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 49. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 146. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 445. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 370. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 190. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 245; VII, 1846, p. 363. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 513. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 423. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 76. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 323. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 490; ed. 2, 1891, p. 703; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 400, t. 142, f. 9; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. (Frelon) 1891, p. 9 u. 35. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082 und 1113. — Acloque, Faune France 1896, p. 458. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 211 und (1901), p. 340. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 522. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 218, t. 150, f. 22. Paläarkt. Region excl. Japan

Biologie: Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 23, fig.; Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 399, f. 7—10 und 29. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 789. — Heikertinger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 43.

laevis Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 250, t. 131, f. 6.

margaritacea Herbst (ex p.), l. c. p. 225 (nec Schall.!).

pulchella Panz. Faun. Germ. 39, 15.

splendidula Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 147. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 371.

urticae Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 109; Naturf. XXIX, 1802, p. 170, t. 3, f. 23.

viridula Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 49. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 447. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 369. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—1839, p. 191. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 249. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, II, p. 523, nota.

ab. *Dollmanni* Donisth. in Fowler, Col. Brit. Isl. Suppl. VI, 1913, p. 172 und p. 294, t. 18, f. 8.

ab. *obscurella* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 14. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 218.

obscura Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1113.

ab. *rosea* Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 486. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1113. — Reitt. l. c. p. 218.

ovalis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (143), Sitzb. — Algerien, Biskra,

parvula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 428. — Weise, Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 646; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082. — Zentral-Asien

comparata Rybak. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 289. — Jacobs. Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 60.

navicula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 429.

pusilla Waltl, Reise Tyrol 1839, p. 82. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 438. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 6 und 33. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082. — Acloque, Faune France 1896, p. 458. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 339. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215. — Süd-Europa, Elsass, Südl. Frankr., Algerien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 207. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 299 *(pusilla, disticta, angusta).*

mollis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 437.

puncticollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 257.

pyrenaea Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1082.

var. *angusta* Mars. Abeille XVI, 1876, p. 35.

var. *disticta* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 336. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 34 *(distincta).*

Olcesei Pic, L'Echange XXIV, 1908, p. 46.

vittata Vill. Linn. Ent. I, 1789, p. 93. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, t. 42, f. 346. — Fowler, Col. Brit. — Paläarkt. Region

Isl. IV, 1890, p. 399, t. 142, f. 8; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082 und 1115. — Acloque, Faune France 1896, p. 458. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 211 und (1901), p. 340. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 522. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p 218, t. 150, f. 23. excl. Japan

nobilis Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 238, t. 130, f. 15 (nec L.!). — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 255.

oblonga Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 785. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 252. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 422. — Bach, Käferf. III. 1856, p. 76. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 954; ed. 2, 1891, p. 703; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 9 und 36.

Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, Sitzb. p. 44 *(oblonga)*. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 61. — Puton, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. IX. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 299.

salicorniae Curtis, Brit. Ent. III, 1826, t. 127. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 370.

Weisei Jacobs. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 246 *(Cassidula)*. Syr Darja

Subgenus **Cassida** s. str.

Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 204; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1076. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 498; Verh. zool. bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (133), Sitzb.

a) Paläarktische Arten.

1. Arten mit Klauenzahn.

bella Fald. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837, p. 325, t. 12, f. 3. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 404. — Desbr. Mon. Cassid. (Frelon) 1891, p. 38. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1075 *(Odontionycha)*. Kaukasus

canaliculata Laich. Verz. Tyr. Ins. I, 1781, p. 109. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1075 und 1085 *(Odontionycha)*. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216. Östl. Mittel-Europa, Caucasus

austriaca F. Ent. Syst. I, 1792, p. 293; Syst. El. I, 1801, p. 390. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 104; Faun. Germ. 98, 2. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 254, t. 131, f. 9. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 95. — Bach, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 158; Käferf. III, 1856, p. 73. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 357. — Redtb. Faun. Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 5, nota. — Acloque, Faune France 1896, p. 457.

Biologie: Bach, l. c. p. 158. — Rupertsb. Natur und Offenb. XXII, 1876, p. 378.
illyrica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 357.
sanguinolenta Schrank, Beytr. 1776, p. 61; Enum. Ins. 1781, p. 48 (nec Müll.!).
speciosa Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 74; Naturf. XXIX, 1802, p. 166, t. 3, f. 22.
graminis Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 97. — Weise, Ins. Deutschl. VI, p. 1085. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216 (juvenilis).
immutabilis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 357.

cori Fairm. *(corii)* Pet. Nouv. Ent. 1876, p. 25; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 244. — Kreta, Südl. Balkan, Kleinasien, Syrien
brevis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 159; Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1075 *(Odontionycha)*.
cerata Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 40.
gibbosula Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 77. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (137), Sitzb.

2. Arten ohne Klauenzahn.

algirica Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 513, t. 44, f. 4. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 98. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1079. — Mediterran-Gebiet
prasina Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 381. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 21 und 39 (nec Ill.!).

angustifrons Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891 (31/VII.), p. 205; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078. — Algerien, Südspanien
oranensis Desbr. Mon. Cassid. 1891 (15/IX.), p. 39.

atrata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 294.; Syst. El. I, 1801, p. 390. — Ol. Enc. méth. 1790, p. 380; Ent. VI, 1808, p. 982; 97, t. 6, f. 110. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 257, t. 131, f. 11. — Panz. Fauna Germ. 88, 1; Ent. Germ. 1795, p. 154. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 282. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 470. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 519; ed. 2, 1858, p. 952; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 72. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489; ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 787. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und p. 1094. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216. — Mittel- und Ost-Europa, Kleinasien

aurora Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 14. — Steiermark, Ungarn
rosea Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 387. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, II, p. 523. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 250; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080 und 1099.
denticollis var. Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 23 und 41.

berolinensis Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 270. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 458. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 76. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 524. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 94. — Ost-Deutschland, Wien, Ungarn, Süd-Russland,

— Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078 und 1112. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (142), Sitzb. — Zentralasien

obsoleta Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 248, t. 131, f. 5 (nec Ill.!).

pallidiventris Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215. — Spaeth, l. c.

ab. *daurica* Boh. Mon. II, 1854, p. 457. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 269. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1112.

ab. *pectoralis* Weise, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 31.

berolinensis Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215 (nec Suffr.!).

corallina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 306. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1080. — Spanien, Algier

artemisiae Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 234; Bull. p. XXIV.

deflorata Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 139. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 379. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 97. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 13 u. 18. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1079. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 335. — Westliches Mediterrangebiet

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 206 *(sanguinosa)*. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 298.

herbea Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 513, t. 44, f. 5.

lata Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 138. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 375. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 101.

limbaticollis Fairm. Rev. Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 364. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 40.

deltoides Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, I, p. 644. — Mongolei

denticollis Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 186. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 359. — Boh. Act. Holm. 1851, p. 97; Mon. Cassid. II, 1854, p. 371. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 75. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 322. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 88. — Letzn. Bericht schles. Ges. LVII, 1879, p. 5. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488; ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 11 und 22. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1096. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 337. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 517. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217. — Nord- und Mittel-Europa

Biologie: Cornel. l. c. p. 359; Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 91. — Rupertsb. Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 379.

ab. *fuscicollis* Weise, l. c. p. 1096. — Reitt. l. c. p. 217.

ferruginea Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 213. — Har. Col. Hefte VI, 1870, p. 64. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 334; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, Bull. p. 117. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217. Mittel-Europa bis Sibirien

thoracica Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 141. — Crotch, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 78 (?).

thoracica var. a Suffr. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 362. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 376. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 20.

tincta Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 205; Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1079 und p. 1106.

flaveola Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 103. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 400, t. 142, f. 10. — Seidl. Fauna Balt. ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1111. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208 und (1901), p. 338. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 518. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215, t. 150, f. 21. Nord- u. Mittel-Europa

exsculpta Charp. Horae Ent. 1825, p. 23.

ferruginea Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 148 (nec F.!).

nebulosa F. Syst. Ent. 1775, p. 89; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Syst. El. I, 1801, p. 390 (nec L.!).

obsoleta Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 484. — Steph. Ill. Brit. Ent. 1832, p. 368. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 190. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 372. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 455. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 77. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 319. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 7 und 26.

Biologie: Gardiner, Mag. Nat. Hist. (2) I, 1837, p. 276. — Suffr. l. c. p. 372. — Rupertsb. Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 400.

ab. *pallida* Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 50. — Desbr. l. c. p. 27. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 518.

ab. *atrodorsalis* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (142), Sitzb.

dorsalis Desbr. Mon. Cassid. 1891 (15. IX.) p. 27. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1111. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215.

atrata Gerh. Zeit. f. Ent. Breslau 1891 (X.), p. 28.

var. *littoralis* Weise, l. c. p. 1111. — Reitt. l. c. p. 215.

flaviventris Kraatz, Horae Soc. Ent. Ross. X, 1873, p. 127. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1080. — Sarepta

fuscorufa Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 178. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 268. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 282. — Japan, Amur

consociata Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 213.

russata Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 646 (nec Fairm.!); conf. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (139), Sitzb.

hexastigma Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 140. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 382. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 25. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Süd-Frankreich, Spanien

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1893, p. 173.

humeralis Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 103. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078. — Algier, Südspanien

corrosa Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 39. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 383.

ellipsodes Mars. Abeille XVI, 1876, p. 35; conf. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (140), Sitzb.

hyalina Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 205; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080. — Castilien

Jacobsoni Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (138), Sitzb. — Fokien

japana Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 212. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 295 (*piperata* var.). — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 19. — Japan, Formosa, Indochina

rugifera Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; conf. Weise, l. c., Spaeth, l. c. 1914.

inquinata Brullé, Expéd. scient. Morée III, I, 1832, p. 266, t. 44, f. 3. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 494. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 99. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080. — Bedel, Abeille XXIX, 1897, p. 36; Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 338. — Süd-Europa, Süd-Ungarn, Siebenbürgen, Frankreich, Algerien, Syrien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 206. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXX, 1911, p. 298.

Bohemani Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 346. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 305.

plana Charp. Horae Ent. 1825, p. 232; conf. Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 42. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 338.

depressa Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 141. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 380. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 12 und 21. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080.

palaestina Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 21 (nec Reiche!).
sordida Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 348. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 40. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080.
tangeriana Pic, Echange XXIV, 1908, p. 58.

lineola Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 119, t. 2, f. 23. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 210. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 450. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2. 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 77. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1093. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (138), Sitzb. — Ost-Europa, Sibirien, Mongolei, China, Japan

Biologie: Letzn. Zeitschr. Ent. Ver. Schles. IX, 1855, p. 80. — Rupertsb. Natur u. Offenb. XXII, 1876, p. 400.
nigroguttata Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 281.
ab. *russica* Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 232, t. 131, f. 1 ♂. — Osteuropa, Sibirien, Mongolei
bicostata Fisch. Cat. Col. Sib. or. Karel. 1842, p. 24 ♀.
signata Herbst, l. c. p. 234, t. 131, f. 2 ♀.
suturalis Fisch. l. c. p. 24 ♂.
var. *sibirica* Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 306 ♀. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 493. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 97. — Spaeth, l. c. p. (138). — Sibirien, China, Mongolei
ab. *nigrostrigata* Fairm. Revue d'Ent. VII, 1888, p. 157. — Spaeth, l. c. p. (138). — Sibirien, Mongolei, China

mongolica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 449. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (139), Sitzb. — Ost-Sibirien, Mongolei, China
russata Fairm. Revue d'Entom. VI, 1887, p. 335.

murraea L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 575; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1635. — F. Syst. Ent. 1775, p. 90; Spec. Ins. I, 1781, p. 108; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 294; Syst. El. I, 1801, p. 390. — Vill. Ent. I, 1789, p. 91. — Preysl. Böhm. Ins. 1790, p. 90. — Scriba, Journ. 1790, p. 179. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 181. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 379; Ent. VI, 1808, p. 977; 97, t. 1, f. 7. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 72; ed. Hellw. I, 1795, p. 77. — Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 104. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 154. — Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 48. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 476. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 240, t. 130, f. 12, 13. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 434. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 366. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 101. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Luc. Expl. Alg. II, 1849, p. 513. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 358. — Paläarkt. Region bis Zentralasien

Bach, Käferf. III, 1856, p. 73. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 319. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489; ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 787. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 397, t. 142, f. 1; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 5 und 15 *(Pseudocassida)*. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1092. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 207 und (1901), p. 333 *(Murrayi)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 517. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 214, t. 150, f. 15.

Biologie: Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1799, p. 9. — Geoffr. Hist. abrégée I, 1762, p. 315. — Lyonet, Rech. d'Anat. 1832, p. 119, t. 12, f. 7, 8. — Grav. Acta Acad. Leop.-Carol. 1842, p. 435, t. 23, f. 1—4. — Klingelh. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 26. — Pfluemer, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 72; IX, 1848, p. 91. — Duf. Ann. Sc. Nat. III, 1847, p. 14, t. 17, f. 43. — Rupertsb. Natur u. Offenb. XXII, 1876, p. 379, t. 17, 20, 31.

varia Latr. Hist. Nat. XII, 1804, p. 28.

variegata Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 141.

maculata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 575; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1638. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 175. — Goeze, Eur. Fauna VIII, 1779, p. 312. — Vill. Ent. I, 1789, p. 92. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 378. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 216. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1797, p. 10. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 147. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 103. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 359. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 397, t. 142, f. 2; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 16. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1092. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 214 (juvenilis).

ab. *immaculata* Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 16. — Weise, l. c. p. 1092. — Reitt. l. c. p. 214.

subobliterata Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80.

ab. *inundata* Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 14.

dorsalis Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1092. — Reitt. l. c. p. 214.

nebulosa L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 575; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636; Fauna Suec. ed. 2, 1761, p. 152. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Eur. Fauna VIII, 1779, p. 310. — Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 49; Fauna Boica I, 1798, p. 520. — Petagna, Ins. Calabr. 1787, p. 8. — Vill. Ent. I, 1789, p. 91. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 56. — Scriba, Journ. 1790, p. 178; Beytr. II, 1791, p. 83, t. 8, f. 2. — Ol. Enc. Europa, nördliches Asien, Japan, Madeira(?)

méth. V, 1790, p. 379; Ent. VI, 1808, p. 979; 97, t. 2, f. 31. — Panz. Fauna Germ. I, 1795, p. 154. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 483. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 47. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 236, t. 130, f. 9, 11. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 145. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 442. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 367. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 189. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 277 (auch Biologie). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 522; ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 451. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 439; Cat. Mad. 1857, p. 129; Cat. Col. Ins. Can. 1864, p. 419; Col. Atlant. 1865, p. 375. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 77. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 318. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489; ed. 2, 1891, p. 701; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 398, t. 142, f. 11; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 7 und 25. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1109. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 208 und (1901), p. 339. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 518. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215, t. 150, f. 20.

Biologie: De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 324, t. 5, f. 19—25. — Grav. Acta Ac. Leop.-Carol. XIX, 1842, II, p. 437. — Kollar, Verh. Landw. Ges. Wien (n. F.) XI, 1842, p. 134. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 281. — Hüber, Mém. Soc. Phys. Genf XI, 1846, p. 177. — Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, Bull. p. 71. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 397. — Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 394, t. M, f. 25, 26. — Taschenb. Landw. schädl. Ins. 1865, p. 66, t. 6, f. 9, 10. — Kinker, Tijdsch. v. Ent. XV, 1872, Versl. p. LVI. — Girard, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 220. — Rupertsb. Nat. und Offenb. XXII, 1876, p. 400, t. 3, 4, 30; Wien. Ent. Zeit. XII, 1893, p. 291. — Brischke, Schrift. Nat. Ges. Danz. (n. F.) V, 4, 1883, p. 114. — Engel, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 316. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXXIII, 1887, p. 113. — Jablon. Rovart. Lap. XIII, 1906, p. 135. — Noël, Naturaliste XXX, 1908, p. 9.

affinis F. Syst. Ent. 1775, p. 88; Spec. Ins. I, 1781, p. 108; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 293; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 388. — Laich. Tyr. Ins. I, II, 1781, p. 110. — Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. 1781, p. 50. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637. — Vill. Ent. 1789, p. 93. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 379; Ent. VI, 1808, p. 980; 97, t. 3, f. 47. — Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 104. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 153. — Cederjh. Fauna Ingr. 1798, nr. 173.

maculata F. Syst. Ent. 1775, p. 88; Spec. Ins. I, 1781, p. 107; Mant. Ins. I, 1787, p. 62 (nec L.!).
nigra Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 258, t. 131, f. 12. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 291; V. 1844, p. 142; VII, 1846, p. 362. — Schwaegrichen, Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 403 (*atra* lap. calami). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 95. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1109. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 215.
tigrina De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 168, t. 5, f. 15, 16. — Scriba, Journ. 1790, p. 178. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 378. — Rossi, Mant. II, App. 1794, p. 89. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 155.

palaestina Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 55. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 132. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (140), Sitzb. — Palästina, Kaukasus, Kleinasien, Turkestan
palaestinae Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 362.
incompta Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 334; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1105.

pallidicollis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 138; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 340. — Fairm. Revue d'Ent. VII, 1888, p. 158. — Ussuri, Korea, Mongolei
diabolica Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 142 (conf. Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (139), Sitzb.).
subspec. *Morawitzi* Jacobs. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 245 *(Mionycha)*; Revue Russe d'Ent. X, 1910, p. 60. — Westsibirien, Amur

pannonica Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 147. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1108. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 335. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (141), Sitzb. — Östl. Europa bis Zentralasien
var. *elongata* Weise, l. c. p. 1108. — Sarepta
var. *fraudulenta* Spaeth, l. c. p. (141), Sitzb. — Zentralasien, Nieder-Österreich, Ungarn

Panzeri Weise, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 14. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 216.
thoracica Panz. Fauna Germ. 1796, 38, 24. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 478. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 228, t. 129, f. 11. — F. Syst. El. I, 1801, p. 338. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 976 (excl. fig.). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 489. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 187. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 142. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 376. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 74. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 322. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 19 (nec p. 12!). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1079 — Mittel- u. Nordeuropa, Sibirien

und 1105. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIX, 1900, Bull. p. 117; Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1901), p. 334; — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 520 (nec Geoffr.!)

viridis Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 46; Acta Holm. 1801, p. 120 (nec L.!).

Pellegrini Mars. Abeille V, 1868, p. 213. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. LXIV, 1914, p. (142), Sitzb. — Beyrut

piperata Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, p. 62; Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 1845, p. 12. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 171; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 322. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 295. — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 19. — Amur, Ostchina, Japan, Formosa

biguttulata Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 275.

labilis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 62.

sparsa Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 284.

prasina Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 481. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1081 und 1101. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 337. — Everts, Col. Neeerl. II, II, 1901, p. 521. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 218. — Paläarkt. Region

sanguinolenta var. Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 40.

chloris Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 188. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 384. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 74. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 92. — Letzner, Bericht schles. Ges. LVII, 1879, p. 5. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 399. — Acloque, Faune France 1896, p. 457.

viridana Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 224 (excl. Abbild.).

Biologie: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 91 *(chloris* et *languida)*. — Rupertsb. Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 397, f. 24.

Reitteri Weise, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 238; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080. — Armenien

rhilensis Weise, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 205; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893). p. 1081. — Rhilo Dagh, Balkan

rubiginosa Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Ill. Mag. Ins. I, 1794, p. 93; Käf. Preuss. I, 1798, p. 479. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 223, t. 129, f. 7. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 437 (excl. var. c, d). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 366. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 187. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 135. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 373. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 952; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 74. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 320. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488; ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 13 und 17. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—1893 (1893), p. 1079 und 1104. — Paläarkt. Region Canada

Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 336. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 519. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217, t. 150, f. 18. — Schaeffer Journ NY Ent Soc. XII, 1904 p 257

Biologie: Lyonet, Mém. Mus. d'hist. Paris XVIII, 1829, p. 422, t. 23 (12), f. 1—4. — Grav. Acta Ac. Leop.-Carol. XIX, 1842, II, p. 436. — Cornel. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 396. — Elditt, Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 352, t. 2, f. A, B. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, t. 9, f. 4. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 373. — Rupertsb. Nat. u. Offenb. XXII, 1876, p. 397, f. 18, 19, 21, 25. — Völker, Ent. Blätt. VII, 1911, p. 44 (mit Tafel). — Heikertinger, Verh. zool., bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 43.

alpina Bremi, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1856, p. 197. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 364.

cardui De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 174 (ex p.).

melanosceles Schrank, Fauna Boica 1798—1804, p. 520.

prasina F. Syst. El. I, 1801, p. 388 (nec Ill.)! (conf. Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 391).

similis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 144.

singularis Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 369.

vibex Gemm. u. Har. Cat. Col. XII, 1876, p. 3659 (nec L.!).

viridis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 37. — F. Syst. Ent. 1775, p. 88; Spec. Ins. 1781, p. 107; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 292; Syst. El. I, 1801, p. 387. — Panz. Fauna Germ. 96, t. 4; Ent. Germ. 1795, p. 153 (auch Larve). — Fisch. Naturg. Livl. 1778, p. 132. — Barbut, Gen. Ins. Linn. 1781, p. 34, t. 3. — Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. 1785, p. 140. — Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 72; ed. Hellw. I, 1795, p. 77. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 378; Ent. VI, 1808, p. 975; 98, t. 2, f. 29. — Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1797, p. 9. — Cederjh. Fauna Ingr. 1798, nr. 172. — Payk. Fauna Suec. II, 1798, p. 45; Acta Holm. 1801, p. 119. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 53. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 401, t. 142, f. 5, 6. — Schaeffer, Journ NY Ent Soc. XII 1904 p 60

ab. *fuliginosa* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1104.

nigra Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 142 (nec Herbst!).

var. *graeca* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 104. — Dalmatien, Griechenland, Rhodus, Kleinasien

var. *rugosopunctata* Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 177. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 273. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 281. — Weise, Arch. f. Naturg. LXVI, 1900, I, p. 294. — Ostasien, Japan

erudita Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 212.

rufovirens Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 144. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 386. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 75. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3. 1874, II, p. 522. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1081 und 1097. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 336. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 520. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217. — Mitteleuropa

denticollis var. Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 11 (*flavovirens* laps. calam.) und 23.

sanguinolenta Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 213. — Payk. Fauna Succ. II, 1798, p. 46. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 482. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 229, t. 129, f. 12. — F. Syst. El. I, 1801, p. 389. — Latr. Gen. Crust. et Ins. III, 1807, p. 52. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 978; 97, t. 6, f. 107. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 441. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 369. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 188. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 208. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 521; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 388. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 74. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 322. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 90. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488; ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 399, t. 142, f. 7; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 24 (pars). — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1081 und 1100. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 337. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 521. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 218, t. 150, f. 17. Paläarkt. Region

Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 91 *(languida)*. — Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX 1908, p. 205.

cruentata Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 445; Donov. Brit. Ins. t. 63, f. 2, 3.

sanguinosa Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 105.— Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 369. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 73. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 488; ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 788. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 12 u. 20. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1081 und 1102. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 336. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 521. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 218. Paläarkt. Region

Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 391. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 66;

Nouv. et faits 1874, p. 188. — Rupertsb. Natur und Offenb. XXII, 1876, p. 379.
languida Cornel. Stett. Ent. Zeit. XII, 1851, p. 88 (excl. Biologie; conf. Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1103 und Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 205). — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 383. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 75. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 955; ed. 3, 1874, II, p. 523. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 20.
prasina Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 221, t. 129, f. 6 d (nec Ill.!).
thoracica Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 366 (nec Panz.!).
ab. *viridissima* Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217, 218.

sareptana Kraatz, Horae Soc. Ent. Ross. X, 1873, p. 126. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 38. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1080. — Sarepta

saucia Weise, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 260; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082. — Caucasus, Kleinasien

seladonia Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 644. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 372. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 323. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 86. — Seidlitz, Fauna Transsylv. 1891, p. 787. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 23 und 40. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1077 und 1095. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 338. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 517. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 213. — Mediterran-Gebiet, Deutschland, Schweden
filaginis Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, Bull. (1856), p. 79. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 363.
rotundicollis Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr.(3) VIII, 1860, p. 348. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 512. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 303.

Spaethi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 458. — Amur, Askold, Korea
Kraatzi Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 295.
stigmatica Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 267 (nec Suffr.!).

stigmatica Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 206. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 385. — Bach, Käferf. III, 1856, p. 74. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 954; ed. 3, 1874, II, p. 522. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 88. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078 und 1098. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 210 und (1901), p. 337. —Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 520. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217. — Mittel-Europa, Sibirien, Zentralasien
Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 361 *(chloris)*; XII, 1851, p. 91 *(chloris)*; conf. Weise, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 205. — Rosh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 142.
sanguinolenta var. Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 24.

turcmenica Weise, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 238 *(Cassidula)*; Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1082. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (142), Sitzb. — Zentralasien

Hauseri Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 72.

undecim-notata Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 306; XIV, 1841, p. 615; XXI, 1848, p. 10. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 492; IV, 1862, p. 296. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1071 *(Chiridula)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. (133), Sitzb. — Turkestan

subspec. *undecim-guttata* Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 265. — Jacobs. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIII, 1901, p. 49 *(Chiridula)*. — Spaeth, l. c. p. (134), Sitzb. — Turkestan Persien

impicticollis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 96; Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 117 *(Chiridula)*.

velaris Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 28. — Ostsibirien, Japan

vibex L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 575; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637. — F. Syst. Ent. 1775, p. 89; Spec. Ins. I, 1781, p. 108; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1792, p. 293; Syst. El. I, 1801, p. 389. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 48. — Vill. Ent. I, 1789, p. 92. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 379; Ent. VI, 1808, p. 977; 97, t. 2, f. 30. — Rossi, Mant. II, 1790, App. p. 89. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 66. — Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 104. — Scriba, Journ. 1790, p. 178; Beytr. II, 1791, p. 80, t. 8, f. 1. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 154; Fauna Germ. 96, 6. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 477. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 218, t. 129, f. 5c. — Payk. Acta Holm. 1801, p. 118. — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 440. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1832, p. 367. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835—39, p. 188. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 146. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 520; ed. 2, 1858, p. 953; ed. 3, 1874, II, p. 521. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 377. — Bach, Käferfauna III, 1856, p. 74. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 321. — Seidl. Fauna Balt. 1875, p. 489; ed. 2, 1891, p. 702; Fauna Transsylv. 1891, p. 789. — Fowler, Col. Brit. Isl. IV, 1890, p. 398, t. 142, f. 4; Suppl. VI, 1913, p. 294. — Desbr. Mon. Cassid. 1891, p. 12 und 19. — Weise, Ins. Deutschl. VI, 1881—93 (1893), p. 1078 u. 1107. — Acloque, Faune France 1896, p. 457. — Bedel, Col. Bassin Seine V, 1889—1901 (1898), p. 209 und (1901), p. 335. — Everts, Col. Neerl. II, 1901, p. 519. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217, t. 150, f. 19. — Paläarktische Region

Biologie: Cornel. Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 399. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 206. — Rupertsb. Natur u. Offenb. XXII, 1876, p. 379, f. 28.

angusticollis Hagenb. Symb. Faun. Helv. I, 1822, p. 8, f. 2. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 100.
dorsalis Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 227, t. 129, f. 10.
liriophora Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. III, 1797, p. 8 (auch Biologie).
ab. *discoidea* Weise, Ins. Deutschl. VI, 1893, p. 1108. — Reitt. Fauna Germ. IV, 1912, p. 217.
vibex Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 218, t. 129, f. 5 (sec. Weise).

virguncula Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, I, p. 645; Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 260. — Shan-si

---

pallida Thunb. Ins. Suec. VIII, 1794, p. 103. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 528. — Upsala

b) Aus dem tropischen Asien (Indien. Süd-China), von den Malayen-Inseln und Philippinen.

Andrewesi Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 111. — Vorder-Indien

aspectabilis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 557. — Vorder-Indien: Madura

Belli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 112. — Vorder-Indien

conspurcata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 401. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 124. — Ost-Indien

corruptrix Spaeth, Deutsche, Ent. Zeitschr. 1914, p. 561. — Birma

Delesserti Boh. Mon. II, 1854, p. 408. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 124. — Ost-Indien
ab. *gemella* Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 551.

dorsata Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Bull. p. 50. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 111; 1905, p. 124 *(Odontionycha)*. — Bengalen, Ostindien

dorsonotata Boh. Mon. II, 1854, p. 409. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 110 *(Odontionycha)*. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 552. — Ost-Indien

ellipticollis Spaeth, l. c. p. 558. — Vorder-Indien: Madura, Nilgiri

enervis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 338. — Bombay

exilis Boh. Mon. II, 1854, p. 407. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 559. — Ost-Indien

Feae Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 71. — Birma

flavoguttata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 555. — Nilgiri

flavoscutata Spaeth, l. c. p. 556. — Vorder-Indien, Himalaya

fumida Spaeth, l. c. p. 562. — Birma

fuscosparsa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 473. — Assam

gilva Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 55 *(Odontionycha)*. — Ceylon

glabella Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 428. — Nilgiri

Hopei nom. nov. — Ost-Indien

pallida Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 132. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 125 *(Odontionycha).*

Horni Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 54. — Ceylon

icterica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 400. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 111. — Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 71. — Ost-Indien

indicola Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 448 *(Odontionycha).* — Bengalen

informis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 312. — Hongkong

interstitialis Spaeth, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1901, p. 12. — Sumatra

Juno Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 324. — Hongkong

justa Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 554. — Vorder-Indien, Himalaya

Moori Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 124; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 299. — Ost-Indien

nigriventris Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 410. — Thibet, Himalaya

nigrogibbosa Spaeth, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1901, p. 10; Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 71. — Sumatra

nilgirica Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 549. — Nilgiri

nucula Spaeth, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 228. — Yünnan

obtusata Boh. Mon. II, 1854, p. 405. — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 19. — Ost-Indien, Süd-China, Philippinen, Formosa

Biologie: Kershaw & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 251.

occursans Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 560. — Assam, Sikkim

pauxilla Boh. Mon. II, 1854, p. 406. — Ost-Indien

petulans Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 550. — Sikkim, Madura

picifrons Weise, Philippin. Journ. of Science III, 1908, p. 259, t. 6, f. 3 *(Odontionycha).* — Manila

Biologie: Schultze, Philippin. Journ. of Science III, 1908, p. 266, t. 3, f. 5—7 *(Odontionycha).*

probata Spaeth, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 229. — Yünnan

pulvinata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 440. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 130. — Nilgiri, Pondichery

pusillula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 327. — Ost-Indien

residua Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 53. — Ceylon

saginata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 553. — Nilgiri

signifera Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 123. — ,,

spissa Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 112. — Ost-Indien: Kanara

subtilis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 111; 1905, p. 125. *(Odontionycha.)* — Nilgiri

syrtica Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 129; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 311. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 123. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 548. — Ost-Indien

ab. *rugulosa* Boh. Cat. 1856, p. 129; Mon. IV, 1862, p. 316. — Spaeth, l. c. p.

timefacta Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 131; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 321. — Ceylon

c) Aus Neu-Guinea.

permodica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 349. — Neu-Guinea

d) Aus Australien.

Adelaidae Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 106. — Süd-Australien

denticulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 137; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 338. — Australien

mera Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 246. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 494. — „

ab. *profundestriata* Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 216; LXI, 1901, p. 346. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral XXIV, 1900, p. 169.

navicella Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 331. — Victoria

perpusilla Boh. l. c. p. 335. — „

prothoracica Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 107. — Neu-Süd-Wales

e) Von Madagascar und den benachbarten Inseln.

agilis Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Madagascar

bicallosa Spaeth, l. c. p. . — Diego Suarez

breviuscula Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 274. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 503. — Soalala

circumsepta Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Madagascar

collucens Spaeth, l. c. p. . — Tananarivo

concallescens Spaeth, l. c. p. . — Fort Dauphin

consobrina Spaeth, l. c. p. . — Tananarivo

Coquereli Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 308. — Mayotte

currax Spaeth, l. c. p. . — Diego Suarez

dorsomicans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 273. — Madagascar

dulcis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 430 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Festschrift 1915, p. . — „

exsanguis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 470. — Ankarahitra

fallaciosa Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 274. — Androy

Ferranti Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Tananarivo

frontalis Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 143; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 345. — Madagascar

funebris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 275. — Ankarahitra

inconstans Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LVIII, 1899, p. 506 *(Coptocycla)*; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 272 *(Cassida)*. — Suberbieville

insularis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 433. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 442. — Madagascar

laetabilis Spaeth, Festschr. Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — „

laetifica Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 480. — „

latecincta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 272. — Diego Suarez
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 143 *(lateocincta)*.
lateritia Fairm. l. c. p. 272. — Ankarahitra, Soalala
limbella Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LVIII, 1899, p. 507. — Nossi-Bé
lyrica Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 273. — Madagascar
Mariae Adelheidae Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Tananarivo
nigroscutata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 273. — Ankarahitra
nigrotecta Fairm. l. c. p. 274. — „
ovoidea Fairm. l. c. p. 271. — Mudivalo
pallescens Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 334. — Mayotte
picta Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 104. — Madagascar:
nigroguttata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 275. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 480. — Diego Suarez
plicatula Fairm. l. c. p. 271. — „
prospera Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Madagascar
pubescens Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 107. — „
punctatissima Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 481 *(Cassidula)*. — „
pusio Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Diego Suarez, Amber-Gbg.
rufomicans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 271. — Ankarahitra, Soalala
rugosicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 106.
sanguineoguttata Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . — Diego Suarez
striola Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysomel. p. 481 *(Cassidula)*. — Madagascar
tenax Spaeth, Festschrift 1915, p. . — Tananarivo
trossula Spaeth, l. c. p. . — „
varicolor Spaeth, l. c. p. . — Diego Suarez

---

subrufa Fairm. (i. l. ?). — Madagascar
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 140.

f) Von Afrika und den benachbarten Inseln (mit Ausnahme von Madagascar und der paläarktischen Region).

α) Aus der Gruppe der C. vigintimaculata Thunb.

Übersicht: Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 397.

cinctidorsum Weise, Wiss. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped., 1912, IV, p. 162. — Zentral-Afrika: Ruwenzori
— Mashk 1916 P.Z.S. p. —
decipiens Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 389. — Mashona
deplanata Spaeth, l. c. p. 395. — Abessinien
fugax Spaeth, l. c. p. 396. — Zambesi

gallarum Spaeth, l. c. p. 394. — Britisch-Ostafrika

Kraatzi Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 222. — Spaeth, l. c. p. 396. — Kamerun

manubialis Spaeth, l. c. p. 385. — Nyassa, Ungoni

Pauli Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 222. — Usambara
ab. *deleta* Weise, Archiv f. Naturgesch. LXV, 1899, I, p. 242.

punctipennis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 392. — ,,

revulsa Spaeth, l. c. p. 390. — Nyassa, Ungoni

silphoides Spaeth, l. c. p. 387. — Nyassa, Ungoni

Sjöstedti Spaeth in Sjöstedt, Exped. Kilim. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 268. — Kilimandjaro
ab. *intorsa* Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 497.

stictica Har. Col. Hefte XII, 1879, p. 216. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 455; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 398. — Angola, Congo

suahelorum Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 242. — Usambara

suspiciosa Weise, Arch. f. Naturg. LXIX, 1903, I, p. 223. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 388. — Deutsch-Ostafrika (südlicher Teil), Nyassa, Süd-Congo
ab. *connexa* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 59. — Uhehe
ab. *picturata* Spaeth, l. c. p. 388. — Nyassa

vigintimaculata Thunb. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 86, t. 5, f. 95. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 264, t. 132, f. 6. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 354. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 398. — Südafrika, Natal
ab. *scripta* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 82; Syst. El. I, 1801, p. 395. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 351. — Boh. Mon. II, p. 356. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 242. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 398.

β) Aus der Gruppe der C. tosta Klug.

coagulata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 468. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 458; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 268. — Südost-Afrika, Zambesi, Usambara

Harnoncourti Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 458. — Kilimandjaro

inaequalis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 231. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 362. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 458; Ark. f. Zool. I, 1903, p. 178. — West-Afrika
var. *marginata* Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 220. — Kamerun

irrorata Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 221. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 458; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. — Ostafrika

1910, I, Col. 13 (1909), p 268; Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 496.

rugipennis Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 456. — Congo

tosta Klug, Erman's Reise, Ins. 1835, p. 47. — Boh. Mon. II, 1854, p. 486. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 459. — West-Afrika bis Uganda

fossulata Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 142; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 350.

γ) Sonstige Arten.

aethiopica Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 368. — Nubien

ancorifera Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 130; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 319. — Sierra Leone

aridella Weise, Denkschr. med.-naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 151. — Deutsch-Südwest-Afrika: Keetmannshoop

calvaria Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 215 *(Odontionycha)*. — Usambara

Chapuisi Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 502. — Erithraea

coloraria Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 309. — Cap

consimilis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 477. — „

convexa Boh. l. c. p. 418. — Südafrika

convexula Boh. l. c. p. 421. — „

corpulenta Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 173. — Kamerun

delenifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 313. — „

depicta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 315. — Spaeth, Ark. för Zool. I, 1903, p. 178; Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 503. — Zentral-Afrika bis an die Ost- und Westküste

usambarica Weise, Archiv f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 221 *(Odontionycha)*.

dorsovittata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 395. — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 503. — Ost- und Süd-Afrika, Abessinien

eluta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 319. — Abessinien

fuscosignata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 399. — Senegal

granula Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 131; Mon. IV, 1862, p. 325. — Guinea

granulicollis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 108. — Mozambique, Transvaal

guttipennis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 201. — Natal

hebes Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 217. — Usambara

humerosa Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 455. — Congo

infastidita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 313. — Kamerun

infirma Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 359. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 273 *(Odontionycha)*; Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 503. — Ost-Afrika, Abessinien, Natal

var. *hirsutula* Spaeth in Sjöstedt, l. c. p. 273 *(Odontionycha)*. — Östliches Aequatorial-Afrika

var. *pilifera* Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 244 *(Odontionycha)*. — Spaeth, l. c. p. 273 *(Odontionycha)*.

var. *setosa* Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 30 *(Chirida)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 245. — Spaeth, l. c. p. 273 *(Odontionycha)*. — Abessinien, östl. Aequatorial Afrika

innotata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 403.	Natal
irregularis Boh. l. c. p. 398.	„
kilimana Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 269 *(Odontionycha)*; Ann. Mus. Nat. Hung. X, 1912, p. 497.	Kilimandjaro
lacrimosa Boh. *(lacrymosa)* Mon. Cassid. II, 1854, p. 397.	Natal
minuta Boh. l. c. p. 431.	Cap
morata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 347. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 19. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 277.	Senegal
muirana Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1904, p. 13, t. 5, f. 25 (auch biologisch).	Natal
neglecta Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 216 *(Odontionycha)*.	Usambara
obscuripennis*) Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IV, 1856, p. 124; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 300.	Have-Blanche
Penelope Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 324.	Cap
propitia Boh. l. c. p. 318.	Kamerun
puberula Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 30 *(Chirida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 272 *(Odontionycha)*.	Abessinien
pumilio Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 426.	Natal
pyxidata Boh. l. c. p. 360.	Kamerun
quatuordecim-signata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 217.	Natal
romula Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 268.	„
scutellaris Klug, Erman's Reise, Ins. 1835, p. 48. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 478.	Senegal
semiglobosa Boh. l. c. p. 441.	Natal
setifera Boh. l. c. p. 426.	Senegal, Zanzibar
sparsuta Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 55.	Ukamba
sphaerula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 434.	Süd-Afrika
hottentotta Boh. l. c. p. 435.	
stabilis Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 241.	Usambara
sublesta Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 173; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 43 *(Odontionycha)*.	„
Suffriani Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 465.	Natal
sulfurago Boh. l. c. p. 414.	„
sulfurea Boh. l. c. p. 393.	Cap
tenuicula Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 130; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 320.	Guinea
Thomsoni Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 302.	Betschuana
Pentheri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 109.	
troglodytes Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 396.	Sierra Leone
umbrata Boh. l. c. p. 420.	Natal
unimaculata Boh. l. c. p. 466.	„
vafra Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 323.	Kamerun
vespertilio Boh. l. c. p. 310.	Cap, Natal
viridipennis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 394.	Natal. Cap
Weinmanni Chap. Ann. Mus. Civ. Genova XV, 1880, p. 30.	Abessinien
choana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 49.	

*) Vielleicht identisch mit *Aspidomorpha areata* ab. *nigripennis* Weise?

g) Aus Amerika.

bivittata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1827, p. 295. — Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 78. Biologie: Walsh & Riley, Ann. Ent. I, 1869, p. 228. — Riley, Report 1881, p. 53. *striolata* Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 444. *vittula* Boh. l. c. p. 445. — Mittel- und Südstaaten von U. S. A.

deflexa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 50. — Minas Geraës

Drewseni Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 292 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 221. — Südöstl. Brasilien, Uruguay, Argentinien

fuscovittata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 281 *(Coptocycla)*. — Uruguay

immersa Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 389. — Argentinien, Südl. Brasilien

quadrivittata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 285 *(Coptocycla)*. — Brasilien

cassidata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 235, t. 131, f. 3. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 522. — Patria?

cayennensis Fisch. Mém. Soc. Imp. R. Mosc. II, 1809, p. 45. — Cayenne

cruentata Ol. Ent. VI, 1808, p. 929; 97, t. 4, f. 53. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 521. — Patria?

dispar Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 267, t. 132, f. 10. — Boh. l. c. p. 523. — Indien?

leucophaea L. Cent. Ins. 1758, p. 10; Amoen. Acad. VI, 1763, p. 393; Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, 1, IV, p. 1640. — F. Syst. Ent. 1775, p. 92; Spec. Ins. I, 1781, p. 113; Mant. Ins. I, 1787, p. 65; Ent. Syst. I, 1792, p. 303; Syst. El. I, 1801, p. 403. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 346. — Boh. l. c. p. 520. — Südamerika

pumila Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 276, t. 133, f. 7. — Boh. l. c. p. 524. — Sierra Leone

263

Jonthonota Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 141 (Typus: *nigripes* Ol.).

mexicana Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 176, t. 9, f. 14 *(Cassida)*. — Mexico

nigripes Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 384; Ent. VI, 1808, p. 959; 97, t. 5, f. 81 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 362 *(Cassida)*. — Crotch, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 77 *(Cassida)*. Biologie: Riley, Index Reports p. 53 *(Cassida)*. *atripes* LeC. Col. Kansas 1859, p. 28 *(Cassida)*. var. *ellipsis* LeC. l. c. p. 28 *(Cassida)*. — Südliches Nord-Amerika; Longs Peak

novemmaculata Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 308 *(Cassida)*. — Boh. Mon. II, 1854, p. 363 *(Cassida)* — Californien

Agroiconota Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 142 (Typus: *tristriata* F.).

stupidula Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 295 *(Coptocycla)*.	Brasilien, Misiones
tristriata F. Ent. Syst. I, 1792, p. 295; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 332 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 972; 97, t. 6, f. 101 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 443 *(Cassida)*.	Brasilien, Cayenne, Misiones, Paraguay

2

Saulaspis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 143.

aemula Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 447 *(Cassida)*.	Brasilien
bistrilineata Boh. Mon. II, 1854, p. 442 *(Cassida)*.	Montevideo, Ost-Argentinien
graphica Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 543 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 446 *(Cassida)*.	,,

3

Gratiana Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 142 (Typus: *spadicea* Kl.).

conformis Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 389 *(Cassida)*.	Südl. Brasilien, Bolivia, Argentinien
graminea Klug, Preisverz. 1829, p. 8. *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 392 *(Cassida)*.	Süd-Brasilien, Argentinien
insculpta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 340 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 177 *(Cassida)*.	Yucatan
lutescens Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 391 *(Cassida)*.	Argentinien
pallidula Boh. Mon. II, 1854, p. 457 *(Cassida)*. — Champ. l. c. p. 177, t. 9, f. 16 *(Cassida)*.	Texas, Californien, Mexiko
texana Crotch, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 78 *(Cassida)*.	
Biologie: Riley, Am. Natur. XVI, 1882, p. 679 *(Cassida)*.	
spadicea Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 390 *(Cassida)*.	Süd-Brasilien, West-Argentin.

6

Scaeocassis Spaeth.

Spaeth, Arch. f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 141.

combusta Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 486 *(Cassida)*.	Unterer Amazonenstrom

1

Rhoia Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 144.

Clavareaui Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 145. — Goyaz

1

Crambelea Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 143.

illudens Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 182 *(Batonota)*. — *intumida* Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 410 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 396. — Brasilien

1

Asteriza Boh.

Boh. Monogr. Cassid. II, 1854, p. 495. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 387.

flavicornis Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 393 *(Cassida)*; Ent. VI, 1808, p. 957; 97, t. 1, f. 5. — Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 496, t. 6, f. F. — Haiti

1

Orectis Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 346 (Typus: *rugosa* Boh.).

Parorectis Spaeth, l. c. p. 346 (Typus: *callosa* Boh.).

callosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 471 *(Cassida)*. — Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1873, p. 78 *(Cassida)*. — Texas

rugosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 472 *(Cassida)*. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 177, t. 9, f. 17. *(Cassida)*. — Mexiko

2

Hybosa Boh.

Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 1. — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 381.

Bestimmungstabelle: Wagener, Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 62.

acutangula Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 163. — Paraguay, Misiones, Espirito Santo

cynthia Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 5, t. 7, f. A. — Brasilien, Paraguay

fornicata Boh. l. c. p. 4. — Brasilien: Goyaz

galbanata Boh. l. c. p. 6. — Columbien

gibbera Boh. l. c. p. 2. — Brasilien
indecens Boh. l. c. p. 3. — „
margineguttata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 64. — „
mellicula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 366. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIV, 1883, p. 106. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 178, t. 9, f. 18. — Zentral-Amerika, Columbien, Venezuela, Guyana
turbulenta Boh. l. c. p. 367. — Brasilien
unicolor Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. V, 1881, p. 64. — Columbien
10

Chersinella Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 175.

heteropunctata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 459 *(Cassida)*. — Champ. l. c. p. 175, t. 9, f. 12 (♂). — Columbien, Panama
1

Philaspis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturgesch. LXXIX, 1913, I, p. 142.

bivulnerata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 143 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 212, t. 9, f. 24 (♀) *(Coptocycla)*. — Mexiko
polita Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. III. 1855, p. 121 *(Coptocycla)*. — Brasilien
seriatopunctata Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1901, p. 578 *(Odontionycha)*. — Paraguay, Misiones
3

Chirida Chapuis.

Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 405 (Typus: *cruciata* L. und *elatior* L.). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 12 (Typus: *cruciata* L.).

a) Aus Amerika.

cruciata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 182 (Übersetz. Goeze 1781, p. 332), t. 15, f. 15 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 383; Ent. VI, 1808, p. 955; 97, t. 5, f. 77 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 396 *(Coptocycla)*. — Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 405. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14. — Maulik 1916 P.Z.S. p. 507 — Süd-Amerika bis Argentinien
crux F. Spec. Ins. I, 1781, p. 110; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 298; Syst. El. I, 1801, p. 397 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 384 *(Cassida)*.

— Herbst, Natursyst. Käfer VIII, 1799, p. 308, t. 135, f. 5 *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 407 *(Cassida)*.

fuliginosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 397 (nec Ol.!) *(Coptocycla)*.

extensa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 261 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 193, t. 10, f. 15 (♀) *(Coptocycla)*. — Yucatan, Mexiko

hamata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 398 *(Coptocycla)*. — Brasilien

insubida Boh. l. c. p. 308 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 194, t. 10, f. 17 (♀) *(Coptocycla)*. — Columbien, Costa Rica, Venezuela

munda Boh. l. c. p. 309 *(Coptocycla)*.

signifera Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 313, t. 135, f. 9 *(Cassida)*. — Champ. l. c. p. 194, t. 10, f. 19 *(Coptocycla)*. — Canada, U.-S.-America

cruciata F. Ent. Syst. 1775, p. 90; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 297; Syst. El. I, 1801, p. 397 (nec L. !) *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 354 *(Cassida)*.

cruciata var. De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 187 *(Cassida)*.

ab. *pennsilvanica* nom. nov.

trabeata var. a Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 319 *(Coptocycla)*.

ab. *lucidula* Boh. l. c. p. 321 *(Coptocycla)*.

trabeata var. b Boh. l. c. p. 319 *(Coptocycla)*.

immunda Boh. l. c. p. 320 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 196, t. 10, f. 21 (ex p.) *(Coptocycla)*.

subspec. *Le Contei* Crotch, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 79 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 196 *(Coptocycla)*. — Arizona, Zentral-Plateau vonMexiko, Californien

subspec. *Bohemani* nom. nov. — Zentral-Amerika, Cuba

guttata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 314 (nec Ol.!) *(Coptocycla)*.

Biologie: Riley, Reports 1881, p. 53 *(Coptocycla)*.

ab. *fuliginosa* Ol. Ent. VI, 1808, p. 971; 97, t. 1, f. 8 *(Cassida)*. — Champ. l. c. p. 195, t. 10, f. 20 *(Coptocycla)*. — Zentral-Amerika, Antillen

immunita Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 318 *(Coptocycla)*.

trabeata Boh. l. c. p. 319 (excl. var.!) *(Coptocycla)*.

ab. *hamulata* Boh. l. c. p. 316 *(Coptocycla)*. — Zentral-Amerika, Antillen

ab. *lugubrina* Boh. l. c. p. 303 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 196 *(Coptocycla)*. — Mexiko

Zetterstedti Boh. l. c. p. 303 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 193, t. 10, f. 16 (♂) *(Coptocycla)*. — Mexiko

ab. *Sallei* Boh. l. c. p. 444 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 194, t. 10, f. 18 (♀) *(Coptocycla)*. — Mexiko, Guatemala

b) Aus Asien und seinen Inseln.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 126.

acutangula Weise, l. c. p. 127. — Südl. Vorder-Indien

andamanica Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 370 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 221.	Andamanen
bipunctata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, II, p. 1643 *(Cassida)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 93; Spec. Ins. I, 1781, p. 115; Mant. Ins. I, 1787, p. 66; Ent. Syst. I, 1792, p. 307; Syst. El. I, 1801, p. 408 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 392 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 271, t. 133, f. 2 (?) *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 115 *(Coptocycla)*.	Vorder-Indien
ab. *sexnotata* F. Syst. Ent. Suppl. 1798, p. 82; Syst. El. I, 1801, p. 394 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 962; 97, t. 5, f. 84 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 115 *(Coptocycla)*.	
bipunctipennis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 118 *(Coptocycla)*.	Vorder-Indien
bistrimaculata Boh. l. c. p. 112 *(Coptocycla)*.	Bengalen, Vorder-Indien
bistrinotata Boh. l. c. p. 119 (♂) *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 126.	
var. *selecta* Weise, l. c. p. 128.	Nilgiri
Bowringi Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 123 *(Coptocycla)*.	Süd-China, Tonking
gregaria Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 127.	Vorder-Indien: Anamalli, Nilgiri
mimica Weise, l. c. p. 210.	Assam
miranda Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 399 *(Coptocycla)*.	Pulo Pinang
ornata F. Syst. Ent. Suppl. 1798, p. 81; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 350 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 134 *(Coptocycla)*.	Ceylon, Süd-Indien
ab. *marginata* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 52.	Ceylon
promiscua Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 131 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 52.	Ceylon, Ost-Indien (?), Kiautschou (?)
sexnotata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 271, t. 133, f. 1 (nec F.!) *(Cassida)*.	
ab. *singularis* Weise, l. c. p. 53.	Ceylon
punctata Weber, Observ. Ent. I, 1801, p. 51 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 109.	Sunda-Ins., Tonking, Annam
punctaria F. Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 965; 97, t. 6, f. 90 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 254 *(Coptocycla)*.	
scalaris Weber, Observ. Ent. I, 1801, p. 51 *(Cassida)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 391 *(Cassida)*. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 967; 97, t. 6, f. 94 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 124 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 107 *(Metriona)*. – Manik 1916 P.Z.S. p. –	Indischer Archipel, Hinter-Indien
septem-notata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 133; IV, 1862, p. 399 *(Coptocycla)*.	Ost-Indien, Himalaya
sexmaculata Boh. Mon. III, 1855, p. 114 *(Coptocycla)*.	Ost-Indien

tredecim-notata Boh. Mon. III, 1855, p. 129 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 53. — Ceylon

tredecim-signata Boh. l. c. p. 128 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 53. — „

undecim-notata Boh. l. c. p. 116 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 129. — Ost-Indien

ab. *soluta* Weise, l. c. p. 129. — Nilgiri

ventralis Boh. l. c. p. 111 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 125. — „

Westringi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 433 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 352 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 348. — Philippinen

c) Aus Madagaskar.

hyalocincta Fairm. Revue d'Ent. XX, 1901, p. 247 *(Coptocycla)*. — Weise in Voeltzkow, Reise Ost-Afrika II, 1910, Chrysomel. p. 483. — Suberbieville

leopardina Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 255 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 276. — Madagascar

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon LII, 1905, p. 149 *(Coptocycla)*.

Nickerli Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 276. — „

d) Aus Afrika.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 23.

aequinoctialis Ol. Ent. VI, 1808, p. 966; 97, t. 6, f. 92 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 196 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 24. — West-Afrika

Ariadne Weise, l. c. p. 25. — Quango

Anbei Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 195; IV, 1862, p. 419 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 24. — West- und Zentral-Afrika

fausta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 420 *(Coptocycla)*.

Baumanni Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 459; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13, Cassid. (1909), p. 276. — Östliches Zentral-Afrika

breviuscula Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 55. — Ikuta

Circe Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 27. — Quango

congoana Spaeth, Revue Zool. Afr. II, 1912, p. 131. — Östlicher Congo: Manyema

flavipennis Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 460. — Westlicher Congo

Kraatzi Wgenr. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 161 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 24. — West-Afrika, Congo

lactifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 397 *(Coptocycla)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXIV, 1898, I, p. 223. — Spaeth, Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 179. — Kamerun, Franz. Congo

insignis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 26.

lorata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 419 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 23. — Goldküste, Liberia, Kamerun

nana Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 425 *(Cassida)*. — Natal
Gorhami Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 112.

nigrosepta Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. p. 306 *(Coptocycla)*. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1895, p. 470 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 221; in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. I, 1910, Col. 13 (1909), p. 276. — Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 245; Wiss. Ergeb. Deutsch. Zentralafr.-Exp. IV, 1912, p. 161. — Ost-Afrika, Abessinien

octoguttata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 462 *(Cassida)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 23. — Senegal

opposita Boh. l. c. p. 461 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 23. — „

quadriguttata Boh. l. c. p. 464 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 23. — „

quadriplagiata Boh. l. c. p. 460 *(Cassida)*. — Weise, l. c. p. 23. — „

rorida Boh. l. c. p. 413 *(Cassida)*. — Natal
natalensis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 111.

semivittata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 194; IV, 1862, p. 418 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 24. — Kamerun

sexoculata J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 234 *(Coptocycla)*. — Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 486 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 23. — Gabon

Tschoffeni Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 460. — West-Kongo: Boma

vernicata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, C. R. p. 306 *(Coptocycla)*. — Britisch-Ost-Afrika, Abessinien, Somali

51

Thlaspida Weise.

Weise, Archiv für Naturgesch. LXV, 1899, I, p. 272 (Typus: *cribrosa* Boh.). — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 16 (Übersicht).

biramosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 408 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 17. — Malakka, Laos, Tonking

var. *tristis* Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 273. — Spaeth, l. c. p. 17. — Sumatra?

cribrosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 404 *(Coptocycla)*. — Weise, l. c. p. 273. — Spaeth, l. c. p. 17. — Assam

Formosae Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. XI, 1913, p. 46; Suppl. Ent. III, 1914, p. 16. — Formosa

japonica Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 17. — Japan, Ost-China
biramosa var. a Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 464 *(Coptocycla)*.
biramosa Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 272 *(Coptocycla)*. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 283 *(Coptocycla)* (nec Boh.!).
biramosa Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 273.

Lewisi Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 214 *(Coptocycla)*. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 283 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, Sitzber. p. (145). Japan, Korea, Ussuri

testacea Rybakow, Horae Soc. Ent. Ross. XVIII, 1884, p. 136 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Suppl. Ent. III, 1914, p. 16.

5

Lorentzocassis Spaeth.

Spaeth in Wichmann, Nova Guinea Exped. Neerl. Zool. IX, 1913, 3, p. 449 (Typus: *papuana* Sp.).

Lorentzia (*Lorentsia* err. typ.) Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 120.

papuana Spaeth in Wichmann, Nova Guinea Exped. Neerl. Zool. IX, 1913, p. 449. Südwestl. Neu-Guinea

purpurascens Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 120 *(Lorentzia)*. Borneo

2

Thlaspidosoma Spaeth.

Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 4 (Typus: *Dohrni* Spaeth).

Dohrni Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 5. Sumatra, Sarawak

ab. *limbata* Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 119. Sarawak

fallaciosa Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 7. Sumatra

Horsfieldi Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 406 *(Coptocycla)*. Java

3

Thlaspidomorpha Spaeth.

Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 563.

Balyi Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 403 *(Coptocycla)*. Ceylon

1

Thlaspidula Spaeth.

Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 9 (Typus: *fimbriata* Spaeth).

Boisduvali Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 283 *(Aspidomorpha)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 346. Australien

fimbriata Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 9. Borneo

2

Meroscalsis Spaeth.

Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 113 (Typus: *radiata* Boh.).

Dohertyi Spaeth in Wichmann, Nova Guinea Zool. IX, 3, 1913, p. 450. Nordwestl. Neu-Guinea

pulcherrima Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 115. — Südöstl. Neu-Guinea

radiata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 389 *(Coptocycla)*. — Spaeth, l. c. 1903, p. 114. — Neu-Guinea, Aru

aruensis Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 364; 1902, p. 409 *(Coptocycla)*.

selecta Spaeth, l. c. 1903, p. 117. — Deutsch-Neu-Guinea

4

Elpinora Spaeth.

Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 119.

Mülleri Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 119. — Deutsch-Neu-Guinea: Astrolabe-Bai

1

Crepidaspis Spaeth.

Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 119.

varicornis Spaeth, Saraw. Mus. Journ. I, 1912, p. 119. — Borneo

1

Rhacocassis Spaeth.

Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 76.

flavoplagiata Baly, Journ. Ent. II, 1863, p. 12 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 77. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 125 *(Metriona)*. — Maulik 1916 P.Z.S. p. — — Borneo, Sumatra, Siam

var. *Modiglianii* Spaeth, l. c. p. 77. — Sumatra

1

Psecadia Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 458.

Psecas Weise, Arch. f. Naturgesch. LXV, 1899, I, p. 272.

chlorina Weise, Arch. f. Naturg. LXV, 1899, I, p. 272 *(Psecas)*. — Neu-Süd-Wales

1

Melichrocassis Spaeth.

Spaeth in Wichmann, Nova Guinea, Zool. IX, 3, 1913, p. 451.

Blackburni Spaeth in Wichmann, Nova Guinea, Zool. IX, 3, 1913, p. 452. — Neu-Süd-Wales

Weisei Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 118 *(Coptocycla)*. — Nord-Australien

2

Coptocycla*) Boh.

Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 90. — Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 390. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 182. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 11.

a) Aus Australien.

Sappho Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 427.	Queensland: Moreton Bay

b) Ostasiatische Arten.

lepida Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, Sitz.-Ber. p. (145).	Szetschouan
sigillata Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 284.	Japan
spilota Gorh. l. c. p. 285.	,,

c) Aus Madagaskar.

auropustulata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 558.	Betsiboka
contracta Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturf. 1915, p. .	Diego Suarez
discolor Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 412. — Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 441.	Madagascar
tricolorata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 203.	
Fairmairei Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 221.	
Goudoti Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 264.	,,
hova Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysomel. p. 483.	,,
piceidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 276.	Soalala
plicaticollis Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. .	Tananarivo
pulchra Spaeth, l. c. p. .	Diego Suarez
rimosa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 290 *(Aspidomorpha)*; IV, 1862, p. 344 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. .	Madagascar
rubroornata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 413.	,,
rudicollis Spaeth, l. c. p. .	Tananarivo
rugipennis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 405.	Madagascar
Schenklingi Spaeth, l. c. p. .	Andrangoloaka
senicula Spaeth, l. c. p. .	Tananarivo
strumosa Spaeth, l. c. p. .	,,
suaveola Spaeth, l. c. p. .	,,
taediosa Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 143; Mon. Cassid. IV, 1862, p. 344 *(Cassida)*. — Spaeth, l. c. p. .	Madagascar
trizonata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 276.	Soalala
unicatenata Weise in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, Chrysom. p. 482.	Ambergeb.

*) Die Zuteilung zu den Gattungen *Coptocycla* und *Metrioña* ist vielfach nicht verlässlich und beruht besonders bei Arten, die mir unbekannt sind, oft nur auf Vermutungen. Beide Gattungen bedürfen noch eines eingehenden Studiums, das die Abtrennung vieler heterogener Formen zur notwendigen Folge haben muß.

verrucata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 265. — Madagascar
vicinalis Spaeth, Festschrift Ges. Luxemb. Naturfr. 1915, p. . , — Andrango-loaka

d) Aus Afrika.

amorifica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 315 *(Cassida)*. — Spaeth in Sjöstedt, Zool. Exped. Kilimandj. 1910, I, Col. 13 (1909), p. 275. — N'Gami, Natal, Ost-Afrika (nicht Margelan!)
venustula Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 27; 1902, p. 404.
camerunensis Spaeth, Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 178, f. 1. — Kamerun, Fernando Poo
grammica Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 423. — Senegambien
mesomelaena Boh. *(mesomela)* l. c. p. 426. — Old-Calabar
nigrostillata Boh. l. c. p. 393. — Afrika

e) Amerikanische Arten.

adamantina Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 543 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 126. — Venezuela, Brasilien, Paraguay, Bolivia, Peru
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 202.
decempunctata Boh. l. c. p. 131. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 397.
ambita Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 199, t. 11, f. 2. — Costa Rica, Nicaragua
amoena Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 189. — Champ. l. c. p. 191, t. 10, f. 11. — Zentral-Amerika
annulus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 296; Syst. El. I, 1801, p. 394 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 236 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14 *(Charidotis)*. — Zentral- und Süd-Amerika
circularis Ol. Ent. VI, 1808, p. 970; 97, t. 6, f. 98 *(Cassida)*.
arcuata Swed. Act. Holm. 1787, p. 193 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1644 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 394 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 234. — Brasilien
atalanta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 416. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 193, t. 10, f. 14. — Zentral-Amerika bis südlich Guatemala
atroannulus Champ. l. c. p. 199, t. 10, f. 27 (♀). — Zentral-Amerika
auricoma Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 145. — Brasilien
aurifera Boh. l. c. p. 163. — „
azteca Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 188, t. 9, f. 15 (♀). — Mexiko
bahiana Boh. Mon. III, 1855, p. 313 (genus dubium). — Bahia
balteata Champ. l. c. p. 200, t. 15, f. 3. — Chiriqui
bicolon Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 542 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 105. — Brasilien
bicurvata Boh. l. c. p. 301. — Cayenne

bidivisa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 438. — Brasilien
bisbipustulata Boh. Mon. III, 1855, p. 107. — Bahia
Championi Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 174. — Costa Rica
cingulata Boh. Mon. IV, 1862, p. 414. — Champ. l. c. p. 199, t. 11, f. 1. — Mexiko
concolor Boh. Mon. III, 1855, p. 330. — Para
conflagrata Boh. l. c. p. 294. — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 249. — Cuba
consobrina Boh. l. c. p. 185. — Columbien
conspersa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 96. — „
conspicillata Boh. Mon. III, 1855, p. 276. — Brasilien
constellata Boh. l. c. p. 418. — Bolivien
decussata Boh. l. c. p. 305. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 193. — Mexiko
diophthalma Champ. l. c. p. 202, t. 11, f. 7. — „
distorta Boh. Mon. III, 1855, p. 324. — Champ. l. c. p. 203, t. 11, f. 11. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14. — „
dolosa Boh. Mon. III, 1855, p. 122. — Bolivia, Goyaz, Misiones
elegans Boh. l. c. p. 270. — Brasilien
ephippiata Boh. l. c. p. 214. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 191, t. 10, f. 9, 10. — Zentral-Amerika
excelsa Boh. l. c. p. 271. — Brasilien
exsanguis Boh. l. c. p. 341. — „
fastidiosa Boh. l. c. p. 132. — „
flavovittata Boh. l. c. p. 286. — Minas Geraës
Ganglbaueri Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 390. — Brasilien
glabricula Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 341. — Haiti
inculta Boh. l. c. p. 332. — Brasilien
incurva Boh. l. c. p. 297. — „
irazuensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 201, t. 11, f. 4. — Costa Rica
laeta Boh. l. c. p. 146. — Brasilien
laqueifera Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 96. — Peru
linigera Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 450. — Brasilien
luctifera Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 408. — St. Catharina
lunifera Boh. l. c. p. 235. — Brasilien
mundula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 452. — Ega
nubilosa Boh. Mon. III, 1855, p. 103. — Columbien
opulenta Boh. l. c. p. 191. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 192, t. 10, f. 12. Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 145, t. 2, f. 11—13. — Mexico, Guatemala
orbiculata Champ. l. c. p. 188, t. 10, f. 3. — Panama
patella Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 90. — Peru
placida Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 415. — Cayenne
profana Boh. l. c. p. 219. — Bahia
puella Boh. l. c. p. 181. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 201, t. 11, f. 5. — Mexiko
purpurea L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida)*. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 190 (Übersetz. Goeze 1781, p. 334), t. 15, f. 19 *(Cassida)*. — Thunb. Mus. Ac. Upsal. — Brasilien, Bahia, Para, Cayenne

III, 1787, p. 40; Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 87, t. 5, f. 98 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 381; Ent. VI, 1808, p. 966, t. 6, f. 91 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 266, t. 132, f. 9 *(Cassida)*. — F. Syst. El. 1, 1801, p. 393 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 179. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14 *(Metriona)*.

quadrinotata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 104. — Bahia
repanda Boh. l. c. p. 182. — Peru, Chiquitos
repudiata Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 249. — Cuba
roseocincta Vig. Zool. Journ. II, 1826, p. 241, t. 9, f. 10. — Boh. Mon. III, 1855, p. 106, t. 7, f. E. — Bahia
roseosignata Boh. l. c. p. 276. — Brasilien
rubella Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 449. — Brasilien?
sagana Boh. l. c. p. 446. — Ecuador
semiatrata Boh. l. c. p. 428. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 203, t. 11, f. 8. — Mexiko, Guatemala
sordida Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 326. — Champ. l. c. p. 188, t. 10, f. 4. — Mexico. Guatemala
stigma Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 542 *(Cassida)*. — Boh. Mon. III, 1855, p. 110. — Brasilien: Bahia
succincta Boh. l. c. p. 226. — Brasilien
suturalis Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 175. — Ost-Peru: Iquitos
tricolorata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), p. 192, t. 10, f. 13. — Honduras, Nicaragua
undecim-punctata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 110; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 298; Syst. El. I, 1801, p. 397 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 384; Ent. VI, 1808, p. 944; 97, t. 4, f. 67 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 335 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 108. — Cayenne, S. Paulo
arcuata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 393; Ent. VI, 1808, p. 945; 97, t. 2, f. 26 *(Cassida)*. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 298; Syst. El. I, 1801, p. 398 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 336.
uniformis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 330. — Cayenne
usta Boh. l. c. p. 306. — ,,
vana Boh. l. c. p. 272. — Bahia
ab. *virginalis* Boh. l. c. p. 273.
virguncula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 400. — Brasilien
vittata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 66. — ,,
vittipennis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 282. — Bolivia
Wallengreni Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 410. — Cayenne
Wesmaeli Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 202. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 190, t. 10, f. 6, 7 (var.). — Mexiko, Guatemala
ab. *puerilis* Mon. Cassid. IV, 1862, p. 447. — Champ. l. c. p. 190, t. 10, f. 8.
ab. *scutigerula* Boh. Mon. IV, 1862, p. 424. — Champ. l. c. p. 190.

Psalidonota Boh.

Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 81. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 11.

aerata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 83. — Brasilien, Costa-Rica, Venezuela, Panama

atriceps Boh. l. c. p. 84. — Brasilien

candens Boh. l. c. p. 85. — „

circumspicua Boh. l. c. p. 89. — „

contemta Boh. l. c. p. 82. — Südbrasilien,
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. p. 195, t. 8, f. 21, a, b. — Bolivia, Paraguay,
?*pallida* Ol. Ent. VI, 1808, p. 952; 97, t. 3, f. 43 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 521. — Misiones

dorsoplagiata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 186, t. 10, f. 5 *(Coptocycla)*. — Zentral-Amerika

dorsopunctata Klug, Preisverz. 1829, p. 14 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 87, t. 7, f. B. — Champ. l. c. p. 186 *(Coptocycla)*. — Cuba, Yucatan

leprosa Boh. l. c. p. 86. — Champ. l. c. p. 185, t. 10, f. 1 *(Coptocycla)*. — Zentral-Amerika

marmorata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), p. 187, t. 10, f. 2 *(Coptocycla)*. — Mexiko

obtusa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 88. — Brasilien

rufonotata Champ. l. c. p. 187 *(Coptocycla)*. — Costa Rica

11

Syngambria Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 275.

Andreae Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 381 *(Coptocycla)*. — Brasilien

bisinuata Boh. l. c. p. 382 *(Coptocycla)*. — Paraguay,
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 193, t. 8, f. 20 a—c *(Coptocycla)*. — Chiquitos

2

Nuzonia Spaeth.

Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 5.

cayennensis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 278 *(Coptocycla)*. — Cayenne. Amazonas

gestatrix Boh. l. c. p. 47 *(Charidotis)*. — „

ibaguensis Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 6. — Columbien

isthmica Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 198, t. 10, f. 26 (♀) *(Coptocycla)*. — Nicaragua, Panama

4

Cyclocassis Spaeth.

Spaeth, Archiv f. Naturg. LXXIX, 1913, I, p. 143.

circulata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 211 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 198, t. 10, f. 25 *(Coptocycla)*. — Mexiko, Venezuela, Cayenne

1

Plagiometriona Spaeth.

Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 219.

amplexa Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 365 *(Coptocycla)*.	Peru
bisbimaculata Boh. l. c. p. 373 *(Coptocycla)*.	Columbien
bistriguttata Boh. l. c. p. 372 *(Coptocycla)*.	Venezuela
boliviana Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 13.	Bolivia: Yungas de la Paz
Buqueti Boh. Mon. III, 1855, p. 371 *(Coptocycla)*. — Spaeth, l. c. p. 8.	Columbien
centralis Boh. l. c. p. 364 *(Coptocycla)*.	Brasilien
Clarki Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 458 *(Coptocycla)*.	Ecuador
designata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 361 *(Coptocycla)*.	Brasilien
Deyrollei Boh. l. c. p. 363 *(Coptocycla)*.	St. Catharina
Diana Boh. l. c. p. 366 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 197 *(Coptocycla)*.	Mexiko?
dorsosignata Boh. l. c. p. 378 *(Coptocycla)*.	St. Catharina, Espirito Santo
Eggi Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 220.	Peru
excellens Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 91.	Peru, Bolivia
flavescens Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 380 *(Coptocycla)*.	Brasilien, Paraguay, Misiones
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 184, t. 8, f. 17 a—c.	
gibbifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 197, t. 10, f. 23 (♂) und 24 (var. ♀) *(Coptocycla)*.	Zentral-Amerika
?*foliata* Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 482 *(Coptocycla)*.	
incita Boh. l. c. p. 369 *(Coptocycla)*.	Columbien
inscripta Boh. l. c. p. 368 *(Coptocycla)*.	Brasilien
ludicra Boh. l. c. p. 374 *(Coptocycla)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 175 *(Coptocycla)*.	Südöstliches Brasilien
plagifera Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 67 *(Coptocycla)*.	
ab. ? *clandestina* Boh. l. c. p. 370.	
moesta Boh. l. c. p. 367 *(Coptocycla)*.	Columbien
multisignata Boh. l. c. p. 379 *(Coptocycla)*.	Brasilien
Pehlkei Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 7.	Columbien
pernix Spaeth, l. c. p. 10.	„
Perroudi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 459 *(Coptocycla)*.	„
peruana Spaeth, l. c. p. 8.	Peru
Phoebe Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 367 *(Coptocycla)*.	Peru, Columbien, Brasilien, Cayenne
praecincta Boh. l. c. p. 360, t. 7, f. F *(Coptocycla)*.	Brasilien
rubridorsis Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 14.	Ecuador
Sahlbergi Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 375 *(Coptocycla)*.	Brasilien
scenica Boh. l. c. p. 377 *(Coptocycla)*.	„

sponsa Spaeth, Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 11. — Peru: Rio Mixiollo
ab. *obscurata* Spaeth, l. c. p. 12.
subacuminata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 67 *(Coptocycla)*. — Peru
suspecta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 422 *(Coptocycla)*. — Brasilien
tredecim-guttata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 457 *(Coptocycla)*. — „
vesiculifera Boh. l. c. p. 452 *(Coptocycla)*. — Amazonas
vespertilio Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 100; Stett. Ent. Zeit. LXXIII, 1912, p. 16. — Peru
vigens Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 429 *(Coptocycla)*. — Brasilien

36

Metriona Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 13 (Typus: *elatior* L.).

a) Aus Amerika.

Subgen. **Charidotella** Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 13 (Typus: *zona* F.).

diluta Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 217, t. 12, f. 8 *(Coptocycla)*. — Nicaragua
evanescens Champ. l. c. p. 216, t. 12, f. 5 *(Coptocycla)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 175 *(Charidotella)*. — Peru, Bolivia, Columbien, Costa Rica, Nicaragua
fumosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 156 *(Coptocycla)*. — Cayenne, Brasilien
inconstans Boh. l. c. p. 155 *(Coptocycla)*. — Cayenne, Para, Goyaz
submaculata Boh. l. c. p. 154 *(Coptocycla)*. — Bahia
subramosa Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 95 *(Coptocycla)*. — Peru
zona F. Syst. El. I, 1801, p. 393 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 160 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 202 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 13 *(Charidotella)*. — Südliches Zentralamerika, nördliches Südamerika
annulus Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 381; Ent. VI, 1808, p. 969; 97, t. 1, f. 14 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 272, t. 133, f. 3 c *(Cassida)*. — Ill. Mag. Ins. I, 1802, p. 406 *(Cassida)* (nec F.!).
flavescens Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. II, 1832, p. 35, t. 32, f. 8 *(Cassida)*.
? *livida* Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 261, t. 132, f. 2 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 522 *(Cassida)*.

Subgen. **Metriona** s. str.

1. Aus der Gruppe der **M. herbea** Boh.

ambigena Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 248 *(Coptocycla)*. — Brasilien
amoenula Boh. l. c. p. 199 *(Coptocycla)*. — „

aucta Boh. l. c. p. 193 *(Coptocycla).* — Columbien
Bremei Boh. l. c. p. 243 *(Coptocycla).* — „
coccinelloides Boh. l. c. p. 218 *(Coptocycla).* — Amazonas, Ecuador

congregata Boh. l. c. p. 253 *(Coptocycla).* — Brasilien
constricta Boh. l. c. p. 245 *(Coptocycla).* — „
contexta Boh. l. c. p. 239 *(Coptocycla).* — „
dodonea Boh. l. c. p. 252 *(Coptocycla).* — „
emarcida Boh. l. c. p. 342 *(Coptocycla).* — „
forcipata Boh. l. c. p. 198 *(Coptocycla).* — „
glyphica Boh. l. c. p. 250 *(Coptocycla)* (genus dubium). — Cuba: Havanna

gyrata Boh. l. c. p. 197 *(Coptocycla).* — Brasilien
herbea Boh. l. c. p. 353 *(Coptocycla).* — „
jucunda Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 97 *(Coptocycla).* — Peru: Chanchamayo

liturata Boh. l. c. p. 237 *(Coptocycla).* — Rio Janeiro
stillata Boh. l. c. p. 251 *(Coptocycla).* — „
tenella Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 354 *(Coptocycla).* — Süd-Brasilien, Paraguay, Argentinen, Uruguay
graminis Burm. Stett. Ent. Zeit. XXXI, 1870, p. 281 *(Coptocycla).*
voluptaria Boh. l. c. p. 238 *(Coptocycla).* — Bolivia
Zelleri Boh. l. c. p. 247 *(Coptocycla).* — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 57 *(Coptocycla).* — Columbien

2. Sonstige Arten.

affinis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 96 *(Coptocycla).* — Columbien
annexa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 299 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 214, t. 11, f. 27 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika
bicolor F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 83; Syst. El. I, 1801, p. 396 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 352 *(Cassida).* — Boh. Mon. III, 1855, p. 142 (*aurichalcea* var.) *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2,1885—94 (1894), p. 212 *(Coptocycla).* — Nord- und Zentral-Amerika
aurichalcea F. Syst. El. I. 1801, p. 397 *(Cassida).* — Ol. Ent. VI, 1808, p. 965; 97, t. 5, f. 89 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 142 *(Coptocycla).* — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 78 *(Coptocycla).* — Provanch. Faune Ent. Canada 1877, p. 685 *(Coptocycla).*
bistripunctata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 275, t. 133, f. 6 *(Cassida).*
? *marylandica* Herbst, l. c. p. 274, t. 133, f. 5 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 524 *(Cassida).* — Champ. Biol. Centr.-Am. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 212 *(Coptocycla).*
pallida Herbst, l. c. p. 262, t. 132, f. 3 *(Cassida).* — Boh. Mon. III, 1855, p. 523 *(Cassida).*
ab. *aurisplendens* Mannh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 307 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 349 *(Coptocycla).*
bifasciata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 363; ed. XII, 1767, I, II, p. 576; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1639 — Brasilien, Peru,

(Cassida). — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 189, t. 15, f. 18 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382 *(Cassida).* — F. Syst. El. I, 1801, p. 394 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 148 *(Coptocycla).* — Bolivia

obliterata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 260, t. 132, f. 1 *(Cassida).*

bifossulata Boh. Mon. III, 1855, p. 135 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 210 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika

Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 143, t. 2, f. 1—10 *(Coptocycla).*

ab. *dubitabilis* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 401 *(Coptocycla).*

bisbinotata Boh. Mon. III, 1855, p. 144 *(Coptocycla).* — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 245 *(Coptocycla).* — Cuba

calva Boh. l. c. p. 335 *(Coptocycla).* — Brasilien

carnulenta Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 399 *(Coptocycla).* — Peru, Chiquitos, Neu-Granada

clavata F. Syst. Ent. Suppl. 1798, p. 83; Syst. El. I, 1801, p. 398 *(Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 311, t. 135, f. 7 b *(Cassida).* — Ol. Ent. VI, 1808, p. 963; 97, t. 5, f. 87 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 391 *(Coptocycla).* — Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 79 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 206 *(Coptocycla).* — Südliches Nordamerika, Mexiko

conclusa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 221 *(Coptocycla).* — Brasilien

connectens Boh. l. c. p. 302 *(Coptocycla).* — Rio Grande

crucipennis Boh. l. c. p. 307 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 203, t. 11, f. 9 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika

ab. *Dohrni* Boh. l. c. p. 323 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 203, t. 11, f. 10 *(Coptocycla).*

cyclographa Boh. l. c. p. 184 *(Coptocycla).* — Cayenne

discoidalis Boh. l. c. p. 183 *(Coptocycla).* — Brasilien

duplex Champ. l. c. p. 219, t. 12, f. 11 *(Coptocycla).* — Mexiko, Guatemala

egregia Boh. l. c. p. 400 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 208, t. 11, f. 20 (♀), 21 (var.) *(Coptocycla).* — Mexico, Panama

elatior Klug, Preisv. 1829, p. 8 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 419 *(Coptocycla).* — Chapuis, Gen. Col. XI, 1875, p. 406 *(Chirida).* — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14. — Brasilien, Paraguay, Argentinien

emarginata Boh. Mon. III, 1855, p. 298 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 213, t. 11, f. 26 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika, Arizona

arizonae Crotch, Proc. Ac. Philad. 1873, p. 78 *(Coptocycla).*

erratica Boh. l. c. p. 201. — Champ. l. c. p. 220, t. 12, f. 14 (♂) *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika, Columbien

meticulosa Boh. l. c. p. 351 *(Coptocycla).*

varicornis Boh. l. c. p. 348 *(Coptocycla).*

var. *angularis* Champ. l. c. p. 221, t. 12, f. 15 (♂) *(Coptocycla).*

fallax Boh. l. c. p. 425 *(Coptocycla).* — Brasilien
flavolineata Latr. in Humb. et Bonpl. Obs. Zool. Anat. II, 1833, p. 34, t. 32, f. 7 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 288 *(Coptocycla).* — Columbien
flavorugosa Boh. l. c. p. 296 *(Coptocycla).* — Rio Janeiro
flexuosa Boh. l. c. p. 402 *(Coptocycla).* — Bahia, Venezuela

gibberosa Boh. l. c. p. 355 *(Coptocycla).* — Süd-Brasilien, SaltoGrande

glaucina Boh. l. c. p. 333 *(Coptocycla).* — Portorico
glaucovittata Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 153 *(Coptocycla).* — Peru, Ecuador
globosa Boh. l. c. p. 358 *(Coptocycla).* — Guyana
granaria Boh. l. c. p. 311 *(Coptocycla).* — Amazonas
guadeloupensis Boh. l. c. p. 427 *(Coptocycla).* — Kleine Antillen

Högbergi Boh. l. c. p. 158 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 213, t. 11, f. 25 (♀) *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika
immaculata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 969; 97, t. 6, f. 97 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 344 *(Coptocycla).* — Cayenne, Brasilien
immerita Boh. l. c. p. 346 *(Coptocycla).* — Columbien
incerta Boh. l. c. p. 191 *(Coptocycla).* — Brasilien
incorrupta Boh. l. c. p. 337 *(Coptocycla).* — „
inedita Boh. l. c. p. 356 *(Coptocycla).* — „
invenusta Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 96. — Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 101. — Amazonas
judaica F. Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 295; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida).* — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 381; Ent. VI, 1808, p. 968; 97, t. 6, f. 96 *(judea) (Cassida).* — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 280, t. 133, f. 11 k *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 293 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 209 *(Coptocycla).* — Maulik 1916 P.Z.S. p. [illegible] — Süd-Amerika, Panama
ab. *operosa* (Dej.) Boh. l. c. p. 293 *(Coptocycla).*
lateraria Boh. l. c. p. 310 *(Coptocycla).* — Amazonas
latevittata Boh. l. c. p. 151 *(Coptocycla).* — Haiti, St. Thomas

limpida Boh. l. c. p. 334 *(Coptocycla).* — Brasilien
liquida Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 157 *(Coptocycla).* — Peru
lyra Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 542. — Minas Geraës
maculicollis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 215, t. 12, f. 2 *(Coptocycla).* — Guatemala
marculenta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 336 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 220, t. 12, f. 12 (♀) *(Coptocycla).* — Mexiko
microcera Boh. l. c. p. 268 *(Coptocycla).* — Bahia
myops Boh. l. c. p. 180 *(Coptocycla).* — Guyana, Columbien

nigromaculata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 189 (Übersetz. Goeze 1781, p. 333) t. 15, f. 18 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 149 *(Coptocycla).* — Guyana
nympha Boh. l. c. p. 241 *(Coptocycla).* — Brasilien

obesa Boh. l. c. p. 426 *(Coptocycla).* — Brasilien
oblita Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 247 *(Coptocycla).* — Cuba
paleacea Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 420 *(Coptocycla).* — Espirito Santo
pallescens Boh. l. c. p. 339 *(Coptocycla).* — Rio Janeiro
pectoralis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 210 *(Coptocycla).* — Bolivia
pellucida Boh. l. c. p. 343 *(Coptocycla).* — Brasilien
plagiata Boh. l. c. p. 269 *(Coptocycla).* — Bahia
posticata Boh. l. c. p. 220 *(Coptocycla).* — Brasilien
praeusta Boh. l. c. p. 152 *(Coptocycla).* — Haiti
profligata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 446 *(Coptocycla).* — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 220, t. 12, f. 13 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika
propinqua Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 289 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 209, t. 11, f. 22 *(Coptocycla).* — Columbien, südl. Zentral-Amerika
proxima Boh. l. c. p. 200 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 216, t. 12, f. 4 *(Coptocycla).* — Mexiko, Guatemala
pudica Boh. l. c. p. 328 *(Coptocycla).* — Brasilien, Paraguay
pullula Boh. l. c. p. 359 *(Coptocycla).* — Brasilien (Bahia), Bolivia
punctatissima Boh. l. c. p. 421 *(Coptocycla).* — Brasilien
punctipennis Boh. l. c. p. 358 *(Coptocycla).* — „
purpurata Boh. l. c. p. 300 *(Coptocycla).* — Crotch, Proc. Ac. Sc. Philad. 1873, p. 79 *(Coptocycla).* — Missouri, Colorado, Pennsylvanien
pustulata Boh. l. c. p. 258 *(Coptocycla).* — Cayenne, Para
quadrisignata Boh. l. c. p. 150 *(Coptocycla).* — Suffr. Arch. f. Naturg. XXXIV, 1868, I, p. 246 *(Coptocycla).* — Antillen
ramosa Boh. l. c. p. 393 *(Coptocycla).* — Columbien
resplendens Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 96 *(Coptocycla).* — „
rubicunda Guér. Icon. Règne Anim. Ins. II, 1844, p. 291 *(Aspidomorpha).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 388 *(Coptocycla).* — Bolivia, Brasilien, Paraguay
rubrotestacea Boh. l. c. p. 423 *(Coptocycla).* — Columbien
rutila Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 153 *(Cassida).* — Boh. l. c. p. 387 *(Coptocycla).* — Peru, Bolivia
scapularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 218, t. 12, f. 10 *(Coptocycla).* — Chiriqui
sedula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 442 *(Coptocycla).* — Bolivia
sejuncta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 345 *(Coptocycla).* — Brasilien
separata Boh. l. c. p. 242 *(Coptocycla).* — „
serena Boh. l. c. p. 187 *(Coptocycla).* — Amazonas, Peru
involuta Boh. l. c. p. 188 *(Coptocycla).*
ab. *semiannulata* Boh. l. c. p. 186 *(Coptocycla).*
sexpunctata F. Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 296; Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida).* — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1636 *(Cassida).* — Ol. — Columbien, Venezuela, Brasilien, Paraguay,

Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 961; 97, t. 3, f. 42 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 136 *(Coptocycla)*.	Tucuman, Misiones, Bolivia
bistripustulata Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 256, t. 131, f. 10 *(Cassida)*.	
simplex Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 428 *(Coptocycla)*.	Brasilien
sinuata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 218, t. 12, f. 9 *(Coptocycla)*.	Nicaragua, Costa Rica
striatopunctata Boh. Mon. III, 1855, p. 339 *(Coptocycla)*.	Bahia
stulta Boh. l. c. p. 424 *(Coptocycla)*.	„
subannulata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 404 *(Coptocycla)*.	Bolivia
subirrorata Boh. Mon. III, 1855, p. 259 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 209, t. 11, f. 23 *(Coptocycla)*.	Columbien, Panama, Costa Rica
subnotata Boh. l. c. p. 120 *(Coptocycla)*.	Bolivia
subprasina Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 100.	Peru: Chanchamayo
subsignata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 403 *(Coptocycla)*.	Antillen
subvittata Boh. Mon. III, 1855, p. 287 *(Coptocycla)*.	Bolivia
succinea Boh. l. c. p. 350 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 212 *(Coptocycla)*.	Mexiko, Guatemala
testudinaria Boh. l. c. p. 390 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 206, t. 11, f. 17 (♀) *(Coptocycla)*.	Zentral-Amerika
var. *asperata* Boh. l. c. p. 395 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 207 *(Coptocycla)*.	Mexiko, Guatemala
trisignata Boh. l. c. p. 138 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 210 *(Coptocycla)*.	Zentralamerika,
bistripunctata Boh. l. c. p. 141 (nec Herbst) *(Coptocycla)*.	Columbien, Venezuela,
sexpunctata Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 382; Ent. VI, 1808, p. 961; 97, t. 3, f. 42 *(Cassida)* (nec F.).	Guyana, Brasilien
ab. *biimpressa* Boh. l. c. p. 140 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 210 *(Coptocycla)*.	
ab. *ternata* Boh. l. c. p. 139 *(Coptocycla)*.	
tuberculata F. Syst. Ent. 1775, p. 90; Mant. Ins. I, 1787, p. 64; Ent. Syst. I, 1792, p. 299; Syst. El. I, 1801, p. 399 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1640 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 384 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 338 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 385 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 207, t. 11, f. 18 *(Coptocycla)*.	Zentralamerika, Venezuela
ab. *lobata* Boh. l. c. p. 386 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 207 *(Coptocycla)*.	
ab. *nitida* Boh. l. c. p. 383 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 207 *(Coptocycla)*.	
tumida Champ. l. c. p. 214, t. 12, f. 1 *(Coptocycla)*.	Costa Rica
ventricosa Boh. Mon. III, 1855, p. 394 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 208, t. 11, f. 19 (♂) *(Coptocycla)*.	Zentral-Amerika
vilis Boh. l. c. p. 357 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 215, t. 12, f. 3 (♀) *(Coptocycla)*.	„
vinula Boh. l. c. p. 159 *(Coptocycla)*.	Columbien

virgo Boh. l. c. p. 329 *(Coptocycla).* — Brasilien, Argentinien, Paraguay

virgulata Boh. l. c. p. 327 *(Coptocycla).* — Champ. l. c. p. 217, t. 12, f. 6, 7 *(Coptocycla).* — Zentral-Amerika

---

bisignata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 119 *(Coptocycla).* — Nord-Amerika?

b) Von Neu-Guinea, den Papua-Inseln und Australien.

Albertisi Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 121. — Neu-Guinea: Fly River

astrolabiana Spaeth, l. c. p. 131. — Neu-Guinea: Astrolabe-Bai

biguttata Spaeth, l. c. p. 126. — „

callosipennis Spaeth, l. c. p. 135. — Queensland

var. *dispar* Spaeth, l. c. p. 135. — Thursday-Ins.

compuncta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 290 *(Coptocycla).* — Australien

diomma Boisd. Faune de l'Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 540 *(Cassida).* — Boh. Mon. III, 1855, p. 213 *(Coptocycla).* — Spaeth, l. c. p. 133. — Neu-Guinea

subspec. *strigula* Montr. Ann. Sc. Phys. Lyon (2) VII, I, 1855, p. 67 *(Cassida).* — Boh. Cat. Col. Ins. Brit. Mus. IX, 1856, p. 206 *(Cassida);* Mon. Cassid. IV, 1862, p. 435 *(Coptocycla).* — Spaeth, l. c. p. 133. — Neu-Guinea, Papua-Ins., Queensland

Holmgreni Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 465 *(Coptocycla).* — Spaeth, l. c. p. 122. — Queensland

subspec. *multicolor* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 103 *(Chirida).* — Spaeth, l. c. p. 122. — Queensland, Neu-Guinea

sexguttata var. a Boh. Mon. III, 1855, p. 240 *(Coptocycla).* — Key, Aru

subspec. *tesselata* Spaeth, l. c. p. 123. — Queensland

lacunata Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 105 *(Chirida).* — Nord-Queensland

maxima Blackb. l. c. p. 104 *(Chirida).* — Queensland

papuana Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 130. — Neu-Guinea, Salamons-Ins.

personata Spaeth, l. c. p. 127. — Südliches Neu-Guinea

subsp. *Loriae* Spaeth, l. c. p. 127.

sexguttata Boisd. Faune de l'Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 539 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, p. 240 *(Coptocycla).* — Spaeth, l. c. p. 122. — Neu-Guinea

guttata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 195 *(Coptocycla)* (nec Ol.!)

simplaria Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austral. XX, 1896, p. 106 *(Chirida).* — Queensland

c) Von Asien, Ceylon, den Sunda-Inseln und Philippinen.

amurensis Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 141 *(Coptocycla).* — Ussuri

australica Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 257 *(Coptocycla).*	Sikkim, Darjeeling (nicht Nov. Holl. Swan River!)
avia Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 106.	Ost-Indien: Belgaum
callosa Kirsch, Mitt. Zool. Mus. Dresden I, 1875, p. 56 *(Coptocycla).*	Malakka
catenata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 262 *(Coptocycla).* — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 352 *(Coptocycla).*	Sunda-Ins., Indien
ab. *fulgida* Boh. l. c. p. 347 *(Coptocycla).* — Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 79.	
ceylonica Boh. l. c. p. 267 *(Coptocycla).*	Ceylon
circumdata Herbst, Natursyst. Käfer VIII, 1799, p. 268, t. 132, f. 11 *(Cassida).* — Ol. Ent. VI, 1808, p. 967, t. 6, f. 93 *(Cassida).* — Boisd. Faune de l'Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 536 *(Cassida).* — Boh. Mon. III, 1855, p. 279 *(Coptocycla).* — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 128.— Maulik 1916 [illegible] Z.S. p. [illegible] —	Ostindien, Indochina, Philippinen
Biologie: Kershaw & Muir, Trans. Ent. Soc. Lond. 1907, p. 249 *(Coptocycla).*	
U-fuscum Wiedem. Zool. Magaz. II, 1823, p. 74 *(Cassida).*	
subsp. *trivittata* F. Syst. El. I, 1801, p. 397 *(Cassida).* — Ol. Ent. VI, 1808, p. 973; 97, t. 6, f. 103 *(Cassida).* — Boisd. Faune Ent. de l'Océanie (Astrolabe) II, 1835, p. 544 *(Cassida).* — Blanch. Voy. Pôle Sud (d'Urville) Zool. IV, 1853, p. 323, t. 18, f. 16 *(Cassida).* — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 280 *(Coptocycla).* — Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. I, 1903, p. 128.	Philippinen, Celebes
Biologie: Schultze, Philipp. Journ. Sc. III, 1908, p. 267, t. 5, f. 4—8; t. 6, f. 4.	
ab. *Baeri* Spaeth, l. c. p. 130.	Philippinen
conchyliata Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 564.	Tenasserim, Ober-Assam
Corbetti Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 108.	Burma
desultrix Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 566.	Ostindien, Himalaya
ab. *florea* Spaeth. l. c. p. 566.	Darjeeling
dorsalis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 322 *(Coptocycla).*	Java
effusa Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 320 *(Aspidomorpha)*; IV, 1862, p. 444 *(Coptocycla).*	,,
expromta Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 567.	Annam
expressa Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 230.	Yünnan
Ferrarii Spaeth, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 77.	Java
hilaris Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 411 *(Coptocycla).*	Malakka, Sumatra, Java
javanica Boh. l. c. p. 125 *(Coptocycla).*	Java
imbecilla Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 441 *(Coptocycla).*	Ceylon
manilensis Weise, Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 229.	Philippinen: Manila

obtiva Boh. Mon. IV, 1862, p. 413 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14. — Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 122. — Borneo

pagana Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 312 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 109. — Ostindien, Java

physodes Boh. l. c. p. 266 *(Coptocycla)*. — Sunda-Ins.

plausibilis Boh. Mon. IV, 1862, p. 395 *(Coptocycla)*. — China

purpuricollis Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 229. — Yunnan

purulenta Boh. Mon. IV, 1862, p. 436 *(Coptocycla)*. — Ostindien

quinque-maculata Boh. Mon. Cassid. II, 1854, p. 467 *(Cassida)*. — Philippinen

recondita Boh. Mon. IV, 1862, p. 396 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 121. — Borneo, Java, Sumatra, Ceram

ruralis Boh. l. c. p. 461 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 110 *(Coptocycla)*. — Ostindien, Java

septemdecim-punctata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 117 *(Coptocycla)*. — Ostindien

stellifera Spaeth, Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 121. — Banguey bei Borneo

Thais Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 463 *(Coptocycla)*. — Baly, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 214 *(Coptocycla)*. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 284 *(Coptocycla)*. — Nord-China, Japan

var. *crucifera* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 271 *(Coptocycla)*. — Gorh. l. c. p. 283 *(Coptocycla)*. — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, p. 295 *(Coptocycla)*. — Japan

triangulum Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 106. — Spaeth, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIV, 1900, p. 24; Sarawak Mus. Journ. I, 1912, p. 121. — Sunda-Ins., Süd-Indien, Birma

truncatipennis Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 565. — Burma

varians Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 269, t. 169, f. 12 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 284 *(Coptocycla)*. — Ostindien

versicolor Boh. Mon. III, 1855, p. 414 *(Coptocycla)*. — China (?)

viridinotata Boh. l. c. p. 263 *(Coptocycla)*. — Java

---

vesicularis Thunb. Mus. Ac. Upsala III, 1787, p. 40; Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 88 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 256 *(Coptocycla)*. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 109 *(Coptocycla)*. — Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1885, p. 285 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 109 *(Coptocycla)*. — Japan?

176

Taiwania Spaeth.

Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. XI, 1913, p. 47.

Sauteri Spaeth, Ann. Mus. Nat. Hung. XI, 1913, p. 48. — Formosa

1

Charidotis Boh.

Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 7. — Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 384. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 178. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 12.

abrupta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 11, t. 7, f. B. — Mantis. I. 15 P.Z.S. p. —	Para, Cayenne, Venezuela
admirabilis Boh. l. c. p. 34.	Brasilien
ambigua Boh. l. c. p. 17.	Cayenne, Amazonas
ancilla Boh. l. c. p. 175 *(Coptocycla)*.	Bolivia
annularis Boh. l. c. p. 207 *(Coptocycla)*.	Brasilien
annulifera Boh. l. c. p. 208 *(Coptocycla)*.	Rio Janeiro
atramentosa Boh. l. c. p. 28 *(Coptocycla)*.	Brasilien
aurofasciata Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 224 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 205, t. 11, f. 15 *(Coptocycla)*.	Peru, Brasilien, Cayenne, Panama, Nicaragua
subspec. *Fåhraei* Boh. l. c. p. 229 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 205, t. 11, f. 16 (♀) *(Coptocycla)*.	Zentral-Amerika
auroguttata Boh. l. c. p. 40. — Champ. l. c. p. 179, t. 9, f. 20. Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 183, t. 7, f. 16a.	Bolivia, Paraguay, Brasilien bis Zentral-Amerika
aurulenta F. Syst. El. I, 1801, p. 293 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 9.	Cayenne
bellula Boh. l. c. p. 35.	Brasilien
benedicta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 377.	Bahia
biannulifera Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 204, t. 11, f. 12 *(Coptocycla)*.	Panama
biarcuata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 274 *(Coptocycla)*.	Brasilien
bicincta Boh. l. c. p. 42.	Bahia
bicingulata Boh. l. c. p. 212 *(Coptocycla)*.	Chiquitos
bimarginata Boh. l. c. p. 43.	Brasilien
bipartita Boh. l. c. p. 225 *(Coptocycla)*.	Cayenne, Columbien
Briseis Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 412 *(Coptocycla)* (genus dubium).	Brasilien
centromaculata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 32.	,,
cinctella Boh. l. c. p. 21.	,,
cincticula Boh. l. c. p. 206 *(Coptocycla)* (*cinticula* err. typ.).	Amazonas
circinata Boh. l. c. p. 171 *(Coptocycla)*.	Brasilien
circulifera Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 370.	Ega
circulus Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 168 *(Coptocycla)*.	Brasilien
circumducta Boh. l. c. p. 161 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 205, t. 11, f. 14 *(Coptocycla)*.	Brasilien, Venezuela, Columbien, Panama
circumflexa Boh. l. c. p. 204 *(Coptocycla)*.	Brasilien
circumnotata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 407 *(Coptocycla)*.	Ega
circumscripta Boh. l. c. p. 24.	Rio Janeiro
circumtexta Boh. l. c. p. 375 *(Coptocycla)*.	Amazonas: St. Paul

clitelligera Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 215 *(Coptocycla)*.	Brasilien
clypeolata Boh. l. c. p. 26.	Brasilien,
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 179.	Paraguay
coadunata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 371.	Cayenne
coccinea Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 19.	Cayenne, Columbien
cognata Boh. l. c. p. 20.	Cayenne
concentrica Boh. l. c. p. 205 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14.	Brasilien
connexa Boh. l. c. p. 173 *(Coptocycla)*.	Bahia, Para
consentanea Boh. l. c. p. 172 *(Coptocycla)*.	Brasilien, Parana, Columbien
consimilis Boh. l. c. p. 209 *(Coptocycla)*.	Cayenne, Brasilien
crenata Boh. l. c. p. 352 *(Coptocycla)*.	Brasilien
curtula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 376. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 182, t. 9, f. 26.	Mexiko
cyclops F. Syst. El. I, 1801, p. 394 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 170 *(Coptocycla)*.	Cayenne, Brasilien
Dahlbomi Boh. l. c. p. 13.	Brasilien
discicollis Boh. l. c. p. 46.	Venezuela, Columbien
divisa Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 176.	Peru
Drakei Weise, l. c. p. 177.	Paraguay
erythraea Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 372.	Ega
erythrostigma Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 180, t. 9, f. 23.	Mexiko
exigua Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 44.	Columbien, Brasilien
exquisita Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 408 *(Coptocycla)*.	Brasilien
fenestralis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 33.	,,
flavicans Boh. l. c. p. 48.	,,
flavomarginata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 180, t. 9, f. 21.	Guatemala
formosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 231 *(Coptocycla)*.	Brasilien
frontalis Champ. l. c. p. 181, t. 9, f. 24.	Yucatan
furunculus Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 216 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitsehr. 1896, p. 14.	Brasilien
furva Boh. l. c. p. 29. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 54.	Brasilien, Cayenne, Venezuela
gemellata Boh. l. c. p. 31.	Brasilien
gibbipennis Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 167.	Paraguay
Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 180, t. 7, f. 13.	
glomerosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 52.	Para
herbida Boh. l. c. p. 51.	Brasilien: Salto-Grande
Heydeni Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 57 *(Coptocycla)*.	Columbien
vicina Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 219.	

incincta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 422 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 204, t. 11, f. 13 *(Coptocycla)*.	Ega, Panama
Jousselini Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 227 *(Coptocycla)*.	Columbien
Iris Perty, Delect. Anim. Bras. 1834, p. 102, t. 20, f. 12 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 416 *(Coptocycla)*.	Brasilien
Leprieuri Boh. l. c. p. 223 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 206 *(Coptocycla)*.	Bolivia, Peru, Ecuador, Guyana, Venezuela, Honduras
luculenta Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 379.	Cayenne
luteola Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 12.	Columbien
mamillata Boh. l. c. p. 246 *(Coptocycla)*.	Brasilien
mansueta Boh. l. c. p. 174 *(Coptocycla)*. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 14. Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 182.	Brasilien, Paraguay
marcidula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 406 *(Coptocycla)*.	Brasilien
marginalis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 25.	,,
marginella F. Syst. Ent. 1775, p. 89; Spec. Ins. I, 1781, p. 108; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 294; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1637 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 380 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 330 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 50.	Brasilien, Paraguay, nördliches Argentinien
miniata Boh. l. c. p. 8.	Brasilien
miniatula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 368.	Brasilien: Goyaz
Mniszechi Boh. l. c. p. 369 *(Mniszeki)*.	Cayenne
neglecta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 165 *(Coptocycla)*.	Brasilien, Montevideo
nigrocincta Boh. l. c. p. 41.	Brasilien
nucleata Boh. l. c. p. 18.	,,
ocularis Boh. l. c. p. 30. Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 203, t. 9, f. 28, a, b.	Brasilien, Paraguay
oculata Boh. l. c. p. 166 *(Coptocycla)*.	Brasilien
orbifera Boh. l. c. p. 14.	Amazonas
plicatula Boh. l. c. p. 39.	Brasilien
porosula Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 88.	Peru, Bolivia
praeclara Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 168.	Goyaz, Parana
procincta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 162 *(Coptocycla)*.	St. Catharina, Parana
pulchra Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 87.	Peru: Marcapata
pumicosa Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 374.	Brasilien
punctatostriata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 49. Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 185, t. 8, f. 18 und 18, f—i.	Brasilien, Paraguay
pupillata Boh. l. c. p. 203 *(Coptocycla)*.	Brasilien

pustulata Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 179, t. 9, f. 19. — Britisch Honduras, Guatemala

pygmaea Klug, Preisverz. 1829, p. 8 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 54. — Brasilien, Parana

quadrimaculata Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 94. — Peru, Oberer Amazonenstrom

quadrioculata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 244 *(Coptocycla)*. — Bolivia

redimita Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 177. — „

reticulata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 95. — Columbien

rotundata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 53. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 182. — Brasilien, Mexico

rubrocincta Boh. l. c. p. 23. — Brasilien

rubrodiscoidalis Boh. l. c. p. 176 *(Coptocycla)*. — Bolivia

rubropicta Boh. l. c. p. 275 *(Coptocycla)*. — Bahia

rubrovittata Boh. l. c. p. 283 *(Coptocycla)*. — Süd-Brasil., Argentinien

sandaricina Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 381. — Brasilien

sanguinolenta Swed. Act. Holm. 1787, p. 193 *(Cassida)*. — L. Syst. Nat. ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1644 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 394 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 474. — Columbien, Brasilien

scabriuscula Boh. l. c. p. 38. — Columbien

semifasciata Boh. l. c. p. 228 *(Coptocycla)*. — „

seminulum Boh. l. c. p. 27. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 181, t. 9, f. 25. — Zentral-Amerika

sexpustulata Donck. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, C. R. p. 154. — Bahia

Signoreti Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 210 *(Coptocycla)*. — Rio Janeiro

soror Boh. l. c. p. 15. — Brasilien, Paraguay

speculum Boh. l. c. p. 165 *(Coptocycla)*. — Bahia

fulviventris Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 103; LIX, 1909, p. 396.

spreta Boh. l. c. p. 22. — Brasilien

Steinheili Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 55. — Columbien: Ocaña

subplagiata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 147 *(Coptocycla)*. — Brasilien

subrugosa Boh. l. c. p. 331 *(Coptocycla)*. — „

surda Boh. l. c. p. 167 *(Coptocycla)*. — Bahia

tantilla Boh. l. c. p. 45. — „ Espirito Santo

tessellata Boh. l. c. p. 37. — Brasilien

tricolor Boh. l. c. p. 10 (Guér. Mag. Zool. 1831, t. 31). — Cayenne

virgata Boh. l. c. p. 232 *(Coptocycla)*. — Cassapava

vitreata Perty, Delect. Anim. 1830—34, p. 103, t. 20, f. 13 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 401 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 198 *(Coptocycla)*. — Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador, Columbien,

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 204 (Nr. 7673). — Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 166. Nicaragua, Costa Rica

Herminae Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 298; XLIX, 1899, t. 5, f. 1; LI, 1901, p. 348.

yucatanensis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 181, t. 9. f. 22. Nord-Yucatan

---

supposita L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, I, II, p. 578; ed. XIII, Gmel. 1787, I, IV, p. 1642 *(Cassida)*. — Ledermüller, Microsc. t. 28, fig. F, G u. T. 44, fig. b, c, d *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 391 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 521 *(Cassida)*. Süd-Amerika

122

Cteisella Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 15 (Typus: *virescens* Boh.).

Bestimmungstabelle: Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 68 *(Ctenochira)*.

amicta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 456 *(Coptocycla)*. Cayenne

blandidica Boh. l. c. p. 460 *(Coptocycla)*. Bolivia, Paraguay

confusa Boh. l. c. p. 509 *(Coptocycla)*. Süd-Brasilien

crispata Boh. l. c. p. 222 *(Coptocycla)*. Goyaz, Rio Gr. do Sul

cynarae Boh. l. c. p. 431 *(Coptocycla)*. Montevideo, Paraguay

egens Spaeth, Ent. Mitt. III, 1914, p. 166. Paraguay

Biologie: Fiebrig, Zool. Jahrb. 1910, Suppl. 12, p. 180, t. 7, f. 13.

flavocincta Boh. Mon. III, p. 452 *(Coptocycla)*. Brasilien

glareosa Boh. l. c. p. 430 *(Coptocycla)*. „

guttigera Boh. l. c. p. 459 *(Coptocycla)*. „

imitatrix Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 348. Peru, Bolivia

indecorata Boh. Mon. III, 1855, p. 462 *(Coptocycla)*. Rio Janeiro

magica Boh. l. c. p. 438 *(Coptocycla)*. Brasilien

nigroannulata Boh. l. c. p. 440 *(Coptocycla)*. „

quinque-lineata Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 470 *(Coptocycla)*. „

quinque-vittata Boh. l. c. p. 469 *(Coptocycla)*. „

roseopicta Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 233 *(Coptocycla)*. „

rotalis Boh. l. c. p. 439 *(Coptocycla)*. „

rubrolineata Boh. l. c. p. 436 *(Coptocycla)*. „

rustica Boh. l. c. p. 435 *(Coptocycla)*. „

signatifera Boh. l. c. p. 454 *(Coptocycla)*. „

subtincta Boh. l. c. p. 432 *(Coptocycla)*. Minas Geraës

virescens Boh. l. c. p. 461 *(Coptocycla)*. Brasilien

vitellina Boh. l. c. p. 433 *(Coptocycla)*. „

vittigera Boh. l. c. p. 434 *(Coptocycla)*. „

zonata Boh. l. c. p. 441 *(Coptocycla)*. „

25

Ctenochira Chap.

Chap. Gen. Col. XI, 1875, p. 409. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 222. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 15 (Typus: *aciculata* Boh.).

Bestimmungstabelle: Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 68.

aberrata Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 176.	Costa Rica
aciculata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 465 *(Coptocycla)*.	Mittleres Süd-Amerika
anxia Boh. l. c. p. 477 *(Coptocycla)*.	Brasilien
aprica Boh. l. c. p. 514 *(Coptocycla)*.	Cayenne
aspersa Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 232, t. 13, f. 21 (♂).	Costa Rica, Columbien
bifenestrata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 480 *(Coptocycla)*. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 55.	Venezuela bis Nicaragua
bipellucida Boh. l. c. p. 481 *(Coptocycla)*.	Cayenne, Peru
Bonvouloiri Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 417 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Am. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 201, t. 11, f. 6 *(Coptocycla)*.	Mexiko, Guatemala, Nieder-Californien
centropunctata Boh. Cassid. III, 1855, p. 444 *(Coptocycla)*.	Columbien
circinaria Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 447 *(Coptocycla)*.	Peru, Bolivia
circumcincta Boh. l. c. p. 449 *(Coptocycla)*.	Brasilien
conscripta Boh. l. c. p. 499 *(Coptocycla)*.	Cayenne
coronata Boh. l. c. p. 515 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 229, t. 13, f. 13, 14.	Mexiko, Guatemala
costaricensis Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 393.	Costa Rica
crux-flava Champ. l. c. p. 232, t. 13, f. 20 (♂).	Panama
cumulata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 408 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 231, t. 13, f. 17 (♀).	Zentral-Amerika, Venezuela
derosa Boh. l. c. p. 479 *(Coptocycla)*.	Brasilien
difficilis Boh. l. c. p. 466 *(Coptocycla)*.	„
diffinis Boh. l. c. p. 448 *(Coptocycla)*.	Cayenne, Columbien
dissimilis Boh. l. c. p. 488 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 226, t. 12, f. 25.	Mexiko
dissoluta Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 349.	Peru, Bolivia
divulsa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 490 *(Coptocycla)*.	Cayenne
dolorosa Boh. l. c. p. 489 *(Coptocycla)*.	Brasilien
Fairmairei Boh. l. c. p. 453 *(Coptocycla)*. — Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 349. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 231, t. 13, f. 19.	Peru, Bolivia Panama?
flavonotata Boh. l. c. p. 457 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 231, t. 13, f. 18 (♀).	Nicaragua, Costa Rica Panama, Columbien, Surinam?

fraterna Boh. l. c. p. 473 *(Coptocycla)*. — Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 55. — Champ. l. c. p. 233, t. 12, f. 19, 20. Venezuela, Columbien, Costa Rica, Panama, Nicaragua
ab. *modesta* (Dej.) Boh. l. c. p. 474 *(Coptocycla)*.

Freyi Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 483 *(Coptocycla)*. Amazonas
gagatina Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 94. Peru: Marcapata

gemina Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 455 *(Coptocycla)*. Para — Mauhk 1913 P.Z.S. p.5 —
guttula Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 395. Peru: Rio Mixiollo

hebraea F. Spec. Ins. I, 1781, p. 109; Mant. Ins. I, 1787, p. 63; Ent. Syst. I, 1792, p. 295; Syst. El. I, 1801, p. 392 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 381; Ent. VI, 1808, p. 968; 97, t. 6, f. 95 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 273, t. 133, f. 4 *(Cassida)*. — Boh. Mon. III, 1855, p. 504 *(Coptocycla)*. Cayenne

hectica Boh. l. c. p. 471 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 223, t. 12, f. 18 (♂). Zentral-Amerika
hieroglyphica Boh. l. c. p. 503 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 230, t. 13, f. 16. „

hypocrita Boh. l. c. p. 483 *(Coptocycla)*. Brasilien
impura Boh. l. c. p. 460 *(Coptocycla)*. „
infantula Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 477 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 225, t. 12, f. 23. Mexico bis Costa Rica
uniramosa Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 66.
var. *salebrata* Boh. Mon. IV, 1862, p. 478 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 225, t. 12, f. 24.

ingenua Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 464 *(Coptocycla)*. Brasilien
intermedia Boh. l. c. p. 502 *(Coptocycla)*. Cayenne
Lindigi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 96 *(Coptocycla)*. Bogotà

lugubris Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 504 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—1894 (1894), p. 224, t. 12, f. 21. Columbia, Panama
lugubrina Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 478 *(Coptocycla)*.

maculosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 472 *(Coptocycla)*. Süd-Brasilien
marginata Spaeth, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIX, 1909, p. 392. Peru, Bolivia

media Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 450 *(Coptocycla)*. Bahia
melanota Boh. l. c. p. 451 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 227, t. 13, f. 5 (♀). Zentral-Amerika

morio F. Syst. El. I, 1801, p. 393 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 496 *(Coptocycla)*. Südamerika
mystica Boh. l. c. p. 446 *(Coptocycla)*. Cayenne
napaea Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 411 *(Coptocycla)*. Brasilien: Petropolis

nobilitata Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 437 *(Coptocycla)*. Brasilien
optata Boh. l. c. p. 470 *(Coptocycla)*. „

palmata Boh. l. c. p. 487 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 225, t. 13, f. 1. — Mexico, Guatemala

var. *bilobata* Boh. l. c. p. 486 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 225, t. 13, f. 2.

papulosa Boh. l. c. p. 500 *(Coptocycla)*. — Surinam

patruelis Boh. l. c. p. 467 *(Coptocycla)*. — Brasilien

peltata Boh. l. c. p. 492 *(Coptocycla)*. — Peru

peruviana Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 96. — „

plebeia Boh. l. c. p. 516 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 229, t. 13, f. 12. — Mexico, Nicaragua

plecta Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 505 *(Coptocycla)*. — Peru

Mus. H. 1916 P.Z.S. p. † –

plicata Boh. l. c. p. 493 *(Coptocycla)*. — Provancher, Faune Ent. Canada 1877, p. 686. — Champ. l. c. p. 227, t. 13, f. 6 (♀). — Zentral-Amerika (nicht Nord-Amerika!), Mexico

var.? *flavoscutellata* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 65. — Champ. l. c. p. 227. — Mexico

var. *sagulata* Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 481 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 227, t. 13, f. 7 (♂). — Weise, Arch. f. Naturg. LXX, 1904, I, p. 175. — Nicaragua, Costa-Rica

porosa Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 442 *(Coptocycla)*. — Brasilien, Columbien

punicea Boh. l. c. p. 494 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 229, t. 13, f. 11 (♀). — Zentral-Amerika

quadrata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 188 (Übers. Goeze 1781, p. 333) *(Cassida)*. — F. Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida)*. — Ol. Enc. méth. V, 1790, p. 393 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 512 *(Coptocycla)*. — Brasilien, Paraguay

respersa Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 209. — Ecuador

retexta Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 294 *(Coptocycla)*. — Surinam

reticulata F. Syst. El. I, 1801, p. 395 *(Cassida)*. — Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 507 *(Coptocycla)* (nec De Geer!).

reticulata De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 188 (Übers. Goeze, p. 333), t. 15, f. 17 *(Cassida)*. — Thbg. Nov. Ins. Spec. V, 1789, p. 87, t. 5, f. 97 *(Cassida)*. — Herbst, Natursyst. Käf. VIII, 1799, p. 265, t. 132, f. 8 *(Cassida)*. — Cayenne

retifera Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 506 *(Coptocycla)*.

rubrocincta Boh. l. c. p. 498 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 226, t. 13, f. 3. — Zentral-Amerika, Venezuela, Brasilien?

var. *carnifex* Boh. l. c. p. 497 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 226, t. 13, f. 4.

scabra Boh. l. c. p. 495 *(Coptocycla)*. — Brasilien

sellata Boh. l. c. p. 178 *(Coptocycla)*. — St. Paulo

semilobata Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 56. — Columbien

semilunaris Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 475 *(Coptocycla)*. — Brasilien?

sepulchralis Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 491 *(Coptocycla)*. — Columbien

sertata Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 154 *(Cassida)*. — Boh. l. c. p. 510 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 229. — Peru, Bolivia, Columbia

servula Boh. l. c. p. 445 *(Coptocycla)*. — Bolivia

severa Boh. l. c. p. 485 *(Coptocycla)*. — Bahia

signaticollis Boh. l. c. p. 475 *(Coptocycla)*. — Venezuela

similata Boh. l. c. p. 177 *(Coptocycla)*. — Brasilien

Ståli Boh. Mon. Cassid. IV, 1862, p. 480 *(Coptocycla)*. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 224, t. 12, f. 22 (♀). — Mexico, Nicaragua

punicea var. a Boh. l. c. p. 482 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 224.

semilobata (ex p.) Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 55. — Champ. l. c. p. 224.

stigmatica Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 476 *(Coptocycla)*. — Bahia, Parana

trepida Boh. l. c. p. 518 *(Coptocycla)*. — Brasilien

tristicula Spaeth, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 92. — Peru: Marcapata

ab. *subvittata* Spaeth, l. c. p. 92.

varians Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 56. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 2, 1885—94 (1894), p. 229 (= *sertata* Er. ? !). — Columbien

villica Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 217 *(Coptocycla)*. — Brasilien

vivida Boh. l. c. p. 517 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 228, t. 13, f. 8. — Mexiko

var. *nigrocincta* Wgenr. Mitt. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 55. — Champ. l. c. p. 228, t. 13, f. 9. — Columbien

var. *tabida* Boh. l. c. p. 511 *(Coptocycla)*. — Champ. l. c. p. 228, t. 13, f. 10. — Zentral-Amerika

Wageneri Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 209. — Ecuador

Waterhousei Boh. Mon. Cassid. III, 1855, p. 230 *(Coptocycla)*. — Bahia

83

2349

Index.

Genera, Subgenera.

Agenysa Spaeth 32
Agroiconota Spaeth 121
Amythra Spaeth 48
Anacassis Spaeth 50
Androya Spaeth 20
Anepsiomorpha Spaeth 48
Asphalesia Wse. 82
Aspidomorpha Hope 67
Asteriza Boh. 122

Baranosa Wse. 30
Basipta Boh. 85
Batonota Hope 65
Bia Wse. 26
Bruchia Spaeth 29

Calaspidea Hope 30
Calliaspis Boh. 14
Calopepla Hope 17
Calyptocephala Boh. 16
Canistra Er. 29
Canistra Er. 29
Canistrella Spaeth 29
Carlobruchia Spaeth 29
Cassida L. 92
Cassida (pal.) 99
Cassidopsis Fairm. 20
Cassidula Wse. 97
Championaspis Spaeth 45
Charidotella Wse. 136
Charidotis Boh. 145
Chelymorpha Boh. 57
Chelysida Fairm. 86
Chersinella Champ. 123
Chirida Chap. 123
Chiridula Wse. 88
Cistudinella Champ. 64
Conchyloctenia Spaeth 79
Coptocycla Boh. 130
Crambelea Spaeth 122
Crepidaspis Spaeth 129
Crossocassis Spaeth 86
Cteisella Wse. 149
Ctenochira Chap. 150
Cyanaspis Wse. 14
Cyclocassis Spaeth 134
Cyphomorpha Hope 57, 60
Delocrania Guér. 5
Deloyala Redt. 95
Desmonota Hope 23
Desmonota Hope 23
Dolichotoma Hope 25

Echoma Spaeth 53
Elpinora Spaeth 129
Elytrogona Boh. 51
Emperochela Spaeth 13
Enagria Spaeth 61
Epistietia Boh. 19
Eremionycha Spaeth 67
Eurypepla Boh. 61
Eutheria Spaeth 50
Exestastica Spaeth 64

Glima Spaeth 25
Glyphocassis Spaeth 89
Goniochenia Wse. 29
Goniochenia Wse. 29
Gratiana Spaeth 121

Hemisphaerota Spaeth 11
Herissa Spaeth 30
Herminella Spaeth 11
Hilarocassis Spaeth 49
Himatidium F. 13
Hoplionota Hope 5
Hybosa Boh. 122
Hybosinota Spaeth 81
Hypocassida Wse. 90

Imatidium F. 13.
Ionthonota Spaeth 120
Iphinoë Spaeth 79

Ischyronota Wse. 87
Ischyrosonyx Boh. 65

Laccoptera Boh. 82
Laccoptera Boh. 82
Lorentzia Spaeth 128
Lorentzocassis Spaeth 128

Macromonycha Spaeth 88
Megapyga Boh. 19
Melichrocassis Spaeth 129
Meroscalsis Spaeth 128
Mesomphalia Hope 32
Metriona Wse. 136
Metriona Wse. 136
Metriopepla Fairm. 19
Miltinaspis Wse. 16
Miocalaspis Wse. 31
Mionycha Wse. 95
Muzonia Spaeth 24

Nabathaea Spaeth 86
Nebraspis Spaeth 48
Nebroma Spaeth 22
Neomphalia Spaeth 43
Neomphalia Spaeth 43
Nuzonia Spaeth 134

Odontionycha Wse. 93
Ogdoecosta Spaeth 57
Oma Spaeth 22
Omaspides Boh. 55
Omocera Chap. 21
Omoplata Hope 54
Oocassida Wse. 88
Orectis Spaeth 122
Orexita Spaeth 63
Orphnoda Wse. 84
Orphnodella Spaeth 84
Oxylepis Desbr. 86
Oxynodera Hope 26

Paraselenis Spaeth 52
Parataurοma Spaeth 22
Parechoma Spaeth 53
Paromaspides Spaeth 55
Parorectis Spaeth 122
Patrisma Fairm. 81
Patrisma Fairm. 81
Philaspis Spaeth 123
Physonota Boh. 62
Phytodectoidea Spaeth 56
Pilemostoma Desbr. 89
Pilidionota Spaeth 23
Plagiometriona Spaeth 135
Platyauchenia Sturm 4
Platycycla Boh. 61
Platytauroma Spaeth 22
Poecilaspidella Spaeth 48
Poecilaspis Hope 45
Poecilaspis Hope 46
Polychalca Wse. 24
Porphyraspis Hope 12
Porphyraspis Spaeth 11
Prenea Spaeth 25
Prioptera Hope 17
Psalidoma Spaeth 85
Psalidonota Boh. 134
Psecadia Wse. 129
Psecas Wse. 129
Pseudechoma Spaeth 52
Pseudocassida Desbr. 105
Pseudomesomphalia Spaeth 33

Rhacocassis Spaeth 129
Rhinocassis Spaeth 16
Rhoia Spaeth 122

Saulaspis Spaeth 121
Scaeocassis Spaeth 121
Selenis Hope 51
Semaia Spaeth 32
Silana Spaeth 85
Sindia Wse. 81
Sindiola Spaeth 81
Smodingonota Spaeth 28
Spaethia Berg 78
Sphaeropalpus Guér. 4
Sphenocassis Spaeth 85
Spilophora Boh. 15
Stenoprioptera Spaeth 17
Stilpnaspis Wse. 15
Stoiba Spaeth 51
Syngambria Spaeth 134

Taiwania Spaeth 144
Tauroma Hope 20
Tauroma Hope 21
Tauroma Chap. 22
Terpsis Spaeth 48
Thlaspida Wse. 127
Thlaspidomorpha Spaeth 128
Thlaspidosoma Spaeth 128
Thlaspidula Spaeth 128
Torbinia Spaeth 85
Trichaspis Spaeth 86
Trilaccodea Spaeth 45

Vulpia Spaeth 28

Xenicomorpha Spaeth 45

Zatrephina Spaeth 49
Zeugonota Spaeth 24

Species, Varietates.

abbreviata Baly 55
aberrata Weise 150
abrupta Boh. 145
abyssinica Boh. 84
acanthina Spaeth 5
aciculata Boh. 150
aculeata Boh. 65
acuminata Boh. 33
acuta Boh. 33
acutangula Weise (Chirida) 124
acutangula Spaeth (Hybosa) 122
acuticollis Spaeth 5
adamantina Germ. 131
Adelaidae Blackb. 115
adhaerens Web. 70
adiuncta Weise 79
admirabilis Boh. 145
adnata Boh. 57
adspersa F. (Conchyl.) 79
adspersa Boh. (Neomph.) 43
adspersula Boh. 57
advena Boh. 57
aegrota Boh. 46
aemula Spaeth (Hopl.) 5
aemula Boh. (Saulasp.) 121
aenea Germ. (Dolichot.) 25
aenea Ol. (Pseudomes.) 33
aeneocincta Spaeth 65
aeneomaculata Boh. 58
aeneovittata Champ. 33
aequatoriensis Spaeth 16
aequinoctialis Ol. 126
aerata Boh. 134
aerea Boh. 23
aeruginosa Boh. 21
aethiopica Boh. 118
affinis F. (Cassida) 106
affinis Kirsch (Metriona) 137
Afzelii Boh. 77
agilis Spaeth 115
Alberti Spaeth 8
Albertisi Spaeth 142
albida Germ. (Hilaroc.) 49
albida Spaeth (Paraselen.) 52
albicolle Ol. 14
albiventris Heyd. (Cassida) 96
albiventris Boh. (Omoplata) 55
albofasciculata Boh. 32
alcyonea Spaeth 33
algirica Luc. 100
Alluaudi Spaeth 5
alpina Bremi 109
alta Wgenr. 33
alternans Boh. 57
alurna Westw. 31
alutacea Boh. 62
amabilis Boh. 68
ambigena Boh. 136
ambigua Boh. 145
ambita Champ. 131
ambrica Spaeth 5
amicta Boh. 149
ammon Boh. 21
amoena Boh. 131
amoenula Boh. 136
amorifica Boh. 131
amplexa Er. 135
ampliata Boh. 32
amplicollis Spaeth 53
amplissima Boh. 69
ampulla Ol. 51
amurensis Kraatz 142
anaglypta Boh. 54
anatolica Weise 88
anceps Boh. 33
anchoralis Boh. 22
ancilla Boh. 145
ancorifera Boh. 118
andaica Spaeth 11
andamanica Dohrn 125
andicola Kirsch (Calaspidea) 30
andicola Spaeth (Calliaspis) 15
andicola Spaeth (Omaspides) 55
Andreae Boh. 134
Andrewesi Spaeth (Aspid.) 68
Andrewesi Weise (Calop.) 17
Andrewesi Weise (Cassida) 113
Andrewesi Weise (Hopl.) 9
Andrewesi Weise (Priopt.) 17
anglica Curtis 93
angolensis Weise 72
angularis Champ. 138
angulata Weise (Patrisma) 81
angulata Germ. (Poecil.) 46
angulicollis Spaeth 19
angulifera Blanch. (Aspid.) 71
angulifera Spaeth (Enagria) 61
angusta Mars. (Cassida) 98
angusta Spaeth (Prioptera) 17
angustata L. 52
angusticollis Hagenb. (Cassida) 113
angusticollis Suffr. (Stoiba) 51
angustifrons Weise 100
annexa Boh. 137
annularis Boh. 145
annulata F. (Pseudomes.) 41
annulata Spaeth (Spiloph.) 15
annulifera Boh. 145
annulosa Wgenr. 33
annulus F. (Coptoc.) 131
annulus Ol. (Metriona) 136
anomala Boh. 25
antiqua Klug (Nebroma) 22
antiqua Sahlb. (Pseudomes.) 33

anthracina Boh. 46
anxia Boh. 150
apiata Boh. 64
apicalis Klug (Aspid.) 72
apicalis Gebl. (Macrom.) 88
apiculata Boh. 65
appropinquans Spaeth 9
aprica Boh. 150
arabica Spaeth 86
araxicola Rtt. 87
arcuata Swed. (Coptoc.) 131
arcuata Ol. (Coptoc.) 133
areata Klug (Aspid.) 73
areata Er. (Chelym.) 57
areolata Germ. 33
argillacea Weise 73
argus Licht. 58
Ariadne Weise 126
aridella Weise 118
arietina Boh. 21
arizonae Crotch 138
armigera Ol. (Hopl.) 5
armigera Boh. (Taur.) 21
artemisiae Bris. 101
aruensis Weise 129
arula Boh. 33
aruwimiensis Gorh. 73
asema Boh. 33
aspectabilis Spaeth 113
asperata Boh. 141
aspersa Champ. 150
assimilis Boh. (Aspid.) 68
assimilis Boh. (Neomph.) 43
assimilis Spaeth (Taur.) 22
astrolabiana Blanch. (Aspid.) 71
astrolabiana Spaeth (Metr.) 142
atalanta Boh. 131
aterrima Hbst. 25
atomaria Boh. (Anac.) 50
atomaria Boh. (Chelym.) 57
atra Schwaegr. (Cassida) 107
atra Weise (Laccopt.) 84
atramentosa Boh. 145
atrata F. (Cassida) 100
atrata Gerh. (Cassida) 102
atrata Spaeth (Laccopt.) 83
atriceps Boh. 134
atricornis Spaeth 17
atripennis Fairm. 80
atripes Lec. 120
atroannulus Champ. 131
atrodorsalis Spaeth 102
atrofasciata Boh. 49
atroguttata Boh. 50
atrorubra Guér. 49
attenuata Boh. 62
Aubei Boh. 126
aucta Boh. 137
augur Boh. 33
augusta Boh. 55
aulica Boh. 53
aurata Montr. 72
aureicornis Blanch. 21
aureomarginata Boh. 37
aurichalcea F. 137
auricoma Boh. 131
aurifera Boh. 131
aurisplendens Mannh. 137
aurita Boh. 65
aurofasciata Er. 145
auroguttata Boh. 145
aurolimbata Boh. 24
auropustulata Fairm. 130
aurora Weise (Cassida) 100
aurora Spaeth (Hopl.) 5
aurosa Fairm. 83
aurosetosa Spaeth 33
aurulenta F. 145
australasiae Boisd. 70
australica Boh. 143
austriaca F. 99
avia Weise 143
axillaris Sahlb. 52
azteca Champ. 131
azurea Wgenr. (Taur.) 21
azurea Suffr. (Cassida) 96
azurea F. (Cassida) 95
azureicornis Chevr. 21

bacca Boh. 51
Bacchus Baly 30
Badeni Spaeth (Aspid.) 72
Badeni Wgenr. (Aspid.) 71
badia Boh. 8
Baeri Spaeth (Metriona) 143
Baeri Spaeth (Omoplata) 54
bahiana Boh. 131
baiula Boh. 69
ballista Boh. 66
balteata Champ. 131
Balyi Spaeth (Hopl.) 6
Balyi Kirsch (Pseudomes.) 34
Balyi Boh. (Thlaspidom.) 128
Bang-Haasi Spaeth (Gonioch.) 30
Bang-Haasi Spaeth (Himat.) 13
Bang-Haasi Spaeth (Neomph.) 43
basalis Weise (Laccopt.) 83
basalis Germ. (Parasel.) 52
basilica Boh. 55
basimargo Rtt. 87
basipennis Fairm. 20
Batesi Boh. 26
bathyscioides Spaeth 5
Baumanni Spaeth 126
beatula Boh. 34
bella Feld. 99
Belli Weise 113

bellicosa Boh. 65
bellula Boh. 145
benedicta Boh. 145
Bennigseni Weise 79
Bernhaueri Spaeth 26
berolinensi Suffr. (Cassida) 100
berolinensis Rtt. (Cassida) 101
Bertolonii Spaeth 74
Besckei Boh. 13
biaculeata Boh. 5
biannularis Boh. 57
biannulifera Champ. 145
biarcuata Boh. 145
bicallosa Spaeth 115
bicincta Boh. 145
bicingulata Boh. 145
bicolon Germ. 131
bicolor Boh. (Calliasp.) 15
bicolor F. (Metriona) 137
bicolorata Boh. 34
bicornis L. 21
bicornuta Boh. 24
bicostata Fisch. (Cassida) 104
bicostata Boh. (Physon.) 63
bicruciata Boh. 46
bicuspidata Spaeth 5
bidens F. 65
bidivisa Boh. 132
bifasciata L. 137
bifenestra Boh. 63
bifenestrata Boh. (Ctenoch.) 150
bifenestrata Boh. (Pseudomes.) 34
bifenestrella Boh. 9
bifossulata Boh. 138
biguttata F. (Aspid.) 73
biguttata Spaeth (Metriona) 142
biguttulata Kraatz 108
bihamata Boh. 26
biimpressa Boh. 141
bilineata Boh. 34
bilobata Boh. (Aspid.) 68
bilobata Boh. (Ctenoch.) 152
bimacula Hbst. 17
bimaculata F. (Aspidom.) 74
bimaculata Thunb. (Priopt.) 17
bimaculata De Geer (Pseudomes.) 38
bimarginata Boh. 145
binotata F. (Chelym.) 61
binotata Boh. (Priopt.) 17
binotata Boh. (Oxyn.) 26
bioculata Wgenr. (Aspid.) 75
bioculata Wgenr. (Hopl.) 9
bioculata Boh. (Omasp.) 55
bioculata Boh. (Pseudomes.) 34
bipartita Boh. 145
bipellucida Boh. 150
biplagiata Champ. (Baton.) 65
biplagiata Guér. (Oxyn.) 26
biplagosa Spaeth (Miocalasp.) 31
biplagosa Boh. (Omopl.) 54
bipunctata Wgenr. (Anac.) 50
bipunctata L. (Chirida) 125
bipunctata Kirsch (Cistud) 64
bipunctata Spaeth (Hopl.) 9
bipuncticollis Boh (Conchyl.) 79
bipuncticollis Boh. (Priopt.) 17
bipunctipennis Boh. 125
bipustulata Hbst. (Agenysa) 32
bipustulata L. (Pseudomes.) 36
biradiata Boh. 68
biramosa Wgenr. (Hopl.) 9
biramosa Boh. (Thlaspida) 127
biramosa Kraatz (Thlaspida) 127
biramosa Weise (Thlaspida) 127
biremis Boh. 68
birmanica Spaeth (Aspid.) 68
birmanica Spaeth (Hopl.) 9
Birói Spaeth 11
bisbimaculata Boh. 135
bisbinotata Boh. 138
bisbiplagiata Boh. 26
bisbipustulata Boh. 132
bisinuata Boh. 134
biskrensis Desbr. 89
bispinosa Boh. (Hopl.) 5
bispinosa Boh. (Polych.) 24
bistigma Boh. (Hypoc.) 90
bistigma Boh. (Neomph.) 43
bistriata Boh. 55
bistriguttata Boh. 135
bistrilineata Boh. 121
bistrimaculata Boh. 125
bistrinotata Boh. 125
bistripunctata Herbst (Metriona) 137
bistripunctata Boh. (Metriona) 141
bistripustulata Herbst 141
bisignata Boh. (Metriona) 142
bisignata Boh. (Priopt.) 17
bitorosa Weise 29
bituberculata F. (Chelym.) 61
bituberculata Boh. (Gonioch.) 30
bivittata Say (Cassida) 120
bivittata Baly (Omaspid.) 55
bivittipennis Boh. 66
bivulnerata Spaeth (Chelym.) 57
bivulnerata Boh. (Philasp.) 123
bicurvata Boh. 131
Blackburni Spaeth 129
Blanchardi Boh. 63
blanda Boh. (Pseudomes.) 40
blanda Boh. (Pseudomes.) 33
blandidica Boh. 149
blandifica Boh. 34
blattoides Spaeth 63
Boggianii Spaeth 46
Bohemani Baly (Calaspid.) 30
Bohemani Baly (Calliasp.) 15
Bohemani Ch. Bris. (Cassida) 103

Bohemani Spaeth (Chirida) 124
Bohemani Guér. (Dolichot.) 25
Bohemani Weise (Hopl.) 6
Bohemani Weise (Laccopt.) 82
Bohemani Baly (Spiloph.) 15
Bohemani Wgenr. (Taur.) 21
Bohemaniana Stål 17
Boisduvali Boh. 128
boliviana Boh. (Chelym.) 58
boliviana Spaeth (Plagiom.) 135
boliviana Spaeth (Pseudomes.) 34
boliviana Boh. (Taur.) 21
bonariensis Boh. 46
Bonfilsi Boh. 54
Bonnyana Gorh. 79
Bonvouloiri Boh. 150
borneensis Spaeth 68
Bowringi Boh. 125
brachiata F. 34
Braueri Spaeth 9
Breiti Spaeth 26
Bremei Boh. 137
brevicollis Spaeth (Hopl.) 5
brevicollis Boh. (Pseudomes.) 34
brevicornis Spaeth (Calliasp.) 15
brevicornis Boh. (Calyptoc.) 16
brevilineata Boh. 61
brevis Weise (Cassida) 100
brevis Spaeth (Megapyga) 19
breviuscula Fairm. (Cassida) 115
breviuscula Weise (Chirida) 126
breviuscula Boh. (Physon.) 62
Briseis Boh. 145
Brisouti Reitt. 87
Brookei Spaeth 9
Bruchi Spaeth (Anac.) 50
Bruchi Spaeth (Poecil.) 48
brunnea Wgenr. (Anac.) 50
brunnea F. (Chelym.) 59
brunneosignata Boh. 55
Brunni Spaeth 34
brunnidorsis Spaeth 53
bucharica Spaeth 89
Buckleyi Baly 30
Bugnioni Spaeth 8
bulla Boh. 51
bullata Boh. 58
Buqueti Boh. 135
burorum Spaeth 85

caedemadens Licht. 32
calamitosa Boh. 29
calcarata Boh. (Physon.) 62
calcarata Boh. (Physon.) 62
calligera Boh. 68
callizona Spaeth 34
callosa Kirsch (Metriona) 143
callosa Boh. (Orectis) 122
callosipennis Spaeth 142
calva Boh. (Chelym.) 58
calva Boh. (Metriona) 138
calvaria Weise 118
calvata Boh. 43
camerunensis Spaeth 131
canaliculata Laich. 99
cancellata Boh. (Laccopt.) 84
cancellata Boh. (Poecil.) 46
candens Spaeth (Aspidom.) 74
candens Boh. (Psalidon.) 134
candida Boh. 50
capense Herbst 13
capitata Spaeth 5
capra Spaeth 5
caprigena Spaeth 21
capucina Desbr. 86
carbonaria Klug 28
cardui De Geer (Cassida) 94
cardui De Geer (Cassida) 109
cariosa Boh. 23
carnifex Boh. 152
carnulenta Er. 138
cassandra Spaeth 34
cassidata Herbst 120
cassidea F. 58
cassidoides Guér. 16
casta Boh. 22
castanea Spaeth 9
castaneidorsis Spaeth 74
castaneipennis Spaeth 68
castigata Boh. 34
castula Boh. 78
catenata Boh. 143
catenulata Boh. 57
catharinensis Boh. 59
caucana Spaeth 62
caudata Boh. (Neomphal.) 43
caudata Boh. (Physon.) 62
cavata Boh. 58
cayennensis Fisch. (Cassida) 120
cayennensis Boh. (Nuzon.) 134
celebensis Blanch. 69
centinodia Spaeth 9
centralis Boh. 135
centromaculata Boh. 145
centropunctata Boh. 150
cepaecolor Fairm. 79
cerata Desbr. 100
cerea Boh. 62
ceylonica Boh. (Metriona) 143
ceylonica Weise (Oocassida) 88
chalcoptera Boh. 36
chalybaea Germ. 34
chalybaeum Boh. 13
Championi Weise (Coptoc.) 132
Championi Spaeth (Tauroma) 21
Chapuisi Spaeth (Cassida) 118
Chapuisi Spaeth (Hopl.) 9

Chapuisi Wgenr. (Pseudomes.) 34
chelidonaria Demay 43
Chevrolati Boh. 40
chinensis Boh. (Laccopt.) 85
chinensis F. (Priopt.) 17
chlorina Boh. (Aspid.) 74
chlorina Weise (Psecadia) 129
chloris Hope (Dolichot.) 25
chloris Suffr. (Cassida) 108
chlorosoma Boh. 26
chlorotica Ol. 74
choana Fairm. 119
cicatricosa Boh. (Laccopt.) 85
cicatricosa Chap. (Laccopt.) 85
cincta F. (Aspidom.) 74
cincta De Geer (Chelym.) 59
cincta Kirsch (Chelym.) 59
cincta Guér. (Platyauch.) 4
cinctella Boh. 145
cincticula Boh. 145
cinctidorsum Weise 116
cinctum Guér. 13
cinctipennis Boh. 58
cingulata Boh. (Chelym.) 58
cingulata Boh. (Coptoc.) 132
cinnabarina Boh. 15
cinticula Boh. 145
Circe Weise 126
circinaria Er. 150
circinata Boh. 145
circularis Ol. 131
circulata Boh. 134
circulifera Boh. 145
circulus Boh. 145
circumcincta Boh. 150
circumdata Boh. (Hemisph.) 12
circumdata Wgenr. (Hopl.) 10
circumdata Herbst (Metriona) 143
circumducta Boh. 145
circumflexa Boh. 145
circumminiata Spaeth 6
circumnotata Boh. 145
circumpunctata Klug 58
circumscripta Boh. 145
circumsepta Spaeth 115
circumspicua Boh. 134
circumtexta Boh. 145
citrina Boh. 62
citrinella Boh. 62
clandestina Boh. 135
Clarki Boh. 135
clathrata Spaeth (Chelym.) 58
clathrata L. (Omaspid.) 55
clathrata Spaeth (Pseudomes.) 34
clathrata F. (Sindia) 81
clavata F. 138
Clavareaui Spaeth (Conchyloct.) 80
Clavareaui Spaeth (Hopl.) 10
Clavareaui Spaeth (Rhoia) 122
Clavareaui Spaeth (Tauroma) 21
clitelligera Boh. 146
clivosa Boh. 58
clura Spaeth 10
clypeata Boh. (Dolichot.) 25
clypeata Gemm. u. Har. (Omoplata) 54
clypeolata Boh. 146
coadunata Boh. 146
coalita Boh. 34
coagulata Boh. 117
cobaltina Boh. 58
coccinatum Boh. 13
coccinea Boh. (Charidot.) 146
coccinea Boh. (Hemisphaer.) 12
coccinelloides Boh. 137
coeca Boh. 58
coeruleata Boh. 26
coeruleipennis Spaeth 26
coeruleomaculata Boh. 19
coeruleonotata Boh. 34
coeruleopunctata Boh. 22
coerulescens Boh. 34
cognata Boh. 146
collare Herbst 13
collaris Baly (Baton.) 66
collaris Weise (Epistictia) 19
collata Boh. 53
colliculus Boh. 27
collina Boisd. 71
collocata Wgenr. 30
collucens Spaeth 115
coloraria Boh. 118
colossa Boh. 30
columbiana Boh. 31
columbica Weise 15
comata Boh. 58
combusta Boh. 121
commutabilis Boh. 58
comparata Ryb. 98
complanata Boh. 63
comptum Perty 13
compuncta Boh. 142
compulsa Spaeth 32
concallescens Spaeth 115
concha Solsky 96
conchyliata Spaeth 143
concentrica Boh. 146
concinna Weise (Aspid.) 73
concinna Steph. (Cassida) 93
concinna Boh. (Poecil.) 46
conclusa Boh. 138
concolor Boh. 132
conducta Boh. 90
confinis Klug 73
conflagrata Boh. 132
conformis Boh. 121
confragosa Weise 82
confusa Boh. (Cteisella) 149

confusa Boh. (Pseudomes.) 34
congener Boh. 30
conglomerata Boh. 43
congoana Spaeth 126
congregata Boh. 137
conicicollis Weise 87
coniugata Boh. 56
coniuncta Boh. 46
connectens Baly (Agenysa) 32
connectens Boh. (Metriona) 138
connexa Weise (Cassida) 117
connexa Boh. (Charidot.) 146
consanguinea Kirsch 35
conscripta Boh. 150
consentanea Boh. 146
consimilis Boh. (Cassida) 118
consimilis Boh. (Charid.) 146
consobrina Spaeth (Cassida) 115
consobrina Boh. (Coptoc.) 132
consobrina Boh. (Pseudomes.) 35
consociata Baly (Cassida) 103
consociata Baly (Pseudomes.) 35
conspersa Kirsch (Coptoc.) 132
conspersa Weise (Miocalasp.) 31
conspersa Germ. (Pseudomes.) 35
conspersipennis Boh. 27
conspicillata Boh. 132
conspurcata Boh. 113
constellata Klug (Chelym.) 58
constellata Boh. (Coptoc.) 132
constricta Boh. 137
contacta Baly 31
contaminata Boh. 29
contemta Spaeth (Echoma) 53
contemta Boh. (Psalidon.) 134
contexta Boh. 137
contracta Spaeth 130
contubernalis Boh. 35
convexa Boh. 118
convexicollis Spaeth 56
convexior Spaeth 64
convexula Boh. 118
conviva Spaeth 48
convolvuli Boh. 70
Coquereli Boh. 115
coracina Boh. 22
corallina Boh. 101
Corbetti Weise 143
cordata Wgenr. 35
cordigera Spaeth 74
cordula Boh. 93
cori Fairm. (Cassida) 100
cori Desbr. (Cassida) 94
corii Fairm. 100
cornea Mars. 91
corneola Spaeth 10
cornigera Boh. 66
cornuta Boh. 22
coronata Boh. 150
coronula Boh. 73
corpulenta Weise 118
corrosa Desbr. 103
corrugata Sahlb. 83
corruptiva Spaeth 35
corruptrix Spaeth 113
corticina Boh. 48
cossyphoides Guér. 5
costaricensis Spaeth (Ctenochira) 150
costaricensis Champ. (Pseudomes.) 35
costata Boh. 92
costipennis Boh. 12
costulata Spaeth 9
Cowani Spaeth 6
crassicornis Spaeth (Agenysa) 32
crassicornis Spaeth (Hemisph.) 12
creberrima Boh. 21
crenata Boh. 146
crenulata Boh. 23
cribellata Dohrn 60
cribraria F. (Chelym.) 58
cribraria Herbst (Chelym.) 60
cribraria Ol. (Chelym.) 58
cribrata Weise 24
cribripennis Boh. 24
cribrosa Boh. 127
cribrum Klug 50
crispata Boh. 149
croceovittata Spaeth 35
cruciata L. (Chirida) 123
cruciata F. (Chirida) 124
crucifera Boh. (Chelym.) 58
crucifera Kraatz (Metriona) 144
crucipennis Boh. 138
cruda Spaeth 43
cruenta F. 88
cruentata Kirsch (Canistra) 29
cruentata Ol. (Cassida) 120
cruentata Marsh. (Cassida) 110
cruentata Er. (Pseudomes.) 35
crux F. 123
crux flava Champ. 150
crux nigra Boh. 57
Csikii Spaeth 11
cucullata Boh. 35
Cumingi Boh. 62
cumulata Boh. 150
cuneata Spaeth 8
cuprea F. (Pseudomes.) 36
cuprea Wgenr. (Pseudomes.) 43
cuprea Wgenr. (Tauroma) 21
cupreata Spaeth 34
currax Spaeth 115
curtula Boh. 146
cyanea L. (Neomph.) 43
cyanea Say (Porphyr.) 13
cyanea De Geer (Agenysa) 32
cyanipenne Boh. 13
cyclica Boh. 12

cyclographa Boh. 138
cyclops F. 146
cynarae Boh. 149
cynthia Boh. 122
cyrtodes Boh. 62

Dahlbomi Boh. 146
daurica Boh. 101
decem-guttata Sturm 35
decem-maculata Boh. 18
decem-notata Boh. (Poecil.) 46
decem-notata Boh. (Priopt.) 19
decem-punctata Boh. 131
decem-pustulata Boh. (Poec) 46
decem-pustulata Boh. (Priopt) 18
decem-signata Boh. 18
decem-stillata Boh. (Ogdoec.) 57
decem-stillata Boh. (Priopt.) 18
decem-verrucata Boh. 46
decipiens Spaeth (Cassida) 116
decipiens Boh. (Echoma) 53
decolor Weise 30
decolorata Boh. 73
decora Perty 23
Decorsei Spaeth 6
decussata F. (Calasp.) 31
decussata Boh. (Coptoc.) 132
decussata Herbst (Pseudomes.) 35
deficiens Weise 19
deflexa Wgenr. 120
deflexicollis Boh. 86
deflorata Suffr. 101
degenerata Weise 79
Dejeani Boh. 66
delecta Boh. 35
delectabilis Boh. 90
delenifica Boh. 118
Delesserti Boh. 113
deleta Weise (Cassida) 117
deleta Boh. (Pseudomes.) 35
delicata Boh. 31
delicatula Weise 90
deliciosa Baly 43
delitescens Weise 74
deltoides Weise 101
demissa Boh. 35
denticollis Suffr. 101
denticulata Boh. (Cassida) 115
denticulata Boh. (Oma) 22
dentipennis 23
denudata Boh. 32
depicta Boh. 118
depilata Boh. 27
deplanata Boh. (Anepsiom.) 48
deplanata Spaeth (Cassida) 116
deplorabunda Boh. 35
depressa Suffr. 103
deremensis Weise 83
derosa Boh. 150
deruta Boh. 61
deserticola Reitt. 87
desertorum Gebl. (Ischyron.) 87
desertorum Dohrn (Ischyron.) 87
designata Boh. 135
Desmaresti Boh. 32
desultrix Spaeth 143
deusta F. 70
Deyrollei Boh. (Plagiom.) 135
Deyrollei Baly (Platyauch.) 4
diabolica Spaeth (Aspidom.) 72
diabolica Kraatz (Cassida) 107
diana Boh. 135
diaphana Sahlb. 74
dichroa Germ. 53
didyma Ol. 35
difficilis Boh. 150
diffinis Boh. 150
difformis Motsch. (Aspid.) 67
difformis Boh. (Gonioch.) 29
dignitosa Boh. 46
dilatata Kirsch (Physon.) 62
dilatata F. (Pseudomes.) 35
dilecta Boh. 75
diluta Champ. 136
dimidiata Boh. 43
diomma Boisd. 142
diophthalma Champ. 132
discedens Dohrn 49
discicollis Boh. 146
discipennis Boh. 65
discoidalis Reitt. (Macromon.) 88
discoidalis Boh. (Metriona) 138
discoidea Champ. (Calyptoc.) 16
discoidea Weise (Cassida) 113
discoidea F. (Pseudomes.) 35
discoidea Ol. (Pseudomes.) 36
discoides L. 35
discoideum Boh. 14
discolor Boh. 130
disconotata Boh. 58
discophora Boh. 15
discors Spaeth (Aspid.) 76
discors Ol. (Agenysa) 32
discors F. (Pseudomes.) 36
discreta Boh. 82
disiuncta Chevr. 62
dispar Herbst (Cassida) 120
dispar Spaeth (Metriona) 142
dispilota Boh. 75
dissecta Boh. 44
dissentanea Boh. 75
dissimilis Boh. 150
dissoluta Spaeth 150
distans Spaeth 84
disticha Spaeth 7·
disticta Boh. 98
distigma Boh. 27

distincta Baly (Baton.) 66
distincta Desbr. (Cassida) 98
distincta Boh. (Omopl.) 54
distincta Baly (Oxynod.) 27
distinguenda Boh. 58
distorta Boh. 132
divalis Boh. 31
diversa Boh. 36
divisa Boisd. (Aspid.) 72
divisa Weise (Charidot.) 146
divulsa Boh. 150
dodonea Boh. 137
Dohrni Spaeth (Canistra) 29
Dohrni Boh. (Metriona) 138
Dohrni Spaeth (Thlaspidos.) 128
Dohertyi Spaeth (Hopl.) 10
Dohertyi Spaeth (Merosc.) 128
Dollmanni Donisth. 98
dolorosa Boh. 150
dolosa Boh. 132
Donckieri Spaeth 6
dorsalis Desbr. (Cassida) 102
dorsalis Weise (Cassida) 105
dorsalis Herbst (Cassida) 113
dorsalis Waterh. (Hopl.) 11
dorsalis Boh. (Metriona) 143
dorsata F. (Aspid.) 68
dorsata Ol. (Aspid.) 68
dorsata Duviv. 113
dorsonotata Boh. 113
dorsomicans Fairm. 115
dorsoplagiata Champ. 134
dorsosignata Boh. 135
dorsopunctata Klug 134
dorsovittata Boh. 118
dorsuosa Boh. 28
Douei Boh. 70
Drakei Weise (Charidot.) 146
Drakei Kolbe (Oma) 23
Drewseni Boh. 120
dromedarius Boh. 27
dubia Boh. 50
dubitabilis Boh. 138
ducalis Boh. (Oxyn.) 27
ducalis Boh. (Poecilasp.) 46
dulcicula Boh. 68
dulcis Boh. 115
duodecim-maculata Boh. 47
duodecim-notata Boh. 46
duodecim-pustulata Ol. 36
duodecim-signata Boh. 56
duodecim-verrucata Boh. 46
duplex Champ. 138
duplicata Boh. 48
Duponti Boh. 23
duricoria Boh. 36
Duvivieri Spaeth (Aspid.) 73
Duvivieri Spaeth (Hopl.) 10
echinata F. 6
ectypa Boh. 90
effusa Boh. 143
egena Boh. 68
egens Spaeth 149
Eggi Spaeth 135
egregia Boh. 138
elatior Klug 138
elegans Boh. (Coptoc.) 132
elegans Boh. (Pseudomes.) 41
elegantula Spaeth 68
elevata Blanch. (Aspidom.) 68
elevata F. (Aspidom.) 69
elevata Rtt. (Ischyronot.) 87
Elisabethae Spaeth 8
ellipsis Le C. 120
ellipsodes Mars. 103
elliptica Gorh. 67
ellipticollis Spaeth 113
elocata Boh. 30
elongata Weise 107
eluta Boh. 118
emarcida Boh. 137
emarginata Boh. 138
emorsitans Baly 36
encausta Boh. 46
enervis Boh. 113
ensifera Boh. 66
ephippiata Boh. 132
ephippium Licht. 43
epilachnoides Champ. 57
epipleuralis Weise 91
equestris F. 94
eremita Boh. 66
Erhardti Boh. 12
Erichsoni Boh. (Poecil.) 46
Erichsoni Weise (Pseudomes.) 36
erratica Boh. 138
Ertli Spaeth 75
erudita Baly 109
erythraea Boh. 146
erythrocata Boh. (Hopl.) 6
erythrocata Weise (Hopl.) 7
erythrocera Germ. 13
erythrostigma Champ. 146
eucalypta Boh. 62
eugenea Boh. 36
evanescens Champ. 136
evanida Boh. 49
exaltata F. 66
exarata Boh. 50
exasperans Spaeth 7
excavata Boh. 84
excellens Spaeth 135
excelsa Boh. (Coptoc.) 132
excelsa Desbr. (Oxylep.) 86
excisa Boh. 45
exclamationis L. 49
exigua Boh. 146

exilis Boh. 113
eximia Boh. (Megapyga) 19
eximia Boh. (Tauroma) 21
expressa Spaeth 143
expromta Spaeth 143
exquisita Boh. 146
exsanguis Fairm. (Cassida) 115
exsanguis Gerst. (Conchyl.) 80
exsanguis Boh. (Coptoc.) 132
exsculpta Charp. 102
extensa Boh. 124
externeguttata Fairm. 80
extricata Boh. 36

Fabricii Weise 6
Fåhraei Boh. 145
Fairmairei Spaeth (Coptoc.) 130
Fairmairei Boh. (Ctenoch.) 150
Fairmairei Spaeth (Hopl.) 6
falcifera Boh. 36
fallaciosa Fairm. (Cassida) 115
fallaciosa Spaeth (Thlaspidos.) 128
fallax Spaeth (Himatid.) 14
fallax Weise (Laccopt.) 82
fallax Boh. (Metriona) 139
fallax Suffr. (Porphyr.) 13
famelica Spaeth 6
farinosa Boh. 85
fasciata Wgenr. (Baton.) 66
fasciata Boh. (Laccopt.) 82
fasciata Boh. (Ogdoec.) 57
fasciatum F. 13
fasciculata Boh. 37
fasciculosa Spaeth 37
fastidiosa Boh. 132
fastidita Boh. 46
fastuosa Schall. (Pilemost.) 89
fastuosa Boh. (Pseudomes.) 39
fausta Boh. 126
Feae Spaeth 113
fenestralis Boh. 146
fenestrata Ol. (Aspid.) 75
fenestrata Bertol. (Aspid.) 74
fenestrata Wgenr. (Pseudomes.) 37
Ferranti Spaeth 115
Ferrarii Spaeth 143
ferruginea Goeze (Cassida) 102
ferruginea Marsh. (Cassida) 102
ferruginea Spaeth (Hopl.) 11
ferruginea F. (Hypocass.) 91
ferruginea Linell (Laccopt.) 84
festiva Klug 37
fibrata Spaeth 79
Fiebrigi Spaeth 50
figurata Weise 18
filaginis Perris 111
filia Spaeth 53
filiola Spaeth 8
fimbrialis Suffr. 58
fimbriata Spaeth 128
finitima Boh. 46
firma Weise 75
flava De Geer (Aspidom.) 70
flava L. (Echoma) 53
flavago Boh. 62
flavata Boh. 53
flavens Spaeth 75
flaveola Weise (Aspidom.) 69
flaveola Thunb. (Cassida) 102
flaveola Boh. (Physon.) 63
flavescens Weise (Hypocass.) 90
flavescens Latr. (Metriona) 136
flavescens Boh. (Plagiometr.) 135
flavicans Boh. 146
flaviceps Mars. 95
flavicollis Klug 51
flavicornis Ol. (Aster.) 122
flavicornis Spaeth (Hopl.) 10
flavipennis Spaeth (Chirida) 126
flavipennis Boh. (Pseudomes.) 37
flaviventris Kraatz 103
flavocincta Boh. 149
flavodorsata Wgenr. 71
flavofasciata Spaeth 56
flavofenestrata Boh. 37
flavoguttata Spaeth (Cassida) 113
flavoguttata Boh. (Pseudomes.) 37
flavolineata Latr. 139
flavomaculata Champ. (Ogdoec.) 57
flavomaculata F. (Pseudomes.) 37
flavomarginata Champ. 146
flavonotata Boh. (Ctenoch.) 150
flavonotata Boh. (Pseudomes.) 37
flavoplagiata Baly 139
flavoreticulata Boh. 37
flavorugosa Boh. 139
flavoscutata Spaeth 113
flavoscutellata Wgenr. 152
flavosignata Boh. 49
flavosparsa Boh. 30
flavovariegata Spaeth 72
flavovirens Desbr. 110
flavovittata Boh. 132
flexuosa Champ. (Hemisphaer.) 12
flexuosa Boh. (Metriona) 139
floccosa Er. 37
florea Spaeth 143
flyensis Spaeth 70
foliata Boh. 135
forcipata Boh. 137
formosa Broun (Canistra) 29
formosa Boh. (Charid.) 146
Formosae Spaeth 127
formosum Spaeth 14
fornicata Dalm. (Elytrogon.) 51
fornicata Boh. (Hybosa) 122
fossulata Boh. (Cassida) 118

fossulata Boh. (Pseudomes.) 37
fovangula Rtt. 88
foveicolle Boh. 14
foveolata Champ. (Cistud.) 64
foveolata Boh. (Laccopt.) 82
fragilis Weise 75
fraterna Baly (Aspidom.) 70
fraterna Boh. (Ctenoch.) 151
fraudulenta Spaeth 107
frenata Boh. 74
Freyi Boh. 151
frontalis Boh. (Cassida) 115
frontalis Champ. (Charidot.) 146
Fruhstorferi Spaeth (Echoma) 53
Fruhstorferi Spaeth (Laccopt.) 82
fugax Spaeth 116
fulgida Boh. 143
fuliginosa Weise (Cassida) 109
fuliginosa Boh. (Chirida) 124
fuliginosa Ol. (Chirida) 124
fulviventris Spaeth 148
fulvum Boh. 14
fumida Spaeth (Cassida) 113
fumida Spaeth (Hopl.) 10
fumosa Boh. 136
funebris Fairm. (Cassida) 115
funebris Boh. (Pseudomes.) 37
funeraria Boh. 15
funerea Boh. 77
funesta Boh. 66
furcata Thunb. 68
furunculus Boh. 146
furva Boh. 146
fusca Laich. 92
fuscata Klug 50
fuscicollis Weise 102
fuscicornis Weise 18
fusconotata Boh. 68
fuscopunctata Boh. Aspid.) 68
fuscopunctata Gorh. (Aspid.) 74
fuscopunctata Weise (Priopt.) 18
fuscorufa Motsch. 103
fuscosignata Boh. 118
fuscosparsa Boh. 113
fuscovittata Boh. 120

gagatina Spaeth 151
Gahani Spaeth 6
galamensis Boh. 75
galbanata Boh. 122
gallarum Spaeth 117
Ganglbaueri Spaeth (Aspidom.) 79
Ganglbaueri Spaeth (Coptoc.) 132
Ganglbaueri Spaeth (Oxyn.) 27
gemella Spaeth 113
gemellata Boh. 146
gemina Boh. 151
gemmata Klug 6
generosa Boh. 53
geniculata Boh. 58
gentilis Er. 31
Germari Spaeth 25
gestatrix Boh. 134
Gerstäckeri Boh. 16
Gestroi Spaeth 11
gibba F. 60
gibbera Boh. (Hybosa) 123
gibbera Boh. (Nebroma) 22
gibberosa Boh. 139
gibbifera Champ. 135
gibbipennis Spaeth (Charidot.) 146
gibbipennis Boh. (Hypocass.) 90
gibbosa Gestro (Hypocass.) 90
gibbosa F. (Mesomph.) 32
gibbosa Baly (Priopt.) 18
gibbosula Spaeth (Aspidom.) 72
gibbosula Kraatz (Cassida) 100
gibbula Boh. 87
gigantea Boh. 62
gilva Weise 113
glabella Boh. 113
glabrata Boh. 69
glabricollis Boh. 37
glabricula Boh. 132
gladiator Boh. 66
glarcosa Boh. 149
glaucina Boh. 139
glaucovittata Er. 139
globosa Boh. 139
glomerosa Boh. 146
gloriosa Baly 25
glyphica Boh. 137
Godeti Boh. 37
Godmani Baly 66
Goudoti Boh. (Coptoc.) 130
Goudoti Weise (Hopl.) 6
Goetzeni Kaeseb. 78
Gorhami Spaeth (Chirida) 127
Gorhami Weise (Conchyl.) 79
Goryi Boh. 44
graeca Kraatz 109
graminea Klug 121
graminis Suffr. (Cassida) 100
graminis Burm. (Metriona) 137
grammica Boh. 131
granaria Boh. 139
granula Boh. 118
granulicollis Spaeth 118
graphica Germ. 121
gravida Boh. 23
Grayi Boh. 27
gregaria Boh. (Baton.) 66
gregaria Weise (Chirida) 125
gressoria Boh. 58
graphiptera Boh. 49
grossa L. 31
guadeloupensis Boh. 139

Gundlachi Boh. 13
Guerini Boisd. (Aspid.) 70
Guerini Weise (Hopl.) 6
guttata Boh. (Chirida) 124
guttata Champ. (Metriona) 142
guttifera Boh. 57
guttigera Boh. 149
guttipennis Boh. 118
guttula Boh. (Chelym.) 59
guttula Spaeth (Ctenoch.) 151
guyanensis Boh. 32
gyrata Boh. 137

hablitziae Motsch. 95
haemaptera Spaeth 47
haemaspis Ill. 46
haematidea Boh. 53
haematina Boh. 50
haematites Licht. 37
haematodes Perty 46
haematura Boh. 59
Häfligeri Spaeth 75
hamata Boh. 124
hamulata Boh. 124
Harnoncourti Spaeth 117
Haroldi Wgenr. 37
Hauseri Weise 112
hebe Spaeth 6
hebes Weise (Cassida) 118
hebes Boh. (Conchyl.) 80
hebraea F. 151
hectica Boh. 151
helianthi Randall 63
helva Spaeth 96
hemisphaerica Herbst 93
hemispila Boh. 55
herbea Luc. (Cassida) 101
herbea Boh. (Metriona) 137
herbida Boh. 146
Hermanni Spaeth 37
Herminae Spaeth 149
heroina Boh. 70
heteropunctata Boh. 123
hexaspilota Baly 68
hexastigma Suffr. 103
Heydeni Spaeth (Cassida) 94
Heydeni Wgenr. (Charidot.) 146
hieroglyphica Boh. (Ctenoch.) 151
hieroglyphica Herbst (Pseudomes.) 41
hilaris Boh. 143
Hildebrandti Weise 6
hirsuta Spaeth 27
hirsutula Spaeth 118
hispoides Spaeth 6
histrio Boh. 48
Hoepfneri Boh. 59
Högbergi Boh. 139
Holdhausi Spaeth 27
Holmgreni Boh. 142
Holubi Spaeth (Hopl.) 8
Holubi Spaeth (Psalidoma) 85
honesta Spaeth (Aspidom.) 75
honesta Boh. (Chelym.) 59
honorata Baly 37
honorifica Boh. 37
Hopei Spaeth 113
horrida Boh. 6
horrifica Boh. (Hopl.) 10
horrifica Boh. (Hopl.) 10
Horni Weise (Cassida) 114
Horni Spaeth (Hopl.) 10
Horsfieldi Boh. 128
hospes Dohrn 80
hospita Boh. 82
hottentotta Boh. 119
hova Weise (Coptoc.) 130
hova Spaeth (Hopl.) 6
huallagensis Spaeth 44
huanocensis Spaeth 37
humeralis Kraatz (Cassida) 103
humeralis Ol. (Baton.) 66
humerosa Spaeth (Cassida) 118
humerosa Spaeth (Nebroma) 22
humerosa Fairm. (Sphenoc.) 85
humilis Spaeth (Gonioch.) 30
humilis Boh. (Physon.) 62
hyalina Weise (Cassida) 103
hyalina Boh. (Echoma) 53
hyalocincta Fairm. 126
hybrida Boh. 79
hypocrita Boh. (Ctenoch.) 151
hypocrita Boh. (Pseudomes.) 38
hystrix Spaeth 6

ibaguensis Spaeth 134
icterica Boh. (Aspidom.) 75
icterica Boh. (Cassida) 114
ignava Boh. 21
ignita Boh. 38
ignobilis Boh. 64
Iheringi Spaeth (Omaspid.) 56
Iheringi Spaeth (Pseudomes.) 38
illepida Boh. 40
illota Boh. 79
illudens Boh. 122
illustris Chevr. (Pseudomes.) 38
illustris Er. (Pseudomes.) 39
illyrica Boh. 100
imbecilla Boh. 143
imitatrix Spaeth 149
imitans Spaeth 38
immaculata Desbr. (Cassida) 105
immaculata Ol. (Metriona) 139
immaculata Wgenr. (Priopt.) 18
immaculata Wgenr. (Pseudomes.) 37
immarginata Spaeth 42

immerita Boh. 139
immersa Spaeth 120
immunda Boh. 124
immunita Boh. 124
immutabilis Boh. 100
imparilis Boh. 38
imperialis Boh. (Calaspid.) 31
imperialis Spaeth (Pseudomes.) 38
imperialis Guér. (Zatreph.) 49
impicta Boh. 75
impicticollis Weise 112
implexa Boh. 38
impluviata Boh. 38
impressa Blanch. (Laccopt.) 82
impressa Panz. (Poecil.) 46
impressicollis Fairm. 20
impressipennis Boh. 46
imprompta Boh. 63
impubis Boh. 37
impudens Boh. 38
impura Boh. 151
impurum Boh. 14
impustulata Boh. 18
inaequalis J. Thoms. (Cassida) 117
inaequalis L. (Pseudomes.) 38
inanis Boh. 64
inaurata Burm. 38
inca Spaeth 38
incarnata Boh. 38
incerta Boh. 139
incincta Boh. 147
incisicollis Spaeth 85
incita Boh. 135
inclusa Boh. 59
incomta Boh. 8
incompta Weise 107
inconstans Fairm. (Aspid.) 75
inconstans Fairm. (Cassida) 115
inconstans Boh. (Metriona) 136
incorrupta Boh. 139
incrustata Boh. 62
inculta Boh. 132
incurva Boh. 132
indecens Boh. 123
indecorata Boh. 149
indica Boh. 68
indicola Duviv. 114
indigacea Boh. 38
indigesta Boh. 59
indistincta Boh. 75
inedita Boh. 139
inepta Boh. 25
inermis Boh. 38
inexculta Boh. 38
infaceta Boh. 59
infantula Boh. 151
infastidita Boh. 118
infecta Boh. 59
infirma Boh. (Cassida) 118
infirma Boh. (Chelym.) 59
inflata Boh. 59
informis Boh. (Cassida) 114
informis Boh. (Pseudomes.) 38
infuscata Spaeth 75
ingens Duviv. 75
ingenua Boh. 151
ingrata Boh. 50
innocens Boh. 53
innocua Boh. 75
innotata Boh. 119
inornata Spaeth (Cassida) 93
inornata Waterh. (Metriop.) 19
inornata Boh. (Pseudomes.) 40
inquinata Boh. (Aspidom.) 68
inquinata Brullé (Cassida) 103
inscripta Boh. 135
insculpta Boh. (Aspidom.) 75
insculpta Boh. (Gratiana) 121
insculpta Kirsch (Tauroma) 21
insidiosa J. Thoms. (Aspidom.) 76
insidiosa Boh. (Baton.) 66
insignis Klug (Chelym.) 59
insignis Weise (Chirida) 126
inspicata Spaeth 44
instabilis Baly 27
insubida Boh. 124
insulana Weise 82
insularis Spaeth (Aspidom.) 70
insularis Boh. (Cassida) 115
interjecta Boh. (Elytrog.) 51
interjecta Baly (Pseudomes.) 38
intermedia Boh. (Ctenoch.) 151
intermedia Boh. (Polychalc.) 24
interstitialis Spaeth 114
interrupta F. (Aspidom) 71
interrupta Champ. (Championasp.)45
intertexta Boh. 84
intorsa Spaeth 117
intricata Weise (Aspidom.) 75
intricata Boh. (Hemisph.) 12
intricata Klug (Laccopt.) 83
intricata Boh. (Poecil.) 46
intumida Boh. 122
inuncta Boh. 68
inundata Weise (Aspidom.) 69
inundata Weise (Cassida) 105
invasa Boh. 46
invenusta Weise 139
involuta Boh. (Metriona) 140
involuta Fairm. (Oxylep.) 87
irazuensis Champ. 132
Iris Perty 147
irregularis Boh. 119
irrorata Weise (Aspidom.) 75
irrorata Guér. (Canistra) 29
irrorata Weise (Cassida) 117
irrorata F. (Omoplata) 54
isparetta Boh. 75

isthmica Champ. (Pseudomes.) 38
isthmica Champ. (Nuzon.) 134

Jacobsoni Spaeth 103
Jakowlewi Rtt. 87
jamaicensis Ol. (Aspidom.) 69
jamaicensis L. (Eurypepla) 61
Jansoni Baly 67
janthina Boh. 22
japana Baly 103
japonica Spaeth 127
javanica Boh. 143
jecorosa Spaeth 80
Jousselini Boh. 147
jucunda Spaeth (Aspidom.) 69
jucunda Kirsch (Metriona) 137
jucunda Boh. (Pseudomes.) 38
jugata Boh. (Echoma) 53
jugata Boh. (Tauroma) 21
Juno Boh. 114
Judaica F. 139
Junodi Spaeth 8
justa Spaeth 114
Justini Boh. 63
juvenca Boh. 57

Katonae Spaeth 74
Kiesenwetteri Boh. 66
kilimana Weise (Aspidom.) 75
kilimana Spaeth (Cassida) 119
Kirschi Spaeth 59
Klenei Spaeth 12
Klugi Boh. (Chelym.) 59
Klugi Weise (Hopl.) 7
Klugi Spaeth (Nebroma) 22
Koechlini Mars. 89
Kohlschütteri Weise 8
Kolbei Weise (Aspidom.) 75
Kolbei Weise (Hopl.) 7
Kolbei Spaeth (Pseudomes.) 38
Kollari Boh. 38
Kossmati Spaeth 87
Kraatzi Weise (Cassida) 117
Kraatzi Weise (Cassida) 111
Kraatzi Wgenr. (Chirida) 126
Kraatzi Boh. (Pseudomes.) 38
Kristenseni Spaeth 93
Kuntzeni Spaeth 8
Kunzei Boh. 66

labilis Boh. 108
lacertosa Boh. 38
Lacordairei Boh. 39
lacrimosa Boh. 119
lacrymosa Boh. 119
lacunata Blackb. 142
lacunosa Boh. 39
laeta Boh. (Coptoc.) 132
laeta Weise (Laccopt.) 84
laetabilis Spaeth 115
laetifica Weise (Cassida) 115
laetifica Boh. (Chirida) 126
laevicollis Spaeth 12
laevigata Spaeth 75
laevis Herbst 98
Langei Spaeth 45
languida Boh. (Anacass.) 50
languida Cornel. (Cassida) 111
lanuginosa Boh. 27
laqueifera Kirsch 132
lasciva Boh. 59
lata Weise (Aspidom.) 76
lata Suffr. (Cassida) 101
lata Boh. (Pseudomes.) 39
latecincta Fairm. 116
lateralis Weise (Aspid.) 76
lateralis Spaeth (Hopl.) 7
lateralis L. (Neomphal.) 44
lateralis Sulz. (Pseudomes.) 38
lateramosa Wgenr. 71
lateraria Boh. 139
lateripunctata Spaeth 64
lateritia Fairm. 116
latevittata Boh. (Metriona) 139
latevittata Spaeth (Miocalasp.) 31
latevittata Boh. (Pseudomes.) 39
laticollis Boh. (Gonioch.) 29
laticollis Boh. (Hopl.) 8
laticollis Boh. (Polychalc.) 24
latipennis Champ. (Delocr.) 5
latipennis Boh. (Mesomph.) 33
latissima Wgenr. (Priopt.) 18
latissima Baly (Pseudomes.) 39
latissima Spaeth (Vulpia) 28
Latreillei Cast. 14
lauta Blackb. 71
Leayana Latr. 17
Lebasi Boh. 39
Le Contei Crotch 124
lenis Boh. 39
lenta Spaeth 10
leopardina Boh. 126
lepida Spaeth 130
Leplaei Spaeth 9
Leprieuri Boh. 147
leprosa Boh. 134
Lerouxi Boh. 66
Lesnei Spaeth 7
leucophaea L. 120
Lewisi Crotch (Chelym.) 58
Lewisi Baly (Thlaspida) 128
limbata Goldf. (Aspidom.) 68
limbata Sturm (Platyauch.) 4
limbata Spaeth (Thlaspidos.) 128
limbaticollis Fairm. 101

limbella Fairm. 116
limbipennis Boh. 69
limbiventris Boh. 93
limoniata Boh. 62
limpida Boh. 139
Lindigi Kirsch 151
lineata F. 49
lineatocollis Boh. 39
lineigera Boh. 55
lineola Creutz (Cassida) 104
lineola F. (Himatid.) 13
linigera Boh. 132
liquefacta Spaeth 93
liquida Er. 139
liriophora Kirby 113
litigiosa Boh. 93
litterifera Spaeth 15
littoralis Weise 102
liturata Boh. 137
livida H. 136
lividula Fairm. 20
Livingstonei Baly (Androya) 20
Livingstonei Spaeth (Hopl.) 9
lixiva Boh. 74
lobata Boh. (Aspidom.) 70
lobata Boh. (Metriona) 141
Lönnbergi Spaeth 76
lojana Spaeth 44
longicornis Spaeth (Hopl.) 7
longicornis Weise (Laccopt.) 83
longicornis Guér. (Prenea) 26
longispina Spaeth 5
longula Fairm. (Androya) 20
longula Boh. (Chelym.) 59
lorata Boh. 127
Loriae Spaeth 142
Lucasi Boh. 64
lucida Suffr. (Cassida) 95
lucida Boh. (Pseudomes.) 40
lucidula Boh. 124
luctifera Boh. 132
luctuosa Boh. (Hopl.) 7
luctuosa Ol. (Prenea) 26
luctuosa Spaeth (Pseudomes.) 39
luculenta Boh. 147
ludibunda Boh. 76
ludicra Boh. 135
lugens Germ. (Dolichot.) 25
lugens Spaeth (Pseudomes.) 39
lugubrina Boh. (Ctenoch.) 151
lugubrina Boh. (Chirida) 124
lugubris Boh. 151
lunata Thunb. 38
lunifera Spaeth (Aspidom.) 72
lunifera Boh. (Coptoc.) 132
lunulata Boh. 56
lurida Boh. (Aspidom.) 76
lurida Suffr. (Chelym.) 59
lurida Spaeth (Neomphal.) 44
lutarella Boh. 62
lutea Fairm. (Aspidom.) 73
lutea Boh. (Calyptoc.) 16
luteicollis Boh. (Conchyl.) 80
luteicollis Spaeth (Nebraspis) 48
luteipennis Spaeth (Conchyl.) 79
luteipennis Boh. (Pseudomes.) 39
luteocincta Boh. (Basipta) 85
luteocincta Spaeth (Hopl.) 7
luteola Boh. 147
lutescens Boh. 121
luzonica Spaeth 82
lyncea Boh. 79
lyra Spaeth 139
lyrica Fairm. 116

Mac Leayi Boh. 71
macularia Boh. 46
maculata F. (Cassida) 107
maculata L. (Cassida) 105
maculatissima Boh. (Anacass.) 50
maculatissima Boh. (Aspidom.) 71
maculicollis Lincll (Aspidom.) 76
maculicollis Champ. (Metriona) 139
maculicollis Boh. (Physon.) 62
maculipennis Boh. (Conchyl.) 80
maculipennis Boh. (Hopl.) 10
maculipennis Boh. (Priopt.) 18
maculipes Boh. 62
maculipunctata Spaeth 80
maculiventris Boh. 62
maculosa Boh. 151
madagascarica Boh. 76
Maerkeli Boh. 18
magica Boh. 149
malachitica Germ. 22
mamillata Boh. 147
Mandli Spaeth 28
manilensis Weise (Laccopt.) 82
manilensis Weise (Metriona) 143
Mannerheimi Boh. 39
mansueta Boh. 147
manubialis Spaeth 117
marcida Weise 84
marcidula Boh. 147
marculenta Boh. 139
margaritacea Schall. (Cassida) 96
margaritacea Herbst (Cassida) 98
margaritacea Thunb. (Cassida) 94
marginalis Boh. 147
marginata Weise (Cassida) 117
marginata L. (Chelym.) 59
marginata Weise (Chirida) 125
marginata Spaeth (Ctenoch.) 151
marginata Kirsch (Epistict.) 19
marginata Champ. (Hemisphaer.) 12
marginata Boh. (Hopl.) 7
marginata Weise (Laccopt.) 84

marginata L. (Omoplata) 54
marginata Kirsch (Pseudomes.) 39
marginata Weise (Stilpnasp.) 15
margineguttata Wgenr. (Hybosa)123
margineguttata Boh. (Pseudomes.) 34
marginella F. 147
marginevittata Wgenr. (Baton.) 66
marginevittata Wgenr. (Pseudomes.) 39
marginicolle Boh. 14
marginicollis Boh. 65
marginipennis Boh. (Calyptoceph.) 16
marginipennis Spaeth (Pseudech.) 52
marginiventris Boh. 24
Mariae Adelheidae Spaeth 116
marmorata Champ. 134
Marshalli Spaeth (Hopl.) 9
Marshalli Spaeth (Hermin.) 11
Marthae Spaeth 39
marylandica Herbst 137
mashonensis Spaeth 9
matris Spaeth 57
matronula Boh. 19
maura Boh. 64
maxima Blackb. 142
media Boh. 151
melanocephala Suffr. 96
melanophthalma Boh. 93
melanosceles Schrank 109
melanosticta Spaeth 89
melanota Boh. 151
mellicula Boh. 123
Mellyi Boh. 43
mera Germ. 115
meraukensis Spaeth 71
meridensis Spaeth 45
meridionalis Suffr. 91
mesomela Boh. 131
mesomelaena Boh. 131
metallica Vigors (Nebroma) 22
metallica Guér. (Oxynod.) 27
metallica Klug (Polychalc.) 24
metallica Demay (Pseudomes.) 43
meticulosa Boh. (Metriona) 138
meticulosa Spaeth (Zatreph.) 49
mexicana Champ. (Jonthon.) 120
mexicana Champ. (Ogdoec.) 57
mexicana Boh. (Physon.) 63
micans F. (Aspidom.) 68
micans Ol. (Aspidom.) 68
microcera Boh. 139
miliaris F. (Aspidom.) 69
miliaris F. (Aspidom.) 71
miliaris Herbst (Laccopt.) 83
militaris Boh. 59
mimica Weise 125
miniata Boh. (Charidot.) 147
miniata Boh. (Hemisphaer.) 12
miniata Boh. (Oxynod.) 27
miniata Kolbe (Poecil.) 46
miniatipennis Boh. 16
miniatula Boh. 147
minima Wgenr. 66
minuta Boh. 119
mirabilis Boh. 25
miraculosa Spaeth 67
miranda Boh. 125
mirifica Boh. 27
misella Boh. 39
mitis Boh. 25
Mniszechi Boh. 147
mrogorensis Weise 76
Mocquerisi Spaeth 7
moderata Spaeth 44
modesta Boh. (Ctenoch.) 151
modesta Wgenr. (Hopl.) 10
modesta Spaeth (Laccopt.) 84
modesta Wgenr. (Pseudomes.) 39
modica Boh. 39
Modiglianii Spaeth 129
moesta Boh. 135
mollis Boh. 98
moluccana Boh. 11
mombonensis Weise 76
mongolica Boh. 104
monilicornis Spaeth 11
monoceros Boh. 66
monstrosa Spaeth (Hopl.) 7
monstrosa Boh. (Oma) 23
montivaga Spaeth 84
Moori Boh. 114
morata Boh. 119
Morawitzi Jacobs. 107
morbillosa Ol. 51
morio F. 151
morosa Weise 84
Mouffleti Boh. 79
Mouhoti Baly 17
Moultoni Spaeth 10
mucronata Boh. 66
Mülleri Spaeth 129
muirana Sharp 119
Mulsanti Boh. 13
multicava Latr. 24
multicolor Blackb. 142
multiguttata Boh. 59
multinotata Boh. (Laccopt.) 82
multinotata Wgenr. (Oxyn.) 27
multipicta Boh. (Chelym.) 59
multipicta Boh. (Poecil.) 46
multiplagiata Wgenr. 18
multipunctata Ol. (Chelym.) 59
multipunctata Ol. (Chelym.) 58
multisignata Boh. 135
multisinuata Spaeth 53
munda Weise (Aspidom.) 72
munda Boh. (Chirida) 124

mundula Boh. 132
murina Spaeth 39
murraea L. 104
Murrayi Bedel (Cassida) 105
Murrayi Boh. (Patrisma) 81
musta Spaeth 68
mutabilis Klug (Aspid.) 76
mutabilis Vill. (Cassida) 96
mutata Boh. 76
mutilata Boh. 69
myops Boh. 139
mystica Boh. (Ctenoch.) 151
mystica Spaeth (Hopl.) 7

nana Boh. 127
napaea Boh. 151
natalensis Boh. (Aspidom.) 76
natalensis Spaeth (Chirida) 127
Nattereri Spaeth 55
navicella Boh. 115
navicula Boh. 98
nebulosa L. (Cassida) 105
nebulosa F. (Cassida) 102
nebulosa Boh. (Selenis) 51
neglecta Weise (Cassida) 119
neglecta Boh. (Charidot.) 147
nepalensis Boh. 82
nervosa Spaeth (Hopl.) 9
nervosa F. (Poecil.) 46
Nickerli Spaeth (Aspidom.) 78
Nickerli Spaeth (Chirida) 126
Nickerli Spaeth (Desmon.) 23
Nickerli Spaeth (Hopl.) 9
Nickerli Spaeth (Pseudomes.) 39
Nietneri Spaeth 10
nigra Boh. (Baton.) 66
nigra Suffr. (Cassida) 109
nigra Herbst (Cassida) 107
nigra Duviv. (Hopl.) 7
nigrescens Weise 96
nigriceps Fairm. 95
nigriclavis Spaeth 7
nigricollis Boh. (Chelym.) 59
nigricollis Weise (Priopt.) 18
nigricornis Weise (Aspid.) 73
nigricornis Kirsch (Calliasp.) 15
nigricornis Germ. (Calyptoc.) 16
nigricornis Wgenr. (Laccopt.) 84
nigricornis Baly (Priopt.) 18
nigricornis Weise (Priopt.) 17
nigrina Spaeth (Hemisph.) 12
nigrina Weise (Pilemost.) 90
nigripennis Weise (Aspidom.) 73
nigripennis Weise (Laccopt.) 82
nigripes Ol. 120
nigritarsis Boh. (Anac.) 50
nigritarsis Spaeth (Poecil.) 48
nigritarsis Boh. (Prenea) 25
nigritula Spaeth 7
nigriventris Weise (Calopepla) 17
nigriventris Boh. (Cassida) 114
nigriventris Heyd. (Cassida) 94
nigroaenea Boh. 24
nigroannulata Boh. 149
nigrocincta Boh. (Charidot.) 147
nigrocincta Wgenr. (Ctenoch.) 153
nigrocostata Spaeth 9
nigrodorsata Boh. 71
nigrogibbosa Spaeth 114
nigroguttata J. Thoms. (Aspidom.) 76
nigroguttata Fairm. (Cassida) 116
nigroguttata Gorh. (Cassida) 104
nigrolimbata Spaeth 72
nigrolineata Champ. (Championasp.) 45
nigrolineata Boh. (Omasp.) 56
nigromaculata Herbst (Aspidom) 76
nigromaculata De Geer (Metriona) 139
nigropicta Boh. 47
nigropunctata Klug (Aspidom.) 77
nigropunctata J. Thoms. (Hypoc.) 90
nigropunctata Wgenr. (Orex.) 64
nigropunctata Boh. (Oxynod.) 27
nigrosanguinea Wgenr. 27
nigroscutata Fairm. 116
nigrosellata Boh. 80
nigrosepta Fairm. 127
nigrosignata Boh. 65
nigrosparsa Boh. (Conchyl.) 79
nigrosparsa Wgenr. (Oxynod.) 27
nigrostillata Boh. 131
nigrostrigata Fairm. 104
nigrotecta Fairm. 116
nigrum Wgenr. 14
nilgirica Spaeth (Cassida) 114
nilgirica Spaeth (Hopl.) 10
nilotica Boh. 80
nimbatum Perty 14
Nisseri Boh. 14
nitida Boh. 141
nitidicollis Boh. 63
nitidula Weise (Ischyron.) 87
nitidula Desbroch. (Ischyron.) 87
nitidula Ol. (Pseudomes.) 36
nobilis L. (Cassida) 97
nobilis Herbst (Cassida) 99
nobilitata Boh. 151
nodipennis Germ. 33
nodosa Boh. 66
nodulosa Boh. (Hybosin.) 81
nodulosa Weise (Laccopt.) 83
normalis Germ. 53
notata Boh. 64
notaticollis Spaeth 80
notativentris Wgenr. 50
novaeguinensis Boisd. 71

novemdecim-notata Boh. 82
novemmaculata Mannh. 120
nubilosa Boh. 132
nucleata Boh. 147
nucula Spaeth 114
nudicollis Boh. 39
nudoplagiata Spaeth 33
nupta Spaeth (Aspidom.) 76
nupta Boh. (Echom.) 54
nympha Boh. 139

obducta Boh. 64
obesa Boh. 140
oblita Suffr. (Metriona) 140
oblita Boh. (Pseudomes.) 39
obliterata Herbst (Metriona) 138
obliterata Champ. (Ogdoec.) 57
oblonga Ill. (Cassida) 99
oblonga Sturm (Ischyroson.) 65
obovata Klug 76
obscura Weise (Calopepla) 17
obscura Weise (Cassida) 98
obscura Wgenr. (Hopl.) 10
obscura F. (Oocass.) 88
obscura Kirsch (Pseudomes.) 40
obscurata Spaeth 136
obscurella Weise (Cassida) 98
obscurella Spaeth (Conchyl.) 80
obscuricollis Fairm. 20
obscuripennis Boh. 119
obsolescens Spaeth 49
obsoleta Herbst (Cassida) 101
obsoleta Ill. (Cassida) 102
obsoleta Boh. (Zatreph.) 49
obsoleta Ol. (Zatreph.) 49
obtecta Fairm. 86
obtiva Boh. 144
obtusa J. Thoms. (Aspidom.) 77
obtusa Boh. (Psalidon.) 134
obtusangula Spaeth 76
obtusata Boh. (Cassida) 114
obtusata Spaeth (Oxynod.) 27
obvoluta Boh. 40
occidentalis Spaeth 9
occursans Spaeth 114
ocellata Herbst 89
ochracea Boh. 7
ochroleuca Boh. 10
octoguttata Boh. 127
octomaculata Boh. 18
octonotata Boh. 18
octoplagiata Spaeth 47
octopunctata F. (Priopt.) 18
octopunctata Hope (Priopt.) 18
octopustulata Klug (Poecil.) 47
octopustulata Boh. (Priopt.) 18
octosignata Spaeth 40
ocularis Boh. 147
oculata Boh. 147
odiosa Boh. 10
officiosa Boh. 76
Olcesei Pic 98
olivacea Wgenr. 69
Olivieri Boh. 88
omissa Dohrn 57
opaca Boh. 40
operosa Boh. 139
opima Boh. 71
opposita Boh. 127
optata Boh. 151
opulenta Boh. 132
oranensis Desbr. 100
orbicularis Boh. 69
orbiculata Champ. 132
orbifera Boh. 147
ordinata Boh. 47
orientalis Boh. 69
ornata Creutz. (Cassida) 85
ornata F. (Chirida) 125
ornata Boh. (Poecil.) 47
ornata Herbst (Pseudomes.) 41
orthogonia Boh. 59
Osculatii Guér. 29
ovalis Spaeth (Cassida) 98
ovalis Boh. (Physon.) 63
ovata Boh. 61
ovipennis Champ. 63
ovoidea Fairm. 116

pacifica Boh. 59
paeminosa Boh. 90
pagana Boh. 144
palaestina Reiche (Cassida) 107
palaestina Desbr. (Cassida) 104
palaestina Desbr. (Oxylep.) 86
palaestinae Boh. 107
paleacea Boh. 140
palleago Boh. 76
pallens Boh. (Basipta) 85
pallens Boh. (Hopl.) 7
pallescens Boh. (Cassida) 116
pallescens Guér. (Hopl.) 7
pallescens Boh. (Metriona) 140
palliata F. 25
pallicolor Fairm. 82
pallida Thunb. (Cassida) 113
pallida Hope (Cassida) 114
pallida Payk. (Cassida) 102
pallida Herbst (Metriona) 137
pallida Wgenr. (Prioptera) 18
pallida Ol. (Psalidon.) 134
pallidicollis Boh. 107
pallidicornis Boh. 18
pallidipennis Boh. 56
pallidiventris Rtt. 101
pallidoguttata Blanch. 40

pallidula Boh. (Aspidom.) 74
pallidula Boh. (Gratiana) 121
pallipes Ol. 13
palmarum Boh. 13
palmata Boh. 152.
Panamae Spaeth 12
panamensis Champ. 5
pannonica Suffr. 107
pantherina Blanch. (Herissa) 30
pantherina Klug (Poecil.) 47
Panzeri Weise 107
paphia Boh. 31
papuana Spaeth (Lorentzoc.) 128
papuana Spaeth (Metriona) 142
papulosa Boh. 152
paradoxa Boh. 7
parallela Blanch. (Baton.) 66
parallela Boh. (Hopl.) 9
parallelipennis Spaeth 81
pardalina Boh. 47
parellina Boh. 32
paropsidea J. Thoms. 74
Parryi Baly 19
partita Boh. 59
parummaculata Boh. (Chelym.) 59
parummaculata Boh. (Conchyl.) 80
parva Wgenr. 40
parvicollis Spaeth 27
parvula Boh. (Cassida) 98
parvula Weise (Goniochen.) 30
Pascoei Baly 40
passaria Weise 90
patagonica Boh. 59
patella Spaeth 132
patruelis Boh. 152
Pauli Weise (Cassida) 117
Pauli Weise (Hopl.) 9
paupertina Boh. 44
pauperula Baly 40
pauxilla Boh. 114
pavens Spaeth 44
pavida Spaeth 7
pavonacea Spaeth 44
pavonia Boh. 47
pavonina Boh. (Neomph.) 44
pavonina Licht. (Pseudomes.) 36
pectinata Baly 40
pectoralis Ol. (Aspidom.) 77
pectoralis Weise (Cassida) 101
pectoralis Kirsch (Metriona) 140
peculiosa Weise 94
Pehlkei Spaeth 135
Pellegrini Mars. 108
pelligera Weise 75
pellucida Weise (Aspidom.) 79
pellucida Boh. (Metriona) 140
pellucida Wgenr. (Physon.) 63
peltata Boh. (Chelym.) 59
peltata Boh. (Ctenoch.) 152
peltoides Boh. 65
Penelope Boh. 119
pennsilvanica Spaeth 124
Pentheri Spaeth 119
perampla Champ. 63
peregrina Boh. (Baton.) 66
peregrina Boh. (Chelym.) 60
perforata Boh. (Polychalca) 24
perforata Boh. (Prenea) 26
perforata Pallas (Selenis) 52
Peringueyi Fairm. 86
perjucunda Baly 40
permira Fairm. 6
permodica Boh. 115
pernix Spaeth 135
perplexa Baly 19
perpusilla Boh. 115
Perrieri Fairm. (Cassidops.) 20
Perrieri Spaeth (Hopl.) 6
Perrieri Fairm. (Patrisma) 82
Perroudi Boh. 135
personata Boh. (Chelym.) 60
personata Spaeth (Metriona) 142
pertusa Boh. 40
peruana Spaeth (Chelym.) 60
peruana Spaeth (Cistud.) 65
peruana Spaeth (Plagiometr.) 135
peruana Er. (Spiloph.) 15
peruviana Kirsch (Ctenoch.) 152
peruviana Boh. (Desmon.) 23
peruviana Boh. (Oxynod.) 27
petulans Spaeth 114
philippinensis Boh. (Laccopt.) 82
philippinensis Blanch. (Laccopt.) 83
phlyctaena Licht. 36
Phoebe Boh. 135
phyllis Boh. 70
physodes Boh. 144
phytophagica Crotch 58
picea Boh. 84
piceidorsis Fairm. 130
picifrons Weise 114
picina Boh. 12
picipennis Spaeth 7
picta Spaeth (Cassida) 116
picta Weise (Conchyl.) 80
picta Boh. (Orexita) 64
picticollis Boh. 63
pictilis Boh. 40
pictipennis Boh. 47
picturata Spaeth (Cassida) 117
picturata Boh. (Zatreph.) 50
pilifera Weise (Aspidom.) 78
pilifera Weise (Cassida) 118
pilosa Spaeth 86
pilosella Boh. 85
pilosula Boh. 86
Pinkeri Spaeth 27
piperata Hope (Cassida) 108

piperata Burm. (Eutheria) 50
placida Boh. (Coptoc.) 132
placida Spaeth (Pseudomes.) 40
plagiata Boh. (Metriona) 140
plagiata Boh. (Pseudomes.) 40
plagicollis Spaeth (Cistud.) 65
plagicollis Boh. (Pseudomes.) 40
plagifera Wgenr. 135
plagipennis Spaeth 64
plagosa Boh. 29
plana Charp. (Cassida) 103
plana Boh. (Physon.) 63
planidorsis Boh. 47
planipennis Blackb. (Aspid.) 71
planipennis Spaeth (Poec.) 47
Plasoni Spaeth 71
platynota Germ. 23
plausibilis Boh. 144
plebeia Boh. 152
plecta Er. 152
pleurosticha Er. 40
plicata Boh. (Ctenoch.) 152
plicata Klug (Hopl.) 7
plicata Wgenr. (Physon.) 63
plicaticollis Spaeth 130
plicatula Fairm. (Cassida) 116
plicatula Boh. (Charidot.) 147
plicicollis Boh. 24
plumbea Germ. 44
poecilaspoides Baly 44
poeciloptera Spaeth 8
polyspila Spaeth 77
polyspilota Burm. 60
polysticha Boh. 59
polysticta Boh. 47
polita Klug 123
ponderosa Boh. 72
pontifex Boh. 77
porcata Boh. 47
porosa Boh. 152
porosula Spaeth 147
porphyrio Boh. 15
postica Boh. 64
posticata Boh. 140
potens Weise 77
praecincta Boh. 135
praeclara Spaeth 147
praecox Boh. 80
praestigiatrix Spaeth 40
praetextata Boh. 60
praetimida Spaeth 93
praeusta Boh. 140
prasina Weise (Aspidom.) 77
prasina Ill. (Cassida) 108
prasina Boh. (Cassida) 100
prasina F. (Cassida) 109
prasina Herbst (Cassida) 111
primaria Boh. 39
princeps Boh. (Oxynod.) 26
princeps Boh. (Zatreph.) 49
privigna Boh. 18
probata Spaeth 114
procera Boh. 29
procerula Boh. 16
procincta Boh. 147
producta J. Thoms. 76
profana Boh. 132
profligata Boh. 140
profundestriata Spaeth 115
prolixa Boh. 51
prominens Spaeth 10
promiscua Boh. 125
propinqua Boh. 140
propitia Boh. 119
prospera Spaeth 116
prothoracica Blackb. 115
proxima Boh. (Metriona) 140
proxima Boh. (Poecil.) 48
puberula Chap. (Cassida) 119
puberula Boh. (Prenea) 26
puberula Boh. (Pseudomes.) 39
pubescens Spaeth (Cassida) 116
pubescens Boh. (Chelym.) 60
pubescens Boh. (Oxynod.) 27
pubipennis Boh. 40
pudens Boh. 93
pudibunda Boh. 88
pudica Boh. 140
puella Boh. (Coptoc.) 132
puella Boh. (Paromaspid.) 55
puerilis Boh. 133
puerula Spaeth 12
pugionata Germ. 66
pugnax Boh. 66
pulchella Panz. (Cassida) 98
pulchella Baly (Hemisph.) 12
pulchella Guér. (Hopl.) 7
pulchella Baly (Omaspid.) 56
pulcherrima Spaeth 129
pulchra Spaeth (Charidot.) 147
pulchra Spaeth (Coptoc.) 130
pulchra Spaeth (Hopl.) 7
pulchra Boh. (Spiloph.) 15
pullata Spaeth 40
pullula Boh. 140
pulvinata Boh. 114
pumicosa Boh. 147
pumila Herbst 120
pumilio Boh. 119
punctaria F. 125
punctata Wgenr. (Calliasp.) 15
punctata Boh. (Calyptoceph.) 16
punctata Weber (Chirida) 125
punctata F. (Conchyl.) 80
punctata Spaeth (Echoma) 54
punctata De Geer (Pseudomes.) 41
punctatissima Spaeth (Anac.) 51
punctatissima Weise (Cassida) 116

punctatissima Wolf (Desmon.) 23
punctatissima Boh. (Metriona) 140
punctatissima Spaeth (Neomph.) 44
punctatostriata Boh. 147
puncticollis Suffr. (Cassida) 98
puncticollis Boh. (Chelym.) 60
puncticollis Spaeth (Echoma) 54
puncticosta Boh. 77
punctigera Boh. 60
punctipennis Spaeth (Cassida) 117
punctipennis Boh. (Cistud.) 65
punctipennis Boh. (Metriona) 140
punctipennis Wgenr. (Priopt.) 18
punctipennis Hope (Tauroma) 22
punctulata Klug 51
punctum F. 72
punicea Boh. (Ctenoch.) 152
punicea Boh. (Pseudomes.) 40
pupillata Boh. 147
purpurascens Spaeth 128
purpurata Boh. 140
purpurea L. (Coptoc.) 132
purpurea Spaeth (Tauroma) 21
purpuricollis Spaeth 144
purulenta Boh. 144
pusilla Waltl 98
pusillula Boh. 114
pusio Spaeth 116
pustulata Champ. (Charidot.) 148
pustulata Boh. (Metriona) 140
pygmaea Klug (Charidot.) 148
pygmaea Spaeth (Nabath.) 86
pyramidalis Fairm. 81
pyramidata Boh. 33
pyrenaea Weise 98
pyxidata Boh. 119

quadrata De Geer (Ctenoch.) 152
quadrata Spaeth (Hemisphaer.) 12
quadraticollis Boh. 30
quadricornis Boh. 7
quadrifenestrata Spaeth 56
quadriguttata Boh. (Chirida) 127
quadriguttata Champ. (Pseudomes.) 41
quadriimpressa Boh. 18
quadrilobata Boh. 69
quadrimaculata Ol. (Aspid.) 77
quadrimaculata Kirsch (Charidot.) 148
quadrimaculata Thunb. (Laccopt.) 82
quadrimaculata De Geer (Pseudomes.) 35
quadrinodosa Boh. 24
quadrinotata Boh. (Coptoc.) 133
quadrinotata Boh. (Neomph.) 44
quadrinotata Herbst (Pseudomes.) 34
quadrioculata Boh. 148
quadriplagiata Boh. (Chirida) 127
quadriplagiata Boh. (Pseudomes.) 41
quadripunctata Linell 20
quadripustulata F. 55
quadriramosa Boh. 77
quadriradiata Boh. 72
quadriremis Luc. 74
quadrisignata Boh. (Metriona) 140
quadrisignata Boh. (Priopt.) 18
quadristillata Boh. 54
quadrituberculata Boh. 7
quadrivittata Boh. (Cassida) 120
quadrivittata Spaeth (Chelym.) 60
quadrivittata Champ. (Terpsis) 48
quatuordecim-maculata Latr. 51
quatuordecim-maculatum Latr. 14
quatuordecim-notata Boh. 83
quatuordecim-plagiata Boh. 47
quatuordecim-punctata Ol. (Aspidom.) 69
quatuordecim-punctata Boh. (Phytodectoid.) 56
quatuordecim-signata Spaeth (Cassida) 119
quatuordecim-signata Boh. (Poecil.) 47
quatuordecim-signata Boh. (Pseudomes.) 41
quinquefasciata F. (Aspidom.) 77
quinquefasciata Perty (Poecil.) 47
quinquefasciata Wgenr. (Pseudomes.) 41
quinqueguttata Weise 71
quinquelineata Boh. (Cteisella) 149
quinquelineata Spaeth (Hilaroc.) 49
quinquemaculata Boh. 144
quinquepunctata Walsh 63
quinquevittata Boh. 149

radiata Boh. 129
ramifera Spaeth (Aspidom.) 70
ramifera Desbr. (Hypocass.) 90
ramigera Boh. 18
ramosa Boh. 140
ramulopicta Wgenr. 72
recondita Boh. 144
redimita Weise 148
Redtenbacheri Boh. 41
refractaria Boh. 24
regalis Boh. 31
regina Boh. 47
regularis Fairm. 83
Reicheana Guér. 17
Reichei Boh. 21
Reinecki Spaeth 10
Reitteri Weise 108
repanda Boh. 133

repudiata Suffr. 133
residua Weise 114
respersa Kirsch 152
resplendens Boh. (Calliasp.) 15
resplendens Kirsch (Metriona) 140
retexta Har. 152
reticularis L. 41
reticulata Wgenr. (Amythra) 48
reticulata Kirsch (Charidot.) 148
reticulata De Geer (Ctenoch.) 152
reticulata F. (Ctenoch.) 152
reticulata Wgenr. (Hemisph.) 12
reticulata Kirsch (Tauroma) 21
retifera Spaeth (Amythra) 48
retifera Boh. (Ctenoch.) 152
retiformis F. 41
retipennis Boh. (Mesomph.) 33
retipennis Spaeth (Polych.) 24
retis Wgenr. 41
retusa Licht. (Oxynod.) 28
retusa Boh. (Polych.) 24
retusa Wgenr. (Pseudomes.) 41
revulsa Spaeth 117
rhilensis Weise 108
rimosa Boh. 130
robusta Spaeth 12
romula Spaeth 119
rorida Boh. 127
rosea Ill. (Cassida) 98
rosea Boh. (Cassida) 100
roseocincta Vig. 133
roseola Weise 91
roseomarginata Boh. 91
roseopicta Boh. 149
roseosignata Boh. 133
Rossii Woll. 94
rotalis Boh. 149
rotunda Fairm. 77
rotundata Boh. 148
rotundicollis Ch. Bris. 111
roturica Xamb. 77
rubella Boh. 133
rubicunda Guér. 140
rubicundula Boh. 41
rubiginosa Guér. (Canistra) 29
rubiginosa Müll. (Cassida) 108
rubiginosum Boh. 14
rubra Ol. 15
rubrescens Boh. 50
rubricatum Guér. 14
rubricollis Boh. 47
rubridorsis Spaeth 135
rubrocincta Boh. (Charidot.) 148
rubrocincta Boh. (Ctenoch.) 152
rubrocostata Fairm. 20
rubrodelineata Boh. 47
rubrodiscoidalis Boh. 148
rubrodorsata Boh. 68
rubroguttata Boh. 47
rubrolineata Boh. 149
rubromarginata Boh. (Hopl.) 10
rubromarginata Weise (Hopl.) 10
rubronotata Boh. 51
rubroornata Boh. 130
rubropicta Boh. 148
rubroplagiata Boh. 50
rubroreticulata Boh. 42
rubrotestacea Boh. 140
rubrovittata Boh. 148
rubrum Boh. 14
rudepunctata Spaeth 47
ruderaria Er. 24
rudicollis Spaeth 130
rufa Wgenr. 10
rufescens Herbst 37
ruficeps Boh. 60
ruficornis Spaeth 8
rufina Boh. 16
rufipennis Boh. 60
rufitarsis Spaeth 65
rufiventre Boh. 14
rufocincta Wgenr. 42
rufoguttata Spaeth 60
rufomarginata Wgenr. 66
rufomarginatum Boh. 14
rufomicans Fairm. 116
rufonotata Champ. 134
rufoornata Baly 67
ruforeticulata Boh. 47
rufosignata Boh. 42
rufovirens Suffr. 110
rufula Boh. (Calliasp.) 15
rufula Spaeth (Echoma) 53
rufula J. Thoms. (Hypocass.) 91
rufula Boh. (Hypocass.) 91
rugicollis Champ. (Chelym.) 60
rugicollis J. Thoms. (Laccopt.) 84
rugifera Kraatz 103
ruginosa Boh. (Laccopt.) 84
ruginosa Weise (Laccopt.) 84
rugipennis Spaeth (Cassida) 118
rugipennis Boh. (Coptoc.) 130
rugosa Wgenr. (Baton.) 67
rugosa Boh. (Hemisph.) 12
rugosa Boh. (Orect.) 122
rugosa Baly (Priopt.) 18
rugosa Guér. (Smoding.) 28
rugosicollis Spaeth (Cassida) 116
rugosicollis Spaeth (Laccopt.) 84
rugosipennis Spaeth 18
rugosopunctata Motsch. 109
rugulosa Boh. 114
ruralis Boh. 144
russata Fairm. (Cassida) 104
russata Weise (Cassida) 103
russica Herbst 104
russula Boh. 60
rustica Boh. (Cteisella) 149

rustica Weise (Laccopt.) 84
rutila Er. 140
ruwensorica Weise 78

sagana Boh. 133
saginata Spaeth 114
sagitta Spaeth 57
sagulata Boh. 152
Sahlbergi Spaeth (Oxylep.) 87
Sahlbergi Boh. (Plagiom.) 135
salebrata Boh. 151
salebrosa Boh. 23
salicorniae Curtis 99
Sallei Boh. 124
salsolae Desbr. 87
Salvini Baly (Oxynod.) 27
Salvini Baly (Pseudomes.) 40
sanctae crucis F. 69
Sancti-Spiritus Spaeth 39
sandaricina Boh. 148
sanguinea F. (Hemisphaer.) 12
sanguinea Spaeth (Poecil.) 47
sanguineoguttata Spaeth 116
sanguineum Champ. 14
sanguinolenta Müll. (Cassida) 110
sanguinolenta Schrank (Cassida) 100
sanguinolenta Swed. (Charidot.) 148
sanguinolenta Blanch. (Orexita) 64
sanguinosa Suffr. 110
Sappho Boh. 130
sarawacensis Spaeth (Aspid.) 70
sarawacensis Spaeth (Hopl.) 11
sarawacensis Spaeth (Priopt.) 18
sareptana Kraatz 111
sassana Spaeth 85
satanas Weise 25
satrapa Boh. 17
saucia Weise 111
Saundersi Boh. 42
Sauteri Spaeth (Hopl.) 10
Sauteri Spaeth (Taiwania) 144
scabra Boh. 152
scabriuscula Boh. 148
scabrosa Boh. 22
scalaris Weber 125
scapularis Champ. (Metr.) 140
scapularis Boh. (Xenic.) 45
scapulosa Boh. 54
scenica Boh. 135
Schaumi Boh. 42
Schelleri Karsch 80
Schenklingi Spaeth 130
Schneideri Spaeth 44
Schönherri Boh. 77
Schoutedeni Spaeth (Aspidom.) 79
Schoutedeni Spaeth (Hopl.) 9
Schubotzi Weise 77
Schultzei Weise 18
Schusteri Spaeth (Ischyron.) 87
Schusteri Spaeth (Oxynod.) 28
scitula Spaeth (Aspidom.) 78
scitula Boh. (Chelym.) 60
scoparia Boh. 42
scoriosa Boh. 29
scripta F. 117
scrobiculata Boh. 33
sculpturata Boh. 83
scutellaris Klug 119
scutigerula Boh. 133
sedecim-maculata Boh. (Sindia) 81
sedecim-maculata Boh. (Poecil.) 47
sedecim-notata Boh. 83
sedecim-punctata F. 47
sedecim-pustulata F. 47
sedecim-stillata Boh. 56
sedula Boh. 140
segnis Boh. 47
sejuncta Boh. 140
seladonia Gyll. 111
selecta Weise (Chirida) 125
selecta Boh. (Epist.) 19
selecta Spaeth (Merosc.) 129
sellata Weise (Aspid.) 77
sellata Boh. (Ctenoch.) 152
sellata Boh. (Spiloph.) 15
Semenowi Weise 88
semiannulata Boh. 140
semiatrata Boh. 133
semicirculare Ol. 14
semifasciata Kirsch (Chelym.) 60
semifasciata Boh. (Charidot.) 148
semifasciatum Boh. 14
semiglobosa Boh. (Cassida) 119
semiglobosa Wgenr. (Poecil.) 47
semilineata Boh. 53
semilobata Wgenr. (Ctenoch.) 152
semilobata Wgenr. (Ctenoch.) 153
semilunaris Boh. 152
seminulum Boh. 148
semipallens Spaeth 93
semiramosa Wgenr. 77
semiviridis Guér. 8
semivittata Boh. 127
senicula Spaeth 130
separata Boh. (Metriona) 140
separata Boh. (Physon.) 63
septemcostata Wgenr. 72
septemdecim-notata Boh. 58
septemdecim-punctata Say (Chelym.) 58
septemdecim-punctata Boh. (Metriona) 144
septemnotata Boh. 125
septentrionalis Boh. 63
sepulchralis Boh. 152
seraphina Ménétr. 95
serena Boh. 140

seriata Boh. 50
seriatopunctata Spaeth 123
sericata Guér. 26
sericea Boh. (Chelym.) 60
sericea Baly (Vulpia) 28
serinus Er. 44
serricornis Wgenr. 42
serricosta Boh. 10
sertata Er. 153
servula Boh. 153
sessarum Spaeth 78
setifera Boh. 119
setosa Chap. 118
severa Boh. 153
Severini Spaeth (Aspid.) 78
Severini Spaeth (Hopl.) 10
sexguttata Boisd. (Metriona) 142
sexguttata Spaeth (Neomph.) 44
sexlunata Klug 50
sexmaculata Boh. (Chirida) 125
sexmaculata Boh. (Mesomph.) 33
sexmaculata Boh. (Priopt.) 18
sexmaculosa Boh. 33
sexnotata F. (Chirida) 125
sexnotata Herbst (Chirida) 125
sexoculata J. Thoms. 127
sexplagiata Wgenr. (Baton.) 67
sexplagiata Boh. (Pseudomes.) 42
sexpunctata F. (Metriona) 140
sexpunctata Ol. (Metriona) 141
sexpustulata Donck. (Charidot.) 148
sexpustulata F. (Neomph.) 44
sexsignata Boh. 42
sexstillata Boh. 42
sibirica Gebl. 104
sigillata Gorh. 130
signata Herbst (Cassida) 104
signata Panz. (Omopl.) 54
signaticollis Boh. (Agenysa) 32
signaticollis Weise (Aspid.) 77
signaticollis Boh. (Chelym.) 58
signaticollis Boh. (Ctenoch.) 153
signatifera Boh. 149
signatipennis Boh. 80
signifera Weise (Cassida) 114
signifera Herbst (Chirida) 124
Signoreti Boh. 148
Sikorae Spaeth 8
silacea Boh. 78
silaceipennis Boh. 42
Silbermanni Boh. 42
silphoides Spaeth 117
similata Boh. (Ctenoch.) 153
similata Boh. (Neomph.) 45
similis Marsh. (Cassida) 109
similis Panz. (Prenea) 26
Simonis Wgenr. 76
simplaria Blackb. 142
simplex Boh. 141
simulans Spaeth 56
sincera Spaeth 93
singaporica Spaeth 10
singularis Steph. (Cassida) 109
singularis Weise (Chirida) 125
sinuata Champ. (Metriona) 141
sinuata Ol. (Priopt.) 18
Sjöstedti Spaeth (Aspid.) 78
Sjöstedti Spaeth (Cassida) 117
Skalitzkyi Spaeth 28
smaragdina Vig. (Desm.) 23
smaragdina Boh. (Neomph.) 44
smaragdina Spaeth (Oxynod.) 26
smaragdina Boh. (Tauroma) 22
Smithi Boh. 58
sobrina Weise (Hypocass.) 92
sobrina Boh. (Paromasp.) 55
socia Boh. (Aspidom.) 72
socia Boh. (Chelym.) 60
sodalis Boh. 42
Solieri Boh. 54
soluta Weise 126
Sommeri Boh. 42
sordida Bris. (Cassida) 104
sordida Boh. (Coptoc.) 133
soricina Boh. 60
soror Boh. (Charidot.) 148
soror Weise (Hypocass.) 91
spadicea Klug 121
Spaethi Weise (Cassida) 111
Spaethi Weise (Hopl.) 8
Spaethi Rtt. (Ischyron.) 87
sparsa Gorh. (Cassida) 108
sparsa Boh. (Selenis) 52
sparsuta Weise 119
speciosa Brahm (Cassida) 100
speciosa Baly (Spiloph.) 15
speciosa Baly (Vulpia) 28
spectabilis Boh. 74
spectanda Boh. 28
spectrum Boh. 82
specularis Er. 56
speculata Boh. 64
speculum Boh. 148
Spencei Boh. 62
spergulae Marsh. 96
sphaerula Boh. 119
splendidula Suffr. (Cassida) 97
splendidula Marsh. (Cassida) 98
spilota Boh. (Conchyl.) 80
spilota Gorh. (Coptoc.) 130
spinidorsis Spaeth 6
spinifex L. 52
spinipes Boh. 62
spinosa Boh. (Baton.) 67
spinosa Spaeth (Hopl.) 8
spissa Weise 114
sponsa Spaeth 136
spreta Boh. 148

spurca Boh. 25
squalida Boh. 55
stabilis Weise 119
Ståli Boh. 153
Staudingeri Spaeth 72
Steindachneri Spaeth 47
Steinheili Wgenr. (Charid.) 148
Steinheili Wgenr. (Neomph.) 45
stellifera Spaeth 144
sternalis Weise 78
Stevensi Baly (Aspidom.) 70
Stevensi Boh. (Pseudomes.) 42
stictica Boh. (Aspidom.) 78
stictica Har. (Cassida) 117
stigma Germ. 133
stigmatica Suffr. (Cassida) 111
stigmatica Kraatz (Cassida) 111
stigmatica Boh. (Ctenoch.) 153
stigmatica Weise (Prenea) 26
stigmatilis Boh. 63
stillata Boh. 137
stolata Boh. 77
stolida Boh. 85
stragula Boh. 42
striata Weise 78
striatopunctata Boh. 141
strigata Panz. 26
strigosa Gorh. 78
striqula Montrouz. 142
striola Weise 116
striolata Boh. 120
strumosa Spaeth 130
stulta Boh. 141
stupidula Boh. 121
Sturmi Boh. 60
stygia Boh. 60
suahelorum Weise 117
suaveola Spaeth 130
suavis Spaeth 70
subacuminata Wgenr. 136
subannulata Boh. 141
subcornuta Boh. 24
subcruciata Boh. 70
subdivisa Spaeth 70
suberosa Weise 88
subeuropaea J. Thoms. 73
subferruginea Schrank 91
subgibbosa Spaeth 64
subirrorata Boh. 141
sublaevis Spaeth (Hemisph.) 12
sublaevis Boh. (Pseudomes.) 42
sublesta Weise 119
sublucida Boh. 56
submaculata Boh. 136
submetallica Chap. (Laccopt.) 85
submetallica Weise (Pseudomes.) 42
submunda Spaeth 72
submutata Weise 78
subnervosa Boh. 47
subnotata Boh. (Metriona) 141
subnotata Boh. (Pseudomes.) 42
subobliterata Pic 105
subopaca Wgenr. 36
subplagiata Boh. 148
subprasina Spaeth 141
subpunctata Boh. 60
subpustulata Boh. 45
subramosa Kirsch 136
subreticulata Suffr. (Cassida) 97
subreticulata Boh. (Pseudomes.) 42
subrufa Fairm. 116
subrugosa Boh. (Charidot.) 148
subrugosa Boh. (Pseudomes.) 39
subsignata Boh. 141
subtilis Weise 114
subtincta Boh. 149
subvittata Spaeth (Ctenoch.) 153
subvittata Boh. (Metriona) 141
succincta Boh. 133
succinea Boh. 141
Suffriani Boh. 119
sugillata Boh. 77
sulcata Ol. 81
sulcipennis Boh. 51
sulfurago Boh. 119
sulfurata Spaeth 40
sulfurea Boh. (Cassida) 119
sulfurea Spaeth (Aspidom.) 74
sumatrana Spaeth (Aspid.) 70
sumatrana Weise (Priopt.) 19
superba L. 96
supposita L. 149
surda Boh. 148
suspecta Spaeth (Echoma) 53
suspecta Boh. (Plagiom.) 136
suspiciosa Weise (Cassida) 117
suspiciosa Boh. (Pseudomes.) 42
suturalis Fisch. (Cassida) 104
suturalis Weise (Coptoc.) 133
suturalis Ol. (Echoma) 54
suturalis F. (Pseudomes.) 42
suturella Boh. 49
Swartzi Boh. 51
syrtica Boh. 114

tabida Boh. 153
taediosa Boh. 130
taeniata F. 10
tangeriana Pic 104
tantilla Boh. 148
tarsata Boh. 26
taurus F. 21
tecta Boh. 78
Templetoni Baly 11
tenax Spaeth 116
tenebrosa Boh. (Baton.) 67
tenebrosa Blanch. (Smoding.) 28

tenella Spaeth (Hopl.) 11
tenella Klug (Metriona) 137
tenera Boh. 93
tenuecostata Fairm. 20
tenuicula Boh. (Cassida) 119
tenuicula Spaeth (Hopl.) 11
tenuicula Boh. (Omasp.) 56
tenuispina Spaeth 8
terminalis Boh. 19
ternata Boh. 141
tersa Boh. 54
tessellata Boh. (Charidot.) 148
tessellata Spaeth (Metriona) 142
tessellata Burm. (Poecil.) 47
testacea Herbst (Echoma) 53
testacea Rybak. (Thlaspida) 128
testaceicollis J. Thoms. 91
testaceicornis Weise 15
testaceomarginata Boh. 60
testudinaria Boh. (Anacass.) 51
testudinaria Montr. (Aspid.) 70
testudinaria Boh. (Metriona) 141
testudinea Boh. 86
testudo Suffr. 95
tetraptera Gerst. 77
tetraspilota Kolbe (Aspidom.) 78
tetraspilota Baly (Spiloph.) 16
tetrastigma Licht. 36
tetrica Boh. 72
texana Crotch 121
texta Boh. (Chelym.) 60
texta Boh. (Poecil.) 47
textilis Boh. 45
Thais Boh. 144
thalassina Boh. 45
Thiemei Weise 8
Thomsoni Boh. 119
thoracica Geoffr. (Cassida) 102
thoracica Panz. (Cassida) 107
thoracica Steph. (Cassida) 111
thoracica Wgenr. (Pseudomes.) 42
thoracicum F. 14
Thoreyi Boh. 42
Thunbergi Spaeth 82
tibetana Spaeth 17
Tieffenbachi Karsch 80
tigrina De Geer (Cassida) 107
tigrina Ol. (Conchyl.) 80
tigrina Boh. (Neomph.) 45
timefacta Boh. 114
tincta Weise (Cassida) 102
tincta Spaeth (Hopl.) 8
titubans Dohrn 5
togata J. Thoms. 78
togoënsis Weise 78
tomentosa Boh. 45
tortuosa Boh. 78
tosta Klug 118
trabeata Boh. (Chirida) 124
trabeata Fairm. (Priopt.) 19
translucida Boh. 63
transparipennis Motsch. 67
transversa F. 55
transversalis Boh. (Echoma) 54
transversalis Boh. (Pseudomes.) 34
trepida Boh. 153
tredecim-guttata Wgenr. (Laccopt.) 83
tredecim-guttata Boh. (Plagiometr.) 136
tredecim-maculata Boh. 56
tredecim-notata Boh. 126
tredecim-punctata F. (Laccopt.) 83
tredecim-punctata Weise (Laccopt.) 83
tredecim-signata Boh. 126
triangula Spaeth 84
triangulum Weise 144
trichroa Boh. 56
tricolor Boh. (Charidot.) 148
tricolor Herbst (Oxynod.) 28
tricolorata Champ. (Coptoc.) 133
tricolorata Fairm. (Coptoc.) 130
tricolorata Spaeth (Hopl.) 8
tricolorata Boh. (Omasp.) 56
tricostata Spaeth 29
trifasciata F. 56
trigemina Guér. 16
trigonota Spaeth 45
trilineata Hope 89
trimaculata F. 16
tripartita Champ. 64
tripuncticollis Boh. 80
trisignata Boh. 141
tristicula Spaeth 153
tristigma Boh. 45
tristis Boh. (Hemisphaer.) 12
tristis Spaeth (Hopl.) 8
tristis Guér. (Prenea) 26
tristis Weise (Thlaspida) 127
tristriata F. 121
trivialis Boh. 55
trivittata F. 143
trizonata Fairm. 130
troglodytes Boh. 119
trossula Spaeth 116
truncata F. (Baton.) 67
truncata Boh. (Taur.) 22
truncatipennis Spaeth 144
Tschoffeni Spaeth 127
tuberculata Ol. (Chelym.) 59
tuberculata F. (Metriona) 141
tucumana Boh. (Chelym.) 60
tucumana Spaeth (Pseudom.) 39
tumida Champ. 141
tumidula Boh. 33
tumulus Boh. 42
tunisiensis Boh. 89
turbulenta Boh. 123

turcmenica Weise 112
turgida Boh. 63
turpis Boh. 23
turrifera Boh. 67
turrigera Boh. 81
turrita Ill. 33
tuta Weise 81

U-fuscum Wiedem. 143
umbrata Boh. 119
undecim-guttata Rtt. 112
undecim-maculata Boh. 57
undecim-notata Gebl. (Cassida) 112
undecim-notata Boh. (Chirida) 126
undecim-punctata F. 133
undulata Wgenr. 11
undulatipennis Spaeth 78
unicatenata Weise 130
unicolor Burm. (Anacass.) 50
unicolor Wgenr. (Hybosa) 123
unicolor F. (Oocass.) 88
unicolor Spaeth (Oxynod.) 27
uniformis Boh. 133
unimaculata Boh. 119
unipunctata Say 63
uniramosa Wgenr. 151
urbana Boh. 60
urticae Brahm 98
usambarica Weise (Cassida) 118
usambarica Weise (Laccopt.) 85
usambica Kolbe 73
usta Boh. 133

vacca Spaeth 8
vafra Boh. 119
vagepunctata Weise 86
valida Boh. (Amythra) 48
valida Spaeth (Hemisphaer.) 12
vana Boh. 133
van de Polli Spaeth 9
varia Latr. 105
variabilis Boh. 60
varians Blanch. (Chelym.) 60
varians Wgenr. (Ctenoch.) 153
varians Herbst (Metriona) 144
varians Guér. (Orexita) 64
varians F. (Pseudomes.) 37
varicolor Spaeth (Cassida) 116
varicolor Boh. (Orexita) 64
varicornis Spaeth (Crepid.) 129
varicornis Boh. (Metriona) 138
varicosa Er. 29
variegata Geoffr. (Cassida) 105
variegata L. (Oxynod.) 28
variolaris Boh. 33
variolosa Ol. (Chelym.) 60
variolosa Weber (Desmon.) 23
velaris Weise 112
venosa F. (Calasp.) 31
venosa Er. (Selenis) 52
ventralis Weise (Cassida) 97
ventralis Boh. (Chirida) 126
ventricosa Boh. 141
venusta Boh. 61
venustula Weise 131
verecunda Boh. 42
vermiculata Boh. 61
vernicata Fairm. (Aspid.) 78
vernicata Fairm. (Chirida) 127
verrucata Boh. 131
verrucosa Boh. 45
versicolor Boh. 144
vesicularis Thunb. 144
vesiculifera Boh. 136
vespertilio Boh. (Cassida) 119
vespertilio Spaeth (Plagiom.) 136
vespertina Boh. 95
vesta Boh. 70
vetula Weise (Aspidom.) 67
vetula Boh. (Pseudomes.) 42
vexabilis Boh. 55
vibex L. (Cassida) 112
vibex Gemm. & Har. (Cassida) 109
vibex Herbst (Cassida) 113
vicaria Har. (Conchyl.) 79
vicaria Spaeth (Hopl.) 11
vicina Spaeth (Charidot.) 146
vicina Boh. (Pseudomes.) 42
vicinalis Spaeth 131
victa Boh. 47
vidua Boh. 43
vigens Boh. 136
vigintimaculata Thunb. 117
vigintisex-notata Boh. 82
vilis Spaeth (Hopl.) 8
vilis Boh. (Metriona) 141
villica Boh. 153
vinula Boh. 141
virescens Boh. 149
virgata Boh. 148
virginalis Boh. 133
virgo Weise (Gonioch.) 30
virgo Boh. (Metriona) 142
virgulata Boh. 142
virguncula Weise (Cassida) 113
virguncula Boh. (Coptoc.) 133
viridana Herbst 100
viridicoerulea Boh. (Neomph.) 45
viridicoerulea Boh. (Tauroma) 22
virididorsata Boh. (Aspidom.) 74
virididorsata Spaeth (Hopl.) 8
viridimaculata Boh. 19
viridinotata Boh. (Hopl.) 8
viridinotata Boh. (Metriona) 144
viridipennis Boh. 119
viridipicta Boh. 8

viridis L. (Cassida) 94
viridis Brullé (Cassida) 94
viridis Payk. (Cassida) 108
viridis Scop. (Cassida) 109
viridisignata Boh. 67
viridissima Rtt. 111
viriditincta Boh. 8
viridula Weise (Aspidom.) 78
viridula Payk. (Cassida) 98
vitellina Boh. 149
vitrea Boh. 61
vitreata Perty 148
vittata Vill. (Cassida) 98
vittata Wgenr. (Coptoc.) 133
vittata Champ. (Chelym.) 59
vittata Weise (Gonioch.) 30
vittata Wgenr. (Hopl.) 11
vittata Ahr. (Pilemost.) 90
vittata F. (Pilemost.) 89
vitticollis Boh. 63
vittifera Boh. 48
vittigera Boh. 149
vittipennis Boh. 133
vittula Boh. 120
Viturati Pic 91
vivida Boh. 153
Vogeli Weise 9
voluptuaria Boh. 137
vorax Weise 43
vulnerata Boh. 45

Wageneri Kirsch (Ctenoch.) 153
Wageneri Spaeth (Pseudomes.) 43
Wagneri Boh. 64
Wahlbergi Boh. 78
Wallengreni Boh. 133
Waterhousei Boh. 153
Weisei Jacobs. (Cassida) 99
Weisei Spaeth (Epistict.) 19
Weisei Spaeth (Hopl.) 7
Weisei Spaeth (Laccopt.) 84
Weisei Spaeth (Melichroc.) 129
Weinmanni Chap. 119
Wellmani Weise 9
Wesmaeli Boh. 133
Westermanni Boh. (Aspid.) 77
Westermanni Mannh. (Priopt.) 19
Westringi Boh. 126
Westwoodi Boh. 72
Weyenberghi Dohrn 54
Weyersi Spaeth 11
Whitei Boh. 19
Wingelmülleri Spaeth 28
Wollastoni Boh. 61

xanthocera Boh. 13
xanthoptera Boh. 47
xanthospila Champ. 43
xerampelina Boh. 51

yucatana Champ. 67
yucataneusis Champ. 149
yulensis Spaeth 72
yunnanica Spaeth 83

Zelleri Boh. 137
Zetterstedti Boh. 124
zona F. 136
zonata Boh. (Cteisella) 149
zonata Spaeth (Pseudomes.) 37

Pars 16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—

34: **P. Kühnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65

35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90

36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40

37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90

38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coptinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25

39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90

40: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15

41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90

Pars 42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75

43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15

44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65

45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30

46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95

47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15

48: **M. Pic,** Anobiidae. 1912. 92 p. (Mark 8.65) Mk. 5.75

49: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae III. 1912. 156 p. (Mark 14.60) Mk. 9.75

50: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae IV. (Ultima pars.) 1913. 161 p. (Mark 15.30) Mk. 10.20

51: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae, 4. Criocerinae. 1913. 103 p. (Mark 9.75) Mk 6.50

52: **A. Lameere,** Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p. (Mark 10.10) Mk. 6.75

53: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae. 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p. (Mark 26.10) Mk. 17.40

54: **E. Csiki,** Rhipiphoridae. 1913. 29 p. (Mark 2.80) Mk. 1.85

55: **M. Pic,** Bruchidae. 1913. 74 p. (Mark 7) Mk. 4.70

56: **A. Grouvelle,** Byturidae, Nitidulidae: 1. Cateretinae, 2. Meligethinae, 3. Carpophilinae, 4. Nitidulinae, 5. Cryptarchinae, 6. Cybocephalinae. 1913. 223 p. (Mark 21) Mk. 14.—

57: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae IV. 1914. 120 p. (Mark 11.25) Mk. 7.50

58: **M. Pic,** Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p. (Mark 6.15) Mk. 4.10

59: **H. Clavareau,** Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p. (Mark 20.30) Mk. 13.50

60: **R. Jeannel,** Silphidae: Subfam. Bathysciinae. 1914. 62 p. (Mark 5.90) Mk. 3.90

61: **A. Méquignon,** Rhizophagidae. 1914. 16 p. (Mark 1.50) Mk. 1.—

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1550